

Calma el dolor, disminuye la inflamación

# Dorixina

## Gel

VENTA LIBRE  
Industria Argentina

Uso externo

# Clonixinato de lisina



*Esguinces*



*Luxaciones*



*Distensiones*



*Golpes*



*Torceduras*

**FORMULA: ¿Qué contiene DORIXINA?** Cada 100 g de gel contiene: Ingrediente Activo: **Clonixinato de lisina** 5 g. Excipientes: Alcohol isopropílico; Hidroxietilcelulosa; Carbómero; Propilenglicol; Sulfito de sodio; Solución de lisina base al 50%; Edetato disódico dihidrato; Metilparabeno; Mentol cristal; Esencia de lavanda; Azul brillante FDC Blue N°1; Agua purificada.

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO**

**ACCION:** Calma el dolor y disminuye la inflamación.

**¿Para qué se usa DORIXINA?**

**Lea detenidamente esta información.**

**DORIXINA** es un gel para uso externo sobre la piel, indicado para el alivio local del dolor y la inflamación de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos, especialmente luego de golpes, torceduras, distensiones, esguinces, luxaciones.

**¿Qué personas no pueden recibir DORIXINA?**

**No use DORIXINA en los siguientes casos:**

- Si en alguna oportunidad tuvo reacciones alérgicas a algunos de los componentes del producto.
- Si alguna vez presentó espasmo en los bronquios, pólipos nasales, enrojecimiento, picazón y edema (hinchazón) de la piel, al tomar aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios.

**DORIXINA** no debe usarse en embarazadas y durante la lactancia si no ha sido indicado por el médico y en menores de 12 años.

**¿Qué cuidados debo tener antes de usar DORIXINA?**

Utilizar sólo en piel intacta.

Evitar el contacto con los ojos.

No utilizar vendajes oclusivos.

No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada.

No aplicar simultáneamente con otros productos.

No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento no por dos semanas posteriores al mismo.

No utilizar en menores de 12 años.

**¿Qué cuidados debo tener mientras esté usando DORIXINA?**

No ingerir este medicamento, es de uso externo exclusivamente.

No aplicar este producto por más de 7 días seguidos.

Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas, consulte a su médico.

Generalmente **DORIXINA** es bien tolerado. Excepcionalmente y en individuos muy sensibles puede producir calor, coloración roja de la piel, picazón o ardor en la zona afectada.

Suspenda el tratamiento con **DORIXINA** si tiene reacciones alérgicas en la piel o en las mucosas y consulte con su médico.

**Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento.**

**¿Cómo usar DORIXINA?**

**DORIXINA** se usa por vía externa (cutánea) sobre la piel no

herida, no debe aplicarse sobre los ojos, oídos, boca, mucosas, ni zonas de la piel quemadas, irritadas o heridas.

Aplicar **DORIXINA** sobre la zona lesionada o dolorosa en cantidad suficiente, 3 o 4 veces por día, de acuerdo con la intensidad del dolor. Esparcir el gel con un suave masaje hasta lograr su absorción completa. Es conveniente lavar las manos antes y después de la aplicación.

#### PRESENTACION

##### **DORIXINA (Clonixinato de lisina) Gel:**

Envase conteniendo 50 gramos.

#### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis?**

Si accidentalmente ingiere **DORIXINA** llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Podrá comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 / 2247. Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel. (0221) 451-5555.

#### **¿Cómo conservo este medicamento?**

Mantenga **DORIXINA** fuera del alcance de los niños.

Mantenga el envase de **DORIXINA** bien cerrado.

#### **¿Tiene Usted alguna pregunta?**

Para comunicarse: **Laboratorio Roemmers:**

**Información a profesionales y usuarios ☎ 0-800-333-5658.**

**ANMAT responde 0800-333-1234.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O A SU FARMACEUTICO.**

**ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**LAVAR LAS MANOS LUEGO DE SU APLICACION.**

**CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.**

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Cert. N° 34.746. Dir. Técnica: Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica. Elaborado en Coronel Méndez 440, B1875DQJ, Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Septiembre de 2012.

[www.roemmers.com.ar](http://www.roemmers.com.ar)

#### **Roemmers S.A.I.C.F.**

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

[www.dorixinagel.com.ar](http://www.dorixinagel.com.ar)



**ROEMMERS**

CONCIENCIA POR LA VIDA

