
Eric Wan - ezw23@drexel.edu - Lab 5

Table of Contents

Part a	1
Part b	1
Part c	1
Part d - Numeric Solution	2
Part e - Analytic Solution	3
Part f	4

Part a

```
%{
eq: y'' + 6y' + 9y = 0
y(0) = -2
y'(0) = 3
aux eq: x^2 + 6x + 9 = 0
solution: parabola, stable
%}
aux = [1 6 9];
r = roots(aux)
```

```
r =

-3.0000 + 0.0000i
-3.0000 - 0.0000i
```

Part b

```
%{
x'(t) = Ax(t) + Bf(t)
x1 = y, x2 = y'
x1' = 0 * x1 + 1 * x2
x2' + 6 * x2 + 9 * x1 = 0
x2' = -9 * x1 - 6 * x2
[x1'; x2'] = [0 1; -9 -6] * [x1; x2] + [0; 0]
%}
```

Part c

```
%{
eq. points when x' = 0
x1' = 0
```

```
x2' = 0
[x1'; x2'] = [0 1; -9 -6] * [x1; x2] + [0; 0]
%}
A = [0 1; -9 -6];
B = [0; 0];
eq = A^-1 * B

eq =

    0
    0
```

Part d - Numeric Solution

```
type NumericSolution.m
tSpan = [0:0.01:4];
xI = [-2; 3];
[tode, yode] = ode45(@NumericSolution, tSpan, xI);
x1 = yode(:,1);
x2 = yode(:,2);

subplot(2, 2, 1)
plot(tode, x1)
title('x1 vs t')
xlabel('t')
ylabel('x1')
grid on
hold on

subplot(2, 2, 3)
plot(tode, x2)
title('x2 vs t')
xlabel('t')
ylabel('x2')
grid on
hold on

subplot(2, 2, [2 4])
plot(x1, x2)
title('x2 vs x1')
xlabel('x1')
ylabel('x2')
grid on
hold on
plot(x1(1,1),x2(1,1),'*')
plot(x1(401,1),x2(401,1),'o')
legend('x2 vs x1', 'init condition', 'equil point')


function [xPrimes] = NumericSolution(t, xI)
```

```

xPrimes = [0 1; -9 -6] * xI + [0; 0];

end

```




Part e - Analytic Solution

```

syms y
y = dsolve('D2y + 6*Dy + 9*y = 0, y(0) == -2, Dy(0) == 3'); % solve
2nd ODE
yprime = diff(y,1); % y'
yFunc = matlabFunction(y); % convert y from symbolic to function
dyFunc = matlabFunction(yprime); % convert y' from symbolic to
function
t = 0:0.01:4; % t interval
subplot(2, 2, 1)
plot(t, yFunc(t), 'o') % y vs t
legend('Num', 'Anal')
subplot(2, 2, 3)
plot(t, dyFunc(t), 'o')
legend('Num', 'Anal')

```



Part f

```
%{  
Both the numeric and analytical solutions are the same  
%}
```

Published with MATLAB® R2017a