## Correction Rattrapage

## Exercice 1

A/1/ (2 pts) Soit X une v.a. réelle sur  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  telle que  $E(|X|) < +\infty$ . On a que  $\forall B \in \mathcal{A}$ :  $\int_B E(X/\mathcal{A}) dP = \int_B X dP$ . Mais  $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ , donc:

Si  $B = \Omega$ :  $\int_{\Omega} E(X/A) dP = \int_{\Omega} X dP = E(X) = E(X)P(\Omega) = E(X)\int_{\Omega} dP = \int_{\Omega} E(X) dP$ 

Si  $B = \emptyset$ :  $\int_{\emptyset} E(X/A) dP = 0 = \int_{\emptyset} X dP = \int_{\emptyset} E(X) dP$ 

Donc  $\forall B \in \mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\} : \int_B E(X/\mathcal{A}) dP = \int_B E(X) dP$ , ainsi  $E(X/\mathcal{A}) = E(X)$  p.s.

 $2/Z_n = E(Y/\mathcal{F}_n)$ . (0.5 pts)  $Z_n = E(Y/\mathcal{F}_n)$  est  $\mathcal{F}_n$ -mesurable, ainsi  $(Z_n)_n$  est adaptée à la filtration  $(\mathcal{F}_n)_n$ .

(0.5 pts) On a  $E(|Z_n|) = E(|E(Y/\mathcal{F}_n)|) \le E(E(|Y|/\mathcal{F}_n))$  d'après l'inégalité de Jensen et  $E(E(|Y|/\mathcal{F}_n)) = E(|Y|) < +\infty$  donc  $E(|Z_n|) < +\infty$ . D'où  $Z_n$  est intégrable  $\forall n \ge 1$ .

(1 pts) Montrons que:  $E(Z_{n+1}/\mathcal{F}_n) = Z_n$ . On a  $E(Z_{n+1}/\mathcal{F}_n) = E(E(Y/\mathcal{F}_{n+1})/\mathcal{F}_n) = E(Y/\mathcal{F}_n) = Z_n$  car  $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$ . Ainsi  $Z_n = E(Y/\mathcal{F}_n)$  est une martingale.

 $\mathbf{B}/\ 1/\ (\mathbf{0.5\ pts})\ T_1$  est un temps d'arrêt. Il peut pas deviner le future. Il connait la mise initiale et il peut savoir à n'importe quel instant si sa fortune est égale à la mise initiale de son adversaire.

2/ (0.5 pts)  $T_2$  est un temps d'arrêt. Sachant l'information disponible il peut savoir si l'indice boursier à chuté de 1%.

3/ (0.5 pts)  $T_3$  n'est pas un temps d'arrêt (on ne peut pas savoir dans le future si le processus peut entrer dans l'ensemble ]0;22[). (0.5 pts)  $T_4$  est un temps d'arrêt (temps d'entrée d'un processus adapté dans un ensemble  $\{0\}$ ).

C/ (2 pts)  $\{S = n\} \in \mathcal{G}_n \subset \mathcal{F}_n$  donc S est un  $\mathcal{F}_n$ -temps d'arrêt.  $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$  mais  $\{T = n\}$  peut ne pas appartenir à  $\mathcal{G}_n$  car  $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{G}_n$ . Donc T n'est pas un  $\mathcal{G}_n$ -temps d'arrêt.

## Exercice 2

1/ (1 pts) 
$$P(S_{12} > 120 / S_3 = 60) = P\left(\frac{S_{12}}{S_3} > 2\right) = P(9\mu + \sigma(W_{12} - W_3) > \log 2) = P\left(\frac{W_{12} - W_3}{\sqrt{9}} > \frac{\log 2 - 9\mu}{3\sigma}\right) = 1 - \phi(0.9) = 0.1841.$$

2/(1 pts) Soit M la médiane.  $P(S_t \leq M) = 1/2$  et  $P(S_t \leq M) = P(S_0 \exp(\mu t + \sigma W_t) < M) = P\left(W_t < \frac{\log M - (\log S_0 + \mu t)}{\sigma}\right) = \phi\left(\frac{\log M - (\log S_0 + \mu t)}{\sqrt{t}\sigma}\right) = 1/2$ , donc  $\frac{\log M - (\log S_0 + \mu t)}{\sqrt{t}\sigma} = 0$  et on obtient  $M = S_0 e^{\mu t}$ .

(2 pts) On a  $\log S_t \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(\log S_0 + \mu t, \sigma^2 t\right)$  donc  $E\left(S_t\right) = \exp\left(\log S_0 + \mu t + \frac{\sigma^2 t}{2}\right)$ . 3/ (2 pts)

$$E\left[S_{t}/\mathcal{F}_{s}\right] = E\left[S_{0}\exp(\mu s + \sigma W_{s})\exp(\mu(t-s) + \sigma(W_{t} - W_{s}))/\mathcal{F}_{s}\right]$$

$$= E\left[S_{s}\exp(\mu(t-s) + \sigma(W_{t} - W_{s}))/\mathcal{F}_{s}\right] = S_{s}E\left[\exp(\mu(t-s) + \sigma(W_{t} - W_{s}))/\mathcal{F}_{s}\right]$$

$$= S_{s}E\left[\exp(\mu(t-s) + \sigma(W_{t} - W_{s}))/\mathcal{F}_{s}\right] = S_{s}\exp\left[\left(\mu(t-s) + \sigma(W_{t} - W_{s})\right)/\mathcal{F}_{s}\right]$$

**4/ (1 pts)** On aura  $E[S_t/\mathcal{F}_s] = S_s \text{ si } \mu = -\frac{\sigma^2}{2}$ .

5/ (1 pts) Si  $\mu = -\frac{\sigma^2}{2}$  la médiane  $M = S_0 e^{\mu t}$  tend vers 0 exponentiellement quand t tend vers l'infini, donc un inverstissement mauvais dans ce cas.