

Concours de Statistique Non Paramétrique

Problème 1 Soit X une variable aléatoire définie sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, à valeur dans \mathbb{R} . pour tout $x \in \mathbb{R}$, on désigne par F la fonction de répartition de X , qu'on suppose qu'elle est $(k+1)$ -fois continûment dérivable et par f la fonction de densité, qu'on suppose qu'elle est strictement positive, et de classe C^k au voisinage de x .

Etant donné X_1, X_2, \dots, X_n une suite de variable aléatoire réelle de même loi que X , l'estimateur de la fonction de répartition par la méthode du noyau noté $F_n(x)$, défini par:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h_n}\right), \forall x \in \mathbb{R}$$

où K est noyau et h_n est une suite de réels positifs, vérifiant

1. Le noyau K est supposé d'ordre k intégrable, d'intégrale égale à 1, borné et positif et à support compact $(0, 1)$, vérifiant:

$$(i) \int t^j K(t) dt = 0 \quad \forall j = 1, \dots, k-1, \text{ et } 0 < \left| \int t^k K(t) dt \right| < \infty.$$

$$(ii) \exists A < \infty, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \text{ on a: } |K^{(i)}(x_1) - K^{(i)}(x_2)| \leq A|x_1 - x_2|, \text{ où } i = 0, 1.$$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\beta h_n = \infty \quad \forall \beta > 0, \quad j = 0, 1.$

On déduit de F_n un estimateur de la densité, noté f_n , défini par

$$f_n(x) = F_n^{(1)}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h_n} K^{(1)}\left(\frac{x - X_i}{h_n}\right) = \frac{1}{nh_n} \sum_{i=1}^n K^{(1)}\left(\frac{x - X_i}{h_n}\right)$$

Montrer qu'on a

1.

$$|f_n(x) - f(x)| = O(h_n^k) + O\left(\sqrt{\frac{\log n}{nh_n}}\right), \text{ p.co.} \quad \text{et} \quad \exists \delta > 0 : \mathbb{P}(f_n(x) < \delta) < \infty.$$

2.

$$|F_n(x) - F(x)| = O(h_n^k) + O\left(\sqrt{\frac{\log n}{n}}\right), \text{ p.co.}$$

3.

$$\exists \delta > 0 \text{ tel que } \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left\{\inf_{x \in \mathbb{R}} |1 - F_n(x)| < \delta\right\} < \infty.$$