

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет физики

Экзамен

«Введение в молекулярную биологию»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Москва
2021

Содержание

1. Химическая и биологическая эволюция. Наследственность, изменчивость и естественный отбор. Основные таксономические группы живых систем. Строение клетки про- и эукариот (сходства и различия). Единство молекулярных механизмов живых систем (примеры). Организация генома живых существ: хромосомы, ДНК пластид и митохондрий, плазмиды.	3
1.1. Химическая эволюция и биологическая эволюция	3
1.2. Наследственность, изменчивость и естественный отбор	3
1.3. Основные таксономические группы живых систем	4
1.4. Строение клетки про- и эукариот (сходства и различия)	4
1.5. Единство молекулярных механизмов живых систем (примеры)	5
1.6. Организация генома живых существ: хромосомы, ДНК пластид и митохондрий, плазмиды	5
1.6.1. Хромосомы	5
1.6.2. ДНК пластид и митохондрий	6
1.6.3. Плазмиды	7
2. Второй билет. Основные классы биологический молекул, ДНК, генетический код	9
2.1. Основыне классы биологический молекул	9
2.2. Формы ДНК	12
2.3. Отличие эукариот от прокариот	13
2.4. Генетический код	13
2.5. Митоз и мейоз	13
3. Репликация ДНК: репликация линейных и кольцевых молекул ДНК, Затравка для ДНК-полимеразы, праймирование, фрагменты Оказаки. Ферменты, необходимые для репликации ДНК (полимеразы I и III, топоизомеразы, хеликаза, лигаза, праймаза, ssb). Теломеры и центромеры эукариот. Ориджины репликации бактерий. Белки определяющие начало репликации бактерий (DnaABC, ssb, SeqA, dam) Репликация кольцевых молекул ДНК по Тета –типу и по типу катящегося колеса	16
3.1. Общее описание механизма репликации	16
3.2. Общее описание механизма репликации	16
3.3. Ферменты, необходимые для репликации ДНК	17
3.4. Теломеры и центромеры эукариот	18
3.5. Ориджины репликации у бактерий	20
3.6. Белки, определяющие начало репликации у бактерий	20
3.7. Репликация кольцевых молекул ДНК по тета-типу	20
3.8. Репликация кольцевых молекул ДНК по типу катящегося колеса	20
4.	21
5.	22
6. Репликоны. Инициация раунда репликации ДНК Escherichia coli. Белки участвующие в регуляции инициации репликации (DnaABC, ssb, SeqA, dam). Топологические проблемы репликации. Сегрегация репликонов по бактериаль-	

ным клеткам. Репликация плазмид, мобильных элементов, фагов и вирусов. Особенности репликации в эукариотах. Теломеры и центромеры. Сегрегация хромосом.	23
6.1. Репликоны	23
6.2. Инициация раунда репликации ДНК Escherichia coli. Белки участвующие в регуляции инициации репликации (DnaABC, ssb, SeqA, dam).	23
6.3. Топологические проблемы репликации.	24
6.4. Сегрегация репликонов по бактериальным клеткам.	25
6.5. Репликация плазмид, мобильных элементов, фагов и вирусов.	26
6.6. Особенности репликации в эукариотах. Теломеры и центромеры. Сегрегация хромосом.	26
7. Мутагенез. Спонтанный мутагенез. Скорость мутагенеза. Индуцированный мутагенез. Репарация димеров тимила с помощью фотолиазы и эксцизионной репарации. Понятие сайт-специфического мутагенеза.	28
7.1. Мутагенез. Естественный мутагенез - Мутационная теория Де Фриза и Коржинского	28
7.1.1. Механизмы мутагенеза	28
7.2. Скорость мутагенеза	28
7.3. Индуцированный мутагенез	29
7.4. Понятие сайт-специфического мутагенеза	29
7.5. Репарация димеров тимила с помощью фотолиазы и эксцизионной репарации	30
7.5.1. Репарация ДНК	31
8. Гомологичная рекомбинация. Модель Холлидея. Гены рекомбинации (recA, ssb, ruvABC). RecA и SOS-ответ. Сайт-специфическая рекомбинация. Рекомбинация в эукариотах. Кроссинговер.	33
8.1. Гомологичная (общая) рекомбинация, модель Холлидея	33
8.2. Гены рекомбинации	34
8.3. SOS-ответ и recA	35
8.4. Сайт-специфическая рекомбинация	35
8.4.1. Транспозиция	36
9. Рекомбинация в эукариотах	37
10.	40
11.	41
12.	42
13.	43

1. Химическая и биологическая эволюция. Наследственность, изменчивость и естественный отбор. Основные таксономические группы живых систем. Строение клетки про- и эукариот (сходства и различия). Единство молекулярных механизмов живых систем (примеры). Организация генома живых существ: хромосомы, ДНК пластид и митохондрий, плазмиды.

1.1. Химическая эволюция и биологическая эволюция

Химическая эволюция — этап, предшествовавший появлению жизни, в ходе которого органические, пребиотические вещества возникали из неорганических молекул под влиянием внешних энергетических и селекционных факторов и в силу развертывания процессов самоорганизации, свойственных всем относительно сложным системам, которыми, бесспорно, являются все углеродсодержащие молекулы.

Пребиотический синтез сложных соединений молекул может делиться на три этапа:

- 1) Возникновение простых органических соединений (спиртов, кислот и т.п.) из неорганических;
- 2) Синтез более сложных органических соединений — «биомолекул» — представителей наиболее распространённых классов метаболитов (продукты метаболизма), в том числе и мономеров — структурных единиц биополимеров (моносахаридов, аминокислот, жирных кислот, нуклеотидов) из простых органических соединений;
- 3) Возникновение сложных биополимеров (полисахарида, белки, нуклеиновые кислоты) из основных структурных единиц — мономеров.

Биологическая эволюция — любое генетическое изменение в популяции, которое происходило в течение нескольких поколений. Изменения должны происходить на генетическом уровне вида и передаваться от одного поколения к другому.

1.2. Наследственность, изменчивость и естественный отбор

Наследственность — способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Благодаря ей живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты вида. Наследственность обеспечивается передачей генетической информации. Например, у эукариот материальными единицами наследственности являются гены, локализованные в хромосомах ядра и ДНК органелл.

Изменчивость — разнообразие признаков среди представителей данного вида, а также свойство потомков приобретать отличия от родительских форм.

Изменчивость бывает нескольких типов. Выделим парочку:

- Наследственная (обусловлена возникновением разных типов мутаций и их комбинаций, которые передаются по наследству и впоследствии проявляются у потомства) и ненаследственная (способность организмов с одинаковым генотипом развиваться по-разному в разных условиях окружающей среды);

- Индивидуальная (различие между отдельными особями) и групповую (различия между группами особей, например, различными популяциями вида, является производной от индивидуальной).

Естественный отбор — основной фактор эволюции, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих более высокой приспособленностью к условиям среды (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

1.3. Основные таксономические группы живых систем

Таксономическая группа фактически это уровень в биологической систематике, т.е. в дисциплине, которая разрабатывает принципы классификации живых организмов. Таксоны идут по иерархии, представим ее от более глобальных таксонов к менее глобальным (только основные, иначе можно с ума сойти; в скобках — название на латыни):

- Царство (regnum);
- Тип (phylum) — у растений вместо него Отдел (divisio);
- Класс (classis);
- Отряд (ordo) — у растений вместо него Порядок (тоже ordo);
- Семейство (familia);
- Род (genus);
- Вид (species) — группа организмов с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, которое даёт в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды.

1.4. Строение клетки про- и эукариот (сходства и различия)

- Размер клеток у прокариот сильно (в 1000 - 10000 раз) меньше, чем у эукариот;
- Прокариоты в основном одноклеточные, в то время как эукариоты все же в основном многоклеточные;
- Эукариоты сильно моложе (почти на 2 млрд лет) чем прокариоты (первые произошли от вторых);
- У прокариотов клетки в основном просто делятся пополам, в то время как у эукариотов возможны митозы, мейоз или их комбинация, при этом образуется т.н. веретено деления (т.е. динамическая структура, которая образуется в митозе и мейозе для обеспечения отделения хромосом и деления клетки);
- У прокариотов кольцевая ДНК просто плавает в цитоплазме, она не связана с белками или РНК, а хромосом нет. У эукариотов же ДНК линейная и локализована в ядре, имеются хромосомы, а ДНК связана с РНК и белком;

- У прокариот мелкие (70S) рибосомы, эндоплазматического ретикулума (это внутриклеточный органоид эукариотической клетки, который представляет из себя разветвленную систему из окруженных мембраной уплощенных полостей пузырьков и канальцев) нет (различия и по многим другим деталям белкового синтеза, включая чувствительность к антибиотикам; синтез белков у прокариот, например, подавляется антибиотиком стрептомицином). У эукариот же крупные (80S) рибосомы, которые могут быть прикреплены к эндоплазматическому ретикулуму;
- Органелл у прокариот мало, ни одна из них не имеет оболочки (двойной мембранны). Внутренних мембран почти нет, редко, когда они есть, их ассоциируют с процессами дыхания и фотосинтеза. У эукариот наоборот (органеллы это например ядро, митохондрии, хлоропласти);
- Клеточные стенки у прокариот жесткие, содержат полисахариды и аминокислоты, основной опорный материал — муреин (компонент, выполняющий функцию осмотической защиты клетки). У эукариот бывает по-разному: у зеленых растений и грибов стенки жесткие, содержат полисахариды. У растений они в основном из целлюлозы, у грибов из хитина. У животных клеточной стенки нет;
- У прокариот жгутики простые, нет микротрубочек (белковые внутриклеточные структуры, входящие в состав цитоскелета, которые представляют собой полые цилиндры диаметром 25 нм. Длина может варьироваться), расположены внеклеточно (не окружены плазматической мембраной). У эукариот же жгутики они сложные, окружены плазматической мембраной. Диаметр их раз в 10 больше;
- Дыхание у прокариот происходит в мезосомах, у цианобактерий — на цитоплазматических мембранах. У эукариот же аэробное дыхание, которое происходит в митохондриях;
- У прокариот не бывает хлоропластов, а фотосинтез (если есть) происходит на мембранах, у которых нет специфической упаковки. У эукариот же появляются хлоропласти (если они делают фотосинтез), состоящие из уложенных в особую структуру мембран;
- Некоторые прокариоты могут фиксировать азот. Эукариоты так не умеют.

1.5. Единство молекулярных механизмов живых систем (примеры)

Хз. Примеры например:

- Единый генетический код;
- Большинство состоят из клеток (кроме вирусов), которые схожи по внутреннему строению.

1.6. Организация генома живых существ: хромосомы, ДНК пластид и митохондрий, плазмиды

1.6.1. Хромосомы

Вытянутые, структурированные совокупности генов, которые несут информацию о наследственности и образованы и конденсированного хроматина (масса генетического материала, состоящая из ДНК и белков, которые конденсируются с образованием хромосом во время деления

эукариотических клеток. Хроматин содержится в ядрах клеток). Наборы хромосом соединяются вместе (один от отца, один от матери) и известны как гомологические хромосомы (пары хромосом, одинаковые по длине, положению генов и местоположению центромеров).




Рис. 1. Строение хромосомы

1.6.2. ДНК пластид и митохондрий

И митохондрии, и пластиды — двухмембранные органоиды эукариотических клеток. Митохондрии встречаются во всех клетках животных и растений, пластиды же характерны для клеток растений, осуществляющих фотосинтетические процессы. Эти органоиды имеют сходный план строения и некоторые общие свойства. Однако по основным метаболическим процессам они существенно отличаются друг от друга.

- **Митохондрии** — круглые, овальные или палочковидные двухмембранные органоиды диаметром около 0.21 мкм и длиной до 710 мкм. Основная — функция синтез АТФ.
- **Пластиды** — двухмембранные органоиды, характерные для фотосинтезирующих эукариотических организмов. Различают три основных типа пластид: хлоропласти, хромопласти и лейкопласти. Совокупность пластид в клетке называют пластидом. Каждый из этих типов при определенных условиях может переходить один в другой. Как и митохондрии, пластиды содержат собственные молекулы ДНК. Поэтому они также способны размножаться независимо от деления клетки.

Пластиды бывают разные:

- **Хлоропласти** — пластиды, в которых осуществляется фотосинтез.
- **Хромопласти** — окрашенные пластиды. Цвет их обусловлен наличием следующих пигментов: каротина (оранжевожелтый), ликопина (красный) и ксантофилла (желтый). Хромопластов особенно много в клетках лепестков цветков и оболочек плодов.
- **Лейкопласти** — бесцветные пластиды округлой, яйцевидной, веретенообразной формы. Находят в подземных частях растений, семенах, эпидермисе, сердцевине стебля. Основная функция лейкопластов — это аккумуляция питательных веществ.

Теперь немного про их ДНК. Их характерные черты:

- Митохондрии и пластиды имеют собственную специфическую систему синтеза белков (ДНК, РНК, рибосомы). Специфичность этой системы заключается в автономности и резком отличии от таковой в клетке;
- ДНК митохондрий и пластид представляет собой небольшую циклическую или линейную молекулу, которая отличается от ДНК ядра и по своим характеристикам приближается к ДНК прокариотических клеток. Синтез ДНК митохондрий и пластид не зависит от синтеза ядерной ДНК;
- В митохондриях и хлоропластах имеются иРНК (информационная), тРНК (транспортная), рРНК (рибосомная). Рибосомы и рРНК этих органоидов резко отличаются от таковых в цитоплазме. В частности рибосомы митохондрий и хлоропластов, в отличие от цитоплазматических рибосом, чувствительны к антибиотику хлорамфениколу, подавляющему синтез белка у прокариотических клеток.

1.6.3. Плазмида

Это небольшие молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации. Главным образом плазмиды встречаются у бактерий, а также у некоторых архей и эукариот (грибов и высших растений). Чаще всего плазмиды представляют собой двухцепочечные кольцевые молекулы. Несмотря на способность к размножению, плазмиды, как и вирусы, не рассматриваются в качестве живых организмов. Плазмиды в основном кодируют функции, придающие бактерии преимущество в случае попадания в неблагоприятные условия (например, устойчивость к антибиотикам или, наоборот, синтез антибиотических веществ).

Размеры плазмид варьируют от менее чем 1 тысячи до 400—600 тысяч пар оснований (п. о.). Некоторые плазмиды содержатся в клетке в количестве одной двух копий, другие — в количестве нескольких десятков. Плазмиды разных классов могут существовать в клетке.




Рис. 2. Плазмиды и хромосомная ДНК в бактериальной клетке

2. Второй билет. Основные классы биологический молекул, ДНК, генетический код

Кто хочет подробней открывайте Альбертса с 59ой страницы. Тут только малая часть того что там есть

2.1. Основыне классы биологический молекул

Углеводны Они же сахара. Содержат альдегидную группу C=O A так же несколько гидроксильных групп O – H. Простейшим примером является глюкоза $C_6H_{12}O_6$, которая частный случай моносахарида $(CH_2O)_n$ где n любое натуральное число. Углеводы могут существовать либо в форме кольца, либо в виде открытой цепи. К одному кольцу может через атом углерода альдегидной группы присоединиться еще одно кольцо, образуя дисахарид. Например мальтоза (см картинку ниже). Можно образовывать еще большие последовательности, называются полисахаридами.





Рис. 3. Глюкоза и мальтоза

Глюкоза служит главным источником энергии во многих клетках. В результате последовательного ряда реакций окисления эта гексоза превращается в различные производные Сахаров с меньшей длиной цепи и в конечном итоге распадается до CO_2 и H_2O . В ходе распада глюкозы высвобождается энергия и генерируется восстановительная способность, без чего невозможно протекание биосинтетических реакций. Высвобождающаяся энергия и генерируемая восстановительная сила запасаются в форме двух важнейших соединений - ATP и NADH. Так же из углеводов состоит важный внеклеточный структурный материал (например целлюлоза)


Липиды они же жиры. У них обычно имеются две различные части: длинная углеводородная цепь, которая имеет гидрофобный характер (водонерасторима) и химически мало активна, и карбоксильная группа, ионизирующаяся в растворе, крайне гидрофильная (водорастворимая) и легко образующая эфиры и амиды.

Жирные кислоты являются ценным источником энергии, поскольку их расщепление сопровождается образованием такого количества АТР, которое в два раза превышает образование АТР при расщеплении такого же количества (по массе) глюкозы. Жирные кислоты запасаются в цитоплазме многих клеток в виде капелек триацилглицеролов (триглицеридов). Молекулы триацилглицеролов состоят из трех цепей жирных кислот, каждая из которых присоединена к молекуле глицерола именно так устроены животные жиры, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни.

Но самая важная функция жирных кислот - участие в построении клеточных мембран. Эти тонкие плотные пленки, которыми одеты все клетки и внутриклеточные органеллы, состоят главным образом из фосфолипидов




Аминокислоты органические вещества которые состоят из аминогруппы и карбоксильной группы



Аминокислоты служат строительными блоками при синтезе белков - длинных линейных полимеров аминокислот, соединенных «хвост к голове» при помощи пептидной связи между карбоксильной группой одной аминокислоты и аминогруппой другой. В белках встречается обычно 20 аминокислот с разными радикалами. Одни и те же 20 аминокислот неоднократно повторяются во всех белках, в том числе в белках бактериального, животного и растительного происхождения.

Нуклеотиды Нуклеотиды являются сложными эфирами нуклеозидов и фосфорных кислот.



Цитозин (C), тимин (T) и урацил (U) называются пуриновыми основаниями, так как они представляют собой простые производные шестичленного пуринового кольца; гуанин (G) и аденин (A) - пиримидиновые основания, второе пятичленное кольцо которых сконденсировано с шестичленным циклом.

Нуклеотиды могут выступать в качестве переносчиков энергии. При этом трифосфатный эфир аденина АТР (рис. 2-9) гораздо чаще, чем другие нуклеотиды, участвует в переносе энергии между сотнями индивидуальных внутриклеточных реакций. Энергия высвобождающаяся в результате гидролиза АТФ может использоваться в любой другой реакции которая проходит с поглощением энергии.




Рис. 2-9. Химическое строение аденоинтрифосфата (АТР). Показаны пространственная модель (A) и структурная формула (Б) молекулы.


Другие производные нуклеотидов служат переносчиками отдельных химических групп, таких, как атомы водорода или остатки Сахаров, с одной молекулы на другую. Кроме того,

циклическое фосфорилированное производное аденинациклический АМР (сAMP) - служит универсальным внутриклеточным сигналом и регулирует скорость множества различных внутриклеточных реакций.

Нуклеотиды служат строительными блоками для синтеза нуклеиновых кислот - длинных полимеров, в которых нуклеотидные субъединицы соединяются между собой ковалентной связью, образуя фосфорный эфир между 3'-гидроксильной группой остатка сахара одного нуклеотида и 5'-фосфатной группой. Нуклеиновые кислоты, сахар которых представлен рибозой, называются рибонуклеиновыми кислотами или **РНК**; они содержат основания A, U, G и C. Те нуклеиновые кислоты, в состав которых входит дезоксирибоза (в ней гидроксильная группа при C-2 рибозы замещена на атом водорода), называются дезоксирибонуклеиновыми кислотами или **ДНК**; они содержат основания A, T, G и C. Способность к спариванию G с C и A с T лежит в основе механизмов хранения и передачи наследственно информации.


2.2. Формы ДНК

Наиболее распространой является В-форма. В этой форме находится основная часть ДНК в клетках. При такой организации плоскости азотистых оснований практически перпендикулярны оси двойной спирали, и каждая пара повёрнута относительно предыдущих на 36°. На один виток спирали приходится примерно 10 нуклеотидных пар (9,7 и 10,6 в различных кристаллах)(2), а длина составляет 3,4 нм.



Существенным отличием А-формы от В-формы является то, что в А-форме пары оснований сдвинуты к периферии спирали почти на половину её радиуса, в результате чего пространство вдоль оси оказывается пустым. Большая бороздка при этом становится глубже и уже, а малая бороздка оказывается шире и более плоской

Z-DNA



 VISUAL SCIENCE
Scientific illustration, animation, design

Z-ДНК, вид сбоку

Z форма представляет собой левозакрученную спираль с длиной витка 4,4 нм, на который приходится 12 нуклеотидных пар.

2.3. Отличие эукариот от прокариот

Прокариоты не имеют оформленного ядра. Их хромосомы имеют кольцевую форму. А гены объединены в опероны. Эукариотические клетки по определению и в отличие от прокариотических имеют ядро (по гречески «карион»). Ядро, в котором находится большая часть клеточной ДНК, ограничено двойной мембраной.

2.4. Генетический код

Генетический код - совокупность правил, согласно которым в живых клетках последовательность нуклеотидов (ген и мРНК) переводится в последовательность аминокислот (белок).

Ген - участок ДНК определяющий определенную последовательность аминокислот.

Аллели - различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом, определяют направление развития конкретного признака


2.5. Митоз и мейоз

Существует два типа деления клеток эукариот: митоз и мейоз. При митозе хромосомный набор (пloidность) клетки не меняется, обе дочерние клетки полностью генетически идентичны исходной. Это обычный способ деления клеток, например, при формировании тел многоклеточных животных и растений. В результате мейоза, который включает в себя 2 деления, из одной диплоидной клетки получается 4 гаплоидных, причем все они генетически отличаются друг от друга. Это может происходить при формировании гамет или спор.


Мейоз (редукционное деление клетки) — деление, в процессе которого из одной диплоидной клетки получаются 4 гаплоидные клетки.

Схема мейоза

Мейоз I



Мейоз II




Мейоз у животных наблюдается при формировании гамет (гаметогенез). Мейоз у растений и грибов, как правило, происходит при образовании гаплоидных спор. У различных одноклеточных эукариот мейоз может наблюдаться на разных стадиях жизненного цикла. Для восстановления диплоидности в цикле всегда необходимо слияние гаплоидных клеток (оплодотворение).

Мейоз состоит из двух делений. Первое из них является собственно редукционным, то есть именно в ходе первого деления уменьшается плюидность клетки. Причиной этого служит расходжение гомологичных хромосом («материнской» и «отцовской») по двум разным дочерним клеткам. Второе деление аналогично митозу и называется эквационным (то есть «равным»). Плюидность в результате второго деления не меняется. В ходе этого деления, как и при митозе, расходятся сестринские хроматиды (копии ДНК). Между двумя делениями мейоза отсутствует репликация ДНК (так как «цель» мейоза — уменьшить плюидность клетки, увеличивать количество ДНК здесь незачем).

В профазе I деления мейоза происходит важнейший процесс, относящийся к генетической рекомбинации — кроссинговер, то есть обмен участками гомологичных хромосом.

Митоз - непрямое деление клетки, наиболее распространённый способ репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений. **Митоз лежит в основе бесполого размножения, от отличие от мейоза.**



Профаза это подготовительный этап. ДНК удваивается и расходятся, они остаются соединены только в центромере. Образуется веретено деления. Микротрубочки веретена деления прикрепляются к хромосомам.

Затем наступает метафаза. За счет изменения длины нитей веретена хромосомы перемещаются в среднюю часть клетки, образуя экватор деления.

За метафазой наступает анафаза (см. рис. 6). Центромеры сестринских хроматид разделяются, нити веретена укорачиваются, в результате дочерние хроматиды расходятся к противоположным полюсам

Митоз завершается телофазой, в которой восстанавливается исходная структура ядер. Вокруг каждого набора хромосом у полюсов деления формируется новая ядерная оболочка

3. Репликация ДНК: репликация линейных и кольцевых молекул ДНК, Затравка для ДНК-полимеразы, праймирование, фрагменты Оказаки. Ферменты, необходимые для репликации ДНК (полимеразы I и III, топоизомеразы, хеликаза, лигаза, праймаза, ssb). Теломеры и центромеры эукариот. Ориджины репликации бактерий. Белки определяющие начало репликации бактерий (DnaABC, ssb, SeqA, dam) Репликация кольцевых молекул ДНК по Тета –типу и по типу катящегося колеса

Репликация ДНК - процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе одной родительской молекулы ДНК.

Двухцепочечная молекула ДНК может быть линейной (у эукариот, организмов, клетки которых имеют клеточное ядро) или свернутой в кольцо (у прокариот, клетки которых не имеют ядра).

Про особенности репликации двухцепочечных линейных и кольцевых молекул см. ниже.

3.1. Общее описание механизма репликации

Двухцепочечная молекула ДНК может быть линейной (у эукариот, организмов, клетки которых имеют клеточное ядро) или свернутой в кольцо (у прокариот, клетки которых не имеют ядра).

Про особенности репликации двухцепочечных линейных и кольцевых молекул см. ниже.

3.2. Общее описание механизма репликации

Что имеем в начале: клетка, у клетки есть ДНК. Клетка собирается делиться, ей надо **реплицировать** (скопировать) свою ДНК для двух дочерних клеток.

- Репликация начинается в определенном месте материнской ДНК с расплетания топоизомеразой двойной спирали (см. рис. 4, 5).
- Хеликаза садится на выпрямленную двойную цепь ДНК и разделяет ее на две одиночные цепи ДНК. При этом формируется **репликационная вилка**.
- SSB-белки (белки, связывающие одиночную цепь ДНК, англ. single-strand binding protein) удерживают две материнские цепи ДНК от связывания обратно. Получившаяся на этом этапе конструкция из ДНК и белков называется **репликационной вилкой**.
- К каждой из получившихся одиночных цепей ДНК теперь будет синтезироваться комплементарная цепь из плавающих вокруг дезоксирибонуклеотидов.
- **Процесс на лидирующей цепи 3'-5'.** Праймаза ставит на цепь 3'-5' (относительно направления расплетания двойной цепи) праймер - РНК-затравку для посадки ДНК-полимеразы. Садится ДНК-полимераза и едет по материнской цепи ДНК, синтезируя комплементарную ей цепь из свободно плавающих нуклеотидов. ДНК-полимераза умеет

присоединять только 5' конец предыдущего дезоксирибонуклеотида к 3' концу следующего дезоксирибонуклеотида.

- **Процесс на отстающей цепи 5'-3'.** Праймаза ставит праймер для полимеразы. ДНК-полимераза садится на него и синтезирует небольшой фрагмент ДНК (**фрагмент Оказаки**) в обратном направлении относительно расплетания материнской ДНК. Фрагменты Оказаки сшиваются лигазой.
- В итоге имеем две дочерние двунитевые молекулы ДНК вместо одной материнской.

Репликационная вилка движется со скоростью порядка 100 000 пар нуклеотидов в минуту у прокариот и 500—5000 — у эукариот.



Рис. 4. Схема репликационной вилки (выше) и репликационного глазка (ниже). Репликационная вилка на втором рисунке - область, где материнская двухцепочечная молекула расходится на две. Стрелочками обозначено то, что вилки удаляются друг от друга, двигаясь по материнской (шаблонной) ДНК в направлении от 3' к 5' концам.

3.3. Ферменты, необходимые для репликации ДНК

- **Топоизомераза** - фермент, раскручивающий спираль ДНК. Едет вдоль закрученной двойной спирали ДНК и ставляет за собой две водородно связанные цепочки ДНК, лежащие в одной плоскости. (здесь и далее смотреть на картинку 5).
- **Хеликаза** - фермент, рвущий водородные связи между двумя цепочками ДНК. Едет за топоизомеразой по двум связанным цепям ДНК и оставляет за собой две несвязанные цепи ДНК.

- **Полимераза** (ДНК полимераза) - фермент, полимеризующий молекулу ДНК. Всегда едет по цепи ДНК в направлении 3'-5', смотрит на нее как на шаблон и достраивает комплементарную ей цепь из свободно плавающих дезоксирибонулеотидов.

ДНК-полимераз существует несколько типов. У бактерий **ДНК-полимераза I** удаляет РНК-фрагменты на отстающей цепи и ставит на их место ДНК, **ДНК-полимераза II** участвует в репарации (восстановлении сломанных кусочков) ДНК, **ДНК-полимераза III** просто основной фермент (именно она делает почти всю работу в синтезировании ДНК с лидирующей и отстающей цепей).

- **Лигаза** (ДНК-лигаза) - фермент, ковалентно спивающий цепи ДНК в местах разрыва. Едет по отстающей цепи ДНК и спивает фрагменты ОКазаки.
- **Праймаза** - фермент, синтезирующий РНК-затравку (праймер) — короткий фрагмент РНК, которая является инициатором в работе ДНК-полимеразы (полимераза не способна синтезировать ДНК с нуля, но может добавлять нуклеотиды к уже имеющимся).
- **SSB-белки** - ферменты, предотвращающие диссоциацию полимеразы от матрицы ДНК и повышающие эффективность ее работы. Окружают кольцом ДНК и «скользят» по ней вместе с продвигающимся вперед ферментом ДНК-полимеразы.




Рис. 5. Белки, участвующие в процессе репликации

3.4. Теломеры и центромеры эукариот

Теломеры - концевые участки хромосом. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.

В каждом цикле деления теломеры клетки укорачиваются из-за неспособности ДНК-полимеразы синтезировать копию ДНК с самого конца. Она в состоянии лишь добавлять нуклеотиды к уже существующей 3'-гидроксильной группе. Данный феномен носит название концевой недорепликации и является одной из важнейших причин биологического старения.

Тем не менее, вследствие этого явления теломеры должны укорачиваться весьма медленно — по несколько (3-6) нуклеотидов за клеточный цикл.




Рис. 6. Концевые участки хромосом, теломеры

Центромеры — участок хромосомы, который связывает сестринские хроматиды, играет важную роль в процессе деления клеточного ядра и участвует в контроле экспрессии генов. Характеризуется специфическими последовательностью нуклеотидов и структурой.




Рис. 7. Центральные участки хромосом, центромеры

3.5. Ориджины репликации у бактерий

Точка начала репликации (англ. origin of replication) — это фрагмент молекулы нуклеиновой кислоты, с которого начинается её репликация. Точка начала репликации и прилегающие к ней фрагменты нуклеиновой кислоты, не отделённые сайтами терминации, составляют единицу репликации — репликон. Репликация ДНК может начинаться от точки начала репликации в одном или двух направлениях.

Хромосомы и плазмиды (внекромосомный самовоспроизводящийся генетический элемент, специфичен для прокариот) прокариот (в частности, бактерий) содержат одну, реже несколько точек начала репликации ДНК (хромосомы эукариот имеют множество таких точек).

3.6. Белки, определяющие начало репликации у бактерий

Проиллюстрируем на примере *Escherichia coli*.

Генетический локус, содержащий единственную точку начала репликации хромосомы *Escherichia coli* (кишечной палочки), получил название oriC. OriC состоит из 245 пар оснований и включает две функциональных области: область специфичного связывания фактора инициации репликации DnaA (англ.) и область первичного раскручивания спирали ДНК — DUE (англ. DNA unwinding element).

3.7. Репликация кольцевых молекул ДНК по тета-типу

Репликация по тета-механизму включает в себя следующие этапы:

- расплетание двух родительских цепей;
- синтез праймерной РНК (пРНК) на каждой из них;
- инициация репликации при помощи ковалентного нарастания пРНК на каждой из них;
- синтез комплементарной цепи ДНК на каждой из родительских цепей. Одна из цепей при этом выступает лидирующей, другая — отстающей, хотя синтез цепей происходит одновременно.

Тета-репликация может начинаться одновременно с одной или нескольких точек и быть при этом одно- или двунаправленной. В электронный микроскоп репликационная структура выглядит как греческая буква θ , отчего и называется тета-структурой (см. рис. 8).

3.8. Репликация кольцевых молекул ДНК по типу катящегося колеса

Сущность этого механизма заключается в следующем. Вначале инициаторный белок Rep совершаet одноцепочечный разрыв в цепи ДНК. Появившаяся при этом свободная 3'-ОН-группа служит праймером для синтеза ДНК ДНК-полимеразой III клетки-хозяина. Синтезируется лидирующая цепь и восстанавливается двухцепочечная структура исходной ДНК. Содержащая разрыв цепь ДНК при этом удаляется, и происходит её репликация ДНК-полимеразой III, сопровождающаяся созданием праймера РНК-полимеразой. После полной репликации ДНК-полимераза I заменяет праймер на ДНК, а ДНК-лигаза спивает концы, образуя тем самым окончательную двухцепочечную ДНК (см. 9).




Рис. 8. Этап репликации по тета-типу. Видно две репликационные вилки, разъезжающиеся друг от друга (показано стрелочками). Ori - место начала репликации (ориджин).




Рис. 9. Этапы репликации по типу катящегося колеса

4.

5.

6. Репликоны. Инициация раунда репликации ДНК Escherichia coli. Белки участвующие в регуляции инициации репликации (DnaABC, ssb, SeqA, dam). Топологические проблемы репликации. Сегрегация репликонов по бактериальным клеткам. Репликация плазмид, мобильных элементов, фагов и вирусов. Особенности репликации в эукариотах. Теломеры и центромеры. Сегрегация хромосом.

6.1. Репликоны

Репликон — молекула или участок ДНК или РНК, реплицирующийся из одного места начала репликации.

Задача: реплицировать ДНК.

Как ее можно решать: посадить белки в одном месте и проехать ими по всей ДНК (бактерии) или распараллелить процесс, посадив много белков в разных местах (эукариоты).

Например, у прокариот кольцевая ДНК имеет одну точку начала репликации, таким образом, она вся - репликон (см. рис. 10). У эукариот длинная линейная ДНК имеет множество точек начала репликации, то есть у нее много репликонов (см. рис. 10, ??).




Рис. 10. Иллюстрация репликонов бактерий и эукариотов. Слева - кольцевая ДНК кишечной палочки, у нее одно место начала (ori) репликации и она сама один репликон. Справа - линейная ДНК эукариот со множеством репликонов. Стрелочками обозначены движения репликационных вилок.

6.2. Инициация раунда репликации ДНК Escherichia coli. Белки участвующие в регуляции инициации репликации (DnaABC, ssb, SeqA, dam).

Здесь мы рассмотрим подробно процесс запуска репликации ДНК кишечной палочки с перечислением некоторых конкретных белков. (Подробнее о репликации см. билет 3.)

Имеется кольцевая двухцепочечная молекула ДНК со специальной точкой (читай, местом) начала репликации OriC. Клетка набрала достаточную массу для начала деления.




Рис. 11. Репликоны эукариот - участки от О (origin) до Т (termini).

- Белки dnaA узнают OriC, садятся на ДНК и начинают раскручивать его. То есть, если смотреть на принципиальную схему репликации (билет 3, рис. ??), dnaA является топоизомеразой кишечной палочки.
- Белок dnaC помогает белку dnaB сесть на ДНК и начать его разделять на две несвязанные цепи в том месте, где его расплела dnaA. Таким образом, dnaB - хеликаза кишечной палочки.
- SSB-белки удерживают две цепи ДНК, разделенные dnaB, от обратного связывания друг с другом.
- SeqA - белок, который садится на ДНК в области oriC после инициации репликации и не подпускает остальные белки для повторной инициации (потому что задача синтезировать две двухцепочечные молекулы ДНК из одной и распределить их по дочерним клеткам, а не размножать ДНК в геометрической прогрессии, пока у клетки не кончатся ресурсы).
- Dam - приходит на место посадки SeqA и «обрабатывает» (метилирует аденин) новые дочерние цепи ДНК так, чтобы на них dnaA не садилась уже по умолчанию (до тех пор, пока дочерняя клетка не вырастет), а не только пока их область OriC закрыт белками SeqA.

6.3. Топологические проблемы репликации.

При удвоении кольцевой ДНК бактерий могут получиться два кольца, сцепленных друг с другом (см. рис. 12). Их разделение производит топоизомеразу II, или гиразу. Она делает

разрыв, через который проводит двухцепочечную нить ДНК, и снова сшивает.




Рис. 12. Топологические проблемы репликации кольцевых молекул ДНК (на две материнских цепи ДНК в кольце тоже переплетены ирл, просто для упрощения восприятия их так нарисовали).

6.4. Сегрегация репликонов по бактериальным клеткам.

Прокариоты, в отличие от эукариот, не имеют такого сложного механизма деления клетки (см. билет про метоз и мейоз и сравнить с картинкой 13). Например, у них не образуется стадии «веретена». Конкретный механизм сегрегации хромосом (одна хромосома у прокариот является также репликоном, см. параграф выше) не описан.




Рис. 13. Деление бактериальной клетки: 1) начальное состояние, 2) репликация ДНК, 3) сегрегация хромосом по клеткам, 4-5) образование перегородки между клетками, 6) финал, две клетки.

6.5. Репликация плазмид, мобильных элементов, фагов и вирусов.

- **Плазмиды** - небольшие кольцевые молекулы ДНК бактерий, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации (то есть, вне стадии деления клетки). Они реплицируются по двум схемам: по типу катящегося колеса и по тета-типу (см. билет 3).
- **Мобильные генетические элементы** - куски генетического материала, которые могут путешествовать внутри генома и от одного организма к другому (буквально цепочки нуклеиновых кислот, отсоединяющиеся от хромосом в одном месте, диффундирующие, и встраивающиеся в другом)
- **Вирусы** - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирус фактически представляет собой небольшую белковую машину и генетический материал.

Вирус проникает в организм хозяина. Затем вирус прикрепляется к мембране клетки, специальными белками буравит клеточную мембрану и впускает внутрь свой генетический материал. Белки клетки начинают реплицировать генетический материал вируса и на его основе собирать белки, из которых получаются новые вирусы.

Когда все ресурсы клетки израсходованы, размножившиеся копии вируса разрывает клетку и высвобождаются для заражения новых клеток.

- **Бактериофаги** - вирусы, поражающие бактерии. К ним справедливо все то же самое, что изложено про вирусы.

6.6. Особенности репликации в эукариотах. Теломеры и центромеры. Сегрегация хромосом.

У эукариот молекулы ДНК линейны. Рассмотрим обычную (не половую, важно) клетку эукариот.

- Всю жизнь от рождения от материнской клетки дочерняя клетка живет с хромосомами. Хромосомы - длинные нити ДНК, на которых в некоторых местах еще сидят структурные белки. Число типов хромосом и число копий одного типа варьируется от вида к виду.
- Перед делением клетки ДНК хромосомы реплицируются и из одной материнской хромосомы получается две дочерние, называющиеся **сестринскими хроматидами** (см. рис. 14).
- Хроматиды связаны белками в некоторой области. Эта область называется **центромера** (рис. 15).
- Концевые участки хромосом называются **теломеры**.
- В процессе клеточного деления происходит **сегрегация хромосом**. Каждой из двух дочерних клеток переходит одна из сестринских хроматид (см. подробнее митоз и мейоз). А ОКАЗАВШИСЬ В ДОЧЕРНЕЙ КЛЕТКЕ ХРОМАТИДЫ УЖЕ НАЗЫВАЮТСЯ СНОВА ХРОМОСОМАМИ НЕНАВИЖУ ОБОЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГОВ




Рис. 14. Хроматиды и хромосомы




Схема строения хромосомы в метафазе митоза. 1 — хроматида; 2 — центромера; 3 — короткое плечо; 4 — длинное плечо.

Рис. 15. Хромосома, состоящая из двух хроматид

7. Мутагенез. Спонтанный мутагенез. Скорость мутагенеза. Индуцированный мутагенез. Репарация димеров тимина с помощью фотолиазы и эксцизионной репарации. Понятие сайт-специфического мутагенеза.

7.1. Мутагенез. Естественный мутагенез - Мутационная теория Де Фриза и Коржинского

Мутагенез — процесс изменения в нуклеотидной последовательности ДНК, приводящий к мутациям.

Мутационная теория составляет одну из основ генетики. В ее основу были заложены идеи Де Фриза и Коржинского.

Основные положения мутационной теории Коржинского — Де Фриза можно свести к следующим пунктам (кратко):

- 1) Мутации внезапны, как дискретные изменения признаков Новые формы устойчивы
- 2) В отличие от наследственных изменений, мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг какого-либо среднего типа. Они представляют собой качественные скачки изменений
- 3) Мутации проявляются по-разному и могут быть как полезными, так и вредными
- 4) Вероятность обнаружения мутаций зависит от числа исследуемых особей
- 5) Сходные мутации могут возникать неоднократно

7.1.1. Механизмы мутагенеза

Последовательность событий, приводящая к мутации выглядит следующим образом: происходит повреждение ДНК (если повреждение ДНК не было корректно reparировано, оно приведет к мутации); в случае, если повреждение произошло в незначащем фрагменте ДНК или если повреждение произошло в значащем фрагменте и, вследствие вырожденности генетического кода, не произошло нарушения, то мутации образуются, но их биологические последствия будут незначительными или могут не проявиться.

7.2. Скорость мутагенеза

Скорость мутагенеза - темп нуклеотидных замен.

Как посчитать?

Один из самых простых способов - изучение родословных с целью подсчета вновь возникающих мутаций с четким фенотипическим эффектом и высокой пенетрантностью (то есть таких мутаций, которые меняют фенотип строго определенным образом и наверняка). Как правило, для этого используют мутации, вызывающие врожденные патологии, так как они вызываются единичными мутациями.




Рис. 16. Скорость мутации, слева для вирусов и прокариот, справа для эукариот. По вертикали - темп нуклеотидных замен на миллиард пар оснований (bp - base-pair), по горизонтали - размер генома в миллионах оснований (Mb - Mega base). Вывод: для вирусов и прокариот чем сложнее организм, тем меньше скорость его мутагенеза, для эукариот - чем сложнее организм, тем выше скорость его мутагенеза.

7.3. Индуцированный мутагенез

Искусственный мутагенез широко используют для изучения белков и улучшения их свойств.

Ненаправленный мутагенез

Методом ненаправленного мутагенеза в последовательность ДНК вносятся изменения с определённой вероятностью под воздействием мутагенных факторов — мутагенных веществ, ультрафиолета, радиации.

Направленный мутагенез ПЦР - мутагенез

Изменения в ДНК вносятся в заранее известный сайт. Для этого синтезируют короткие одноцепочечные молекулы ДНК (праймеры), комплементарные целевой ДНК за исключением места мутации.

Вставной мутагенез

Создание мутаций ДНК путем добавления одной или более пар оснований.

7.4. Понятие сайт-специфического мутагенеза

Сайт-направленный мутагенез является методом молекулярной биологии, который используется, чтобы создать конкретные и преднамеренные изменения в последовательности ДНК, гена и продуктов генов.




Рис. 17. Сайт-направленный мутагенез. Синтезируют пару праймеров, несущих мутацию, и пару праймеров, комплементарных концам нужного фрагмента ДНК. В ходе первых двух реакций образуются фрагменты ДНК с мутацией, которые объединяют в третьей реакции. Полученный фрагмент вставляют в нужную генно-инженерную конструкцию.

7.5. Репарация димеров тимина с помощью фотолиазы и эксцизионной репарации

Пиримидиновый димер — дефект ДНК, возникающий в результате образования ковалентной связи между двумя соседними пиримидиновыми основаниями (тимином или цитозином) под действием ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовые лучи вызывают разрыв двойной связи

и образование в этом месте ковалентной связи между двумя нуклеотидами. Образование димера приводит к нарушению транскрипции ДНК на данном участке и возникновению мутаций.




Рис. 18. Дефект ДНК - димер тимина




Рис. 19. То, что образуется в результате дефекта. Слева: 6,4-фотопродукт. Справа: циклобутановый димер

7.5.1. Репарация ДНК

ДНК-фотолиаза

Один из способов удаления пиримидиновых димеров состоит в ферментативном превращении их в мономеры при освещении видимым светом в диапазоне длин волн 300–600 нм. ДНК-фотолиаза образует стабильный комплекс с пиримидиновым димером и, используя энергию поглощённого им света, разрушает димер без разрыва цепей ДНК.

Эксцизионная репарация нуклеотидов

Подразумевает удаление повреждённых азотистых оснований из ДНК и последующее восстановление нормальной структуры молекулы по комплементарной цепи. Ферментативная си-

стема удаляет короткую однонитевую последовательность двунитевой ДНК, содержащей повреждённые основания, и замещает их путём синтеза последовательности, комплементарной оставшейся нити.

8. Гомологичная рекомбинация. Модель Холлидея. Гены рекомбинации (*recA*, *ssb*, *ruvABC*). *RecA* и SOS-ответ. Сайт-специфическая рекомбинация. Рекомбинация в эукариотах. Кроссинговер.

Рекомбинация – возникновение новых последовательностей ДНК за счёт разрывов и пересоединений уже имеющихся молекул. **Синаптический комплекс** – комплекс из двух ДНК с перекрещивающимися цепями

8.1. Гомологичная (общая) рекомбинация, модель Холлидея

Обмен участками между гомологичными (практически одинаковыми по последовательностям) молекулам ДНК. За счёт гомологичной рекомбинации не создаются новые последовательности, а перемешиваются имеющиеся похожие варианты одной и той же последовательности.

Характеризуется следующими стадиями (Рис 20)

- 1) Делаются два разреза в одинаковых положениях цепи
- 2) Одна цепь высвобождается, за счёт *RecA* ищет гомологичный кусок
- 3) Образуется D-loop, засчёт того, что смешённая цепь вытеснила кусок другой
- 4) D-loop рвётся и образуется структура Холлидея

Крест Холлидея может двигаться при этом в обе стороны рекомбинирующих молекул, при этом сами молекулы врачаются вокруг своей оси, а гетеродуплексный (из разных кусков) участок удлиняется или укорачивается.

При этом цепи ДНК в гетеродуплексе не обязательно комплементарны и в результате рекомбинации могут образовывать разный результат. Если неспаренные основания не репарируются, то каждая цепь даст такой же дуплекс, как у родительской ДНК, если репарация происходит, то часть одной цепи станет совпадать со второй цепью.

Куски при этом можно по разному резать (см 20 д, е)

Таких структур может быть несколько, получаются из-за чего более сложные объекты




Рис. 20. Основные стадии общей рекомбинации

8.2. Гены рекомбинации

RecA – консервативный белок, который есть и у прокариотов, и у эукариотов, хотя при этом по нему можно получить мутацию. Важен для эволюции, поэтому как доп функция у бактерий – запускает SOS-ответ.

Умеет связываться с одноцепочечной ДНК (нарастает в сторону 3' конца) и искать гомологию, а потом переносить одноцепочечный фрагмент на двухцепочечный, который после расплетает, после чего формируется гетеродуплекс. Умеет связываться с двухцепочечной ДНК, но реже.


SSB – Связываются с одноцепочечной ДНК и не дают ей связаться в двойную цепь, что препятствовало бы рекомбинации. Также ускоряет среднюю скорость синтеза ДНК бактериальными и архейными полимеразами..

ruvABC

ruvA – связывается со всей структурой Холлидея и стабилизирует её

ruvB – белок, который вращает ДНК для продвижения креста. Тесно связывается с ruvA, поэтому вращение ДНК происходит ещё и относительно ruvA.

ruvC – белок, который разрезает структуру Холлидея симметрично с обеих сторон. У ruvC есть некоторая предпочтительная последовательность, поэтому разрезание происходит только на специфическом сайте.



8.3. SOS-ответ и recA

При малом количестве повреждений увеличивается количество uvrABCD.

При большом блокируется деление клеток и тем самым индуцируется синтез RecA, который нужен для рекомбинационной репарации. В активной конформации RecA стимулирует деградацию LexA (репрессора, в том числе себя и RecA, umuCD (ДНК полимераза-5), uvrABCD), после чего транскрибируются ген uvrB, продукты которого транскрибируются в экспрессионной репарации.

Также RecA может утиCD откусывается RecA, оставляя umuCD'

При ещё большем числе повреждений активируются umuCD, продукты которых позволяют полимеразе копировать нарушенный участок матрицы (вероятно позволяют им удлинять затравку), из-за чего больше мутаций.

8.4. Сайт-специфическая рекомбинация

Не требует протяжённых участков гомологии, но требуются строго определённые последовательности ДНК и специальный ферментативный аппарат.

Происходит обычно при встраивании бактериофага в геном бактерии.

Общая схема Последовательность, которая, способна к рекомбинации окружена специальными сайтами, которые узнаются рекомбиназой, а потом, например, меняют положение последовательности в последовательности. В зависимости от расположения сайтов рекомбинации получаются разные результаты, так как каждые сайты рекомбинации асимметричны.

Сам сайт при этом выглядит как асимметричный кусок посередине и два куска, которые одинаково читаются при прочтении с разных сторон (палиндромы). Каждые куски-палиндромы связываются с рекомбиназой, после чего вносятся разрывы в ДНК. (см Рис. 21). Сначала отрывается одна цепь, потом соединяется, формируя структуру, похожую на Холидеевский крест, а потом вторая нитка разрывается и перестраивается.




Рис. 21. Сайт-специфическая рекомбинация в общем виде

8.4.1. Транспозиция

Я не верю в адекватность пахома, так что пусть это тут тоже будет на всякий

Бывает нерепликативная и репликативная. Транспозоны (переезжающие куски) окружены похожими сайтами, как у сайт-специфической рекомбинации.

ДНК транспозоны Ген, необходимый для транспозиции (транспозон) окружён инвертированными концами. Дальше концов идут инвертированные концы (как палиндромы)

Инвертированные концевые повторы связываются, после них вносятся разрывы, а далее 3' концы встраиваются в ДНК, в которую будут вставляться транспозоны




Рис. 77. Механизм репликативной транспозиции
 [Транспозаза вносит одноцепочечные разрывы точно по концу транспозона и «косой» двуцепочечный разрыв в ДНК-мишени. Затем транспозаза объединяет концы разрыва мишени с концами транспозона. Возникает промежуточное соединение, напоминающее две направленные навстречу друг другу репликативные вилки. Репликация приводит к удвоению транспозона и, если транспозон и ДНК-мишень находились на разных репликонах, к образованию коннотеграта (слева)]

Рис. 22. Сайт-специфическая рекомбинация в общем виде

Вирус-подобные ретропозоны Длинные концевые повторы, потом посередине интеграза (встраивает в геном) и обратная транскриптаза.

Сначала в ретропозоне в крайнем промоторе транскрибируется полная копия генома, потом обратной транскрипцией РНК переходит в ДНК, в котором образуются повторы, которые также, как и в случае транспозонов встраиваются в ДНК

9. Рекомбинация в эукариотах

Мейотическая Перед первым делением мейоза хроматиды удерживаются вместе, но из-за кроссинговера гомологичные хромосомы тоже оказываются связаны (для правильной ориентации). Как правило рекомбинация начинается с одноцепочечного разрыва и происходит по модели Мезелсона Рэддинга (Рис 23)




Рис. 67. Модель рекомбинации Мезелсона и Рэддинга

[Согласно этой модели, протяженной гетеродуплексный участок возникает лишь на одной из рекомбинирующих молекул (асимметричный гетеродуплекс), что позволяет объяснить многочисленные генетические данные по рекомбинации в мейозе у аскомицетов. При рекомбинации возникает одна структура Холидея. Если ее разрезать по стрелкам 1, то обмена флангами рекомбинирующих молекул не происходит и наблюдается лишь генная конверсия (если гетеродуплекс репарируется) или постмейотическая сегрегация (слева внизу). При разрезании полухиазмы по стрелкам 2 происходит кроссинговер (справа внизу)]

Рис. 23. Мейотическая рекомбинация. Хиазм – область связывания засчёт кроссинговера, похожая на Холидеевский крест

Митотическая Рекомбинация происходит между гомологичными генами соматических клеток многоклеточных или при вегетативном росте одноклеточных. Большинство случаев рекомбинации связаны с репарацией. Притом стимулирует рекомбинацию не только разрыв, но и двуцепочечная брешь (Рис. 24). Характерно образование двух холидеевских крестов. Брешь при этом застраивается по образу и подобию неповреждённой молекулы. Центральную роль снова играет белок, похожий на RecA.




Рис. 64. Модель рекомбинации, инициируемой двуцепочечным разрывом одного из взаимодействующих дуплексов
 (Считается, что разрыв может расширяться до бреши за счет действия экзонуклеаз. Согласно этой модели, в ходе рекомбинации возникает промежуточное соединение с двумя холидеевскими структурами. Если обе полухиазмы разрезать одинаково, то рекомбинационное взаимодействие не будет сопровождаться кроссинговером, если же полухиазмы разрезать по-разному, то произойдет кроссинговер фланговых маркеров)

Рис. 24. Митотическая рекомбинация

Кроссинговер – рекомбинационный обмен участками гомологичных хромосом во время коньюгации (их спаривание) в профазе первого деления мейоза. (Разрыв и переклеивание родительских хромосом).

10.

11.

12.

13.