

# Kapitel 1

## Simpliziale Garben

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit simplizialen Objekten in der Kategorie der Garben auf einem topologischen Raum  $X$ . Während Simplizialkomplexe ungerichtete Graphen verallgemeinern, verallgemeinern simpliziale Mengen gerichtete Graphen, und werden uns so bei der geometrischen Realisierung von Objekten in Diagrammkategorien von Garben zur Verfügung stehen.

### 1.1 Simpliziale Mengen

Wir betrachten die Menge  $\Delta$  der nichtleeren endlichen Ordinalzahlen. Ihre Elemente sind von der Form  $\{0, 1, \dots, n\}$  für ein  $n \in \mathbb{N}$ , welche wir kurz mit  $[n]$  bezeichnen werden. Wir verstehen diese Mengen  $[n]$  als angeordnete Mengen.

**Definition 1.1.** Die Simplex-Kategorie  $\Delta$  ist die Kategorie der endlichen nichtleeren Ordinalzahlen versehen mit monotonen Abbildungen als Morphismen.

Ist  $C$  eine Kategorie, so bezeichnen wir eine Prägarbe auf  $\Delta$  mit Werten in  $C$  (d. h. einen Funktor  $\Delta^{\text{op}} \rightarrow C$ ) als simpliziales Objekt in  $C$ .

Unseren gewohnten Sprechweisen folgend nennen wir simpliziale Objekte in  $C$  auch kurz “simpliziale  $C$ ” und sprechen etwa von simplizialen Mengen und simplizialen Garben. Wir notieren die Funktorkategorien simplizialer Objekte in  $C$  auch kurz mit  $\text{s}C = [\Delta^{\text{op}}, C]$ . Opponiert bezeichnen wir einen Funktor  $\Delta \rightarrow C$  als kosimpliziales Objekt in  $C$ .

Für  $X \in \text{s}C$  ein simpliziales Objekt notieren wir kurz  $X_n = X([n])$  und für eine monotone Abbildung  $f : [m] \rightarrow [n]$  auch  $f^* = X(f)$ .

Die monotonen Abbildungen  $[m] \rightarrow [n]$  werden von zwei besonders einfachen Klassen monotoner Abbildungen erzeugt: von den *Randabbildungen*, den eindeutigen Injektionen  $d_i^n : [n-1] \rightarrow [n]$ , die  $i \in \{0, \dots, n\}$  nicht treffen, und den *Degenerationsabbildungen*, den eindeutigen Surjektionen  $s_i^n : [n+1] \rightarrow [n]$ , für die  $i \in \{0, \dots, n\}$  zweielementiges Urbild hat.

**Lemma 1.2** ([?], I.2, ex. 1). (i) Die Rand- und Degenerationsabbildungen erfüllen die Relationen

$$\begin{aligned} d_j^{n+1} d_i^n &= d_i^{n+1} d_{j-1}^n \quad \text{für } i < j, \\ s_j^n s_i^{n+1} &= s_i^n s_{j+1}^{n+1} \quad \text{für } i \leq j, \\ s_j^{n-1} d_i^n &= \begin{cases} d_i^{n-1} s_{j-1}^{n-2} & \text{für } i < j, \\ \text{id}_{[n-1]} & \text{für } i = j \text{ oder } i = j+1, \\ d_{i-1}^{n-1} s_j^{n-2} & \text{für } i > j+1. \end{cases} \end{aligned}$$

(ii) Sei  $f : [m] \rightarrow [n]$  monoton. Dann hat  $f$  eine eindeutige Darstellung

$$f = d_{i_1}^n \dots d_{i_s}^{n-s+1} s_{j_t}^{m-t} \dots s_{j_1}^{m-1}$$

mit  $n \geq i_1 > \dots > i_s \geq 0$ ,  $m > j_1 > \dots > j_t \geq 0$  und  $n = m - t + s$ .

(iii) Die vom Köcher der endlichen nichtleeren Ordinalzahlen mit den Rand- und Korandabbildungen und den angegebenen Relationen auf den Morphismenmengen erzeugte Pfadkategorie ist isomorph zu  $\Delta$ .

*Beweis.* (i) Durch Bildchen Zeichnen oder explizites Nachrechnen: Wir werten beide Abbildungen simultan auf allen Elementen aus und erhalten zum Beispiel für die erste Aussage:

$$\begin{aligned} &(0, 1, \dots, i-1, i, i+1, \dots, j-2, j-1, j, \dots, n-1) \\ &\xrightarrow{d_i^n} (0, 1, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, j-1, j, j+1, \dots, n) \\ &\xrightarrow{d_j^{n+1}} (0, 1, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, j-1, j+1, j+2, \dots, n+1) \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} &(0, 1, \dots, i-1, i, i+1, \dots, j-2, j-1, j, \dots, n-1) \\ &\xrightarrow{d_{j-1}^n} (0, 1, \dots, i-1, i, i+1, \dots, j-2, j, j+1, \dots, n) \\ &\xrightarrow{d_i^{n+1}} (0, 1, \dots, i-1, i+1, i+2, \dots, j-1, j+1, j+2, \dots, n+1). \end{aligned}$$

- (ii) In einer solchen Darstellung gibt  $m - t$  die Anzahl der Funktionswerte der Abbildung an, die  $j_k$  beschreiben die Partition von  $(0, \dots, m)$  in zusammenhängende Abschnitte mit demselben Funktionswert und die  $i_k$  bestimmen die Funktionswerte selbst.
- (iii) Jeden Morphismus in der Pfadkategorie, d. h. jedes Tupel komponierbarer Rand- und Degenerationsabbildungen kann mit den Relationen aus dem ersten Teil auf eine Form wie in (ii) gebracht werden. Umgekehrt ist nach (ii) jede monotone Abbildung aber auch als ein solcher Pfad darstellbar. Den Isomorphismus definiert also der Funktor, der auf Objekten durch die Identität und auf Morphismen durch die offensichtliche Zuordnung der Erzeuger der Pfadkategorie auf die jeweiligen Rand- und Degenerationsabbildungen gegeben ist.

□

Die einfachsten Beispiele nichttrivialer simplizialer Mengen sind die Standard- $n$ -Simplizes, die sich als die darstellbaren Funktoren  $\Delta^n = \Delta(\cdot, [n])$  beschreiben lassen. Wir erhalten den Funktor

$$\begin{aligned} R : \Delta^{\text{op}} &\rightarrow \mathbf{sEns}, \\ [n] &\mapsto \Delta^n = \Delta(\cdot, [n]), \end{aligned}$$

der auf Morphismen durch Vorschalten gegeben ist, welches wir mit  $f \mapsto f^*$  notieren.

Ist  $X \in \mathbf{sEns}$  eine simpliziale Menge, so bezeichnen wir  $X_n := X([n])$  als die Menge der  $n$ -Simplizes von  $X$ . Nun sind die  $n$ -Simplizes von  $X$  gerade die “Bilder des  $n$ -ten Standardsimplizes in  $X$ ” sind, präziser

$$X_n \xrightarrow{\sim} \mathbf{sEns}(\Delta^n, X).$$

In der Tat besagt das Yoneda-Lemma, dass die Transformationen des freien Funktors  $\Delta^n = \Delta(\cdot, [n])$  zum Funktor  $X$  in natürlicher Bijektion stehen zu  $X([n])$ .

Das anschließende Lemma zeigt, dass sich eine simpliziale Menge  $X$  vollständig durch ihre Simplizes  $\Delta^n \rightarrow X$  verstehen lässt. Dazu erklären wir zunächst Slice-Kategorien, Kategorien von Objekten über einem gegebenen Objekt bzw. Spezialfälle von Komma-Kategorien.

**Definition 1.3.** Sei  $r : C \rightarrow D$  ein Funktor und  $X \in D$  ein Objekt. Dann bezeichnet  $C \downarrow_r X$  die Slice-Kategorie der Objekte von  $C$  über  $X$  mittels  $r$ , deren Objekte Objekte  $Y \in C$  samt einem Morphismus  $\pi_Y : rY \rightarrow X$  sind und deren Morphismen Morphismen  $f : Y \rightarrow Z$  in  $C$  sind, für die  $rf$  ein Morphismus über  $X$  ist, d. h.  $\pi_Y = \pi_Z \circ rf$  gilt.

Wir bezeichnen die Slice-Kategorie  $\Delta \downarrow_r X$  als die Simplexkategorie von  $X$ . Konkret ist darin ein Objekt ein Morphismus  $\Delta^n \rightarrow X$  und ein Morphismus ein von  $[n] \rightarrow [m]$  induzierter Morphismus simplizialer Mengen  $\Delta^n \rightarrow \Delta^m$  über  $X$ .

**Lemma 1.4.** Sei  $X \in \mathbf{sEns}$  eine simpliziale Menge. Dann gilt

$$X \xrightarrow{\sim} \text{col}_{\Delta^n \rightarrow X} \Delta^n,$$

mit dem Kolimes über die Simplexkategorie von  $X$ .

*Beweis.* Bezeichne  $K$  obigen Kolimes. Das System, über das der Kolimes gebildet wird, sichert uns nach der universellen Eigenschaft des Kolimes einen Morphismus  $K \rightarrow X$ . Wir müssen also zeigen, dass dieser Bijektionen auf den  $n$ -Simplizes induziert. Tatsächlich definiert ein  $n$ -Simplex  $\Delta^n \rightarrow K$  durch Nachschalten von  $K \rightarrow X$  einen  $n$ -Simplex in  $X$ . Diese Zuordnung ist bijektiv, denn wir erhalten eine Umkehrabbildung, wenn wir  $\Delta^n \rightarrow X$  den zugehörigen Morphismus in den Kolimes  $\Delta^n \rightarrow K$  zuordnen.  $\square$

Der Beweis benötigte keine konkreten Eigenschaften der simplizialen Mengen. Wir halten mit wörtlich übertragenen Beweis allgemein fest:

**Proposition 1.5.** *Sei  $F : C \rightarrow \text{Ens}$  ein Funktor. Dann ist  $F$  ein Kolimes über darstellbare Funktoren  $C(X, \cdot)$ .*

*Beweis.* Wir betrachten mittels des Funktors  $r : C \rightarrow \text{Ens}^C, X \mapsto C(X, \cdot)$  die Slice-Kategorie  $C \downarrow_r F$  der darstellbaren Funktoren über  $F$  und dann das System in  $\text{Ens}^C$ , das daraus durch Vergessen der Transformationen nach  $F$  hervorgeht. Wir bezeichnen wieder den Kolimes darüber mit  $K$  und erhalten mit der universellen Eigenschaft eine Transformation  $K \Rightarrow F$ . Diese ist eine Isotransformation, wenn sie auf allen Objekten  $X \in C$  Bijektionen  $KX \xrightarrow{\sim} FX$  induziert. Nach dem Yoneda-Lemma entsprechen diese den Transformationen  $C(X, \cdot) \Rightarrow K$  bzw.  $C(X, \cdot) \Rightarrow F$ . Diese stehen aber nach der universellen Eigenschaft des Kolimes und der Definition der Kategorie  $C \downarrow_r F$  in Bijektion durch Nachschalten von  $K \Rightarrow F$ .  $\square$

## 1.2 Der kosimpliziale Raum der Standardsimplizes

Die geometrische Realisierung einer simplizialen Menge soll sich mit geeigneten Identifikationen aus den geometrischen Realisierungen von Standard- $n$ -Simplizes zusammensetzen. Diese definieren wir als die abgeschlossenen geometrischen Standard- $n$ -Simplizes

$$|\Delta^n| = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid 0 \leq x_i \leq 1, \sum_{i=0}^n x_i = 1\}.$$

Ein Morphismus  $f : [m] \rightarrow [n]$  induziert eine stetige Abbildung  $|f| : |\Delta^m| \rightarrow |\Delta^n|$  auf den zugehörigen Simplizes. Nach 1.2 reicht es, diese für Rand- und Degenerationsabbildungen anzugeben. Für die Randabbildung  $|d_i|$  handelt es sich dabei um die Inklusion der  $i$ -ten Kante, d. h. in Koordinaten das Einfügen einer Null an der  $i$ -ten Stelle, für die Degenerationen  $|s_i|$  um den Kollaps der  $i$ -ten Kante, d. h. in Koordinaten die Ersetzung der  $i$ -ten und ihrer darauffolgenden Koordinate durch ihre Summe. In Formeln:

$$\begin{aligned} |d_i^n|(x_0, \dots, x_{n-1}) &= (x_0, \dots, x_{i-1}, 0, x_i, \dots, x_{n-1}), \\ |s_i^n|(x_0, \dots, x_{n+1}) &= (x_0, \dots, x_{i-1}, x_i + x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{n+1}). \end{aligned}$$

Wir erhalten einen Funktor  $R : \Delta \rightarrow \text{Top}, [n] \mapsto \Delta^n$ , genannt der *kosimpliziale Raum der Standardsimplizes*.

## 1.3 Geometrische Realisierung simplizialer Mengen

Wir erklären nun die geometrische Realisierung simplizialer Mengen. Der Unterschied zur geometrischen Realisierung von Simplizialkomplexen ist im Wesentlichen die Möglichkeit, Simplizes wiederzuverwenden und zu degenerieren, was zu

Identifikationen in der geometrischen Realisierung führt. Ein Fall von “Wiederverwendung” ist etwa die Realisierung der  $S^1$  als 1-Simplex, dessen Endpunkte übereinstimmen. Degeneration bedeutet, dass niederdimensionale Simplizes auch die Rolle höherdimensionaler Simplizes übernehmen können. Wir können etwa unser Beispiel modifizieren und die  $S^n$  als  $n$ -Simplex realisieren, bei dem alle niederdimensionalen Kanten in einem Punkt zusammenfallen.

Die geometrische Realisierung von Standard- $n$ -Simplizes haben wir gerade gesehen. Nun fordern wir, dass sich die Realisierung mit Kolimites vertrage:

$$|\operatorname{col}_i X_i| \xrightarrow{\sim} \operatorname{col}_i |X_i|.$$

Wenn dies der Fall sein soll, so müssen wir mit der Darstellung

$$X := \operatorname{col}_{\Delta^n \rightarrow X} \Delta^n$$

aus ?? auf jeden Fall setzen

$$|X| := \operatorname{col}_{\Delta^n \rightarrow X} |\Delta^n|.$$

Debei wird der Kolimes wieder über die Simplexkategorie von  $X$  gebildet, nun allerdings mit den induzierten stetigen Abbildungen aus ?? als Systemmorphis-men.

Ein Morphismus simplizialer Mengen  $X \rightarrow Y$  induziert nun durch Nachschalten von  $X \rightarrow Y$  einen Funktor auf den Simplexkategorien  $\Delta \downarrow X \rightarrow \Delta \downarrow Y$  und damit auch auf den Kolimites eine stetige Abbildung  $|X| \rightarrow |Y|$ . Wir erhalten also den Funktor der geometrischen Realisierung  $|\cdot| : \mathbf{sEns} \rightarrow \mathbf{Top}$ .

Unsere Konstruktion erfüllt tatsächlich:

**Proposition 1.6.** *Der Funktor der geometrischen Realisierung simplizialer Mengen  $|\cdot|$  vertauscht mit beliebigen Kolimites über kleine Indexkategorien.*

*Beweis.* Zu zeigen ist, dass die Bildung der Simplexkategorie mit Kolimites vertauscht, d. h. für einen Funktor  $X : I \rightarrow \mathbf{sEns}$  gilt:

$$\Delta \downarrow_r \operatorname{col}_i X_i \xrightarrow{\sim} \operatorname{col}_i \Delta \downarrow_r X_i.$$

Beide Kategorien bestehen aber aus Objekten der Form  $\Delta^n \rightarrow X_i$  für ein  $i \in I$ , die identifiziert werden, falls sie durch Nachschalten von  $X_i \rightarrow X_j$  auseinander hervorgehen.  $\square$

Wie ganz allgemein können wir den Kolimes topologischer Räume auch explizit mittels Koprodukt und Koegalisor ausschreiben. Wir verstehen die Mengen  $X_n$  als diskrete topologische Räume und erhalten:

$$|X| \xrightarrow{\sim} (\coprod_n X_n \times |\Delta^n|) / \sim$$

mit der Quotiententopologie, die durch die von

$$(x, |f|(p)) \sim (f^*(x), p)$$

für alle monotonen  $f : [m] \rightarrow [n]$  erzeugte Äquivalenzrelation gegeben ist.

*Bemerkung 1.7.* Diese Konstruktion lässt sich interpretieren als das Tensorprodukt der Funktoren

$$\begin{aligned} X : \Delta^{\text{op}} &\rightarrow \text{Top} \quad \text{und} \\ R : \Delta &\rightarrow \text{Top}, [n] \mapsto |\Delta^n|, \end{aligned}$$

wobei die Mengen  $X_n$  als diskrete topologische Räume aufgefasst werden ([?], III.1):

$$|X| = X \otimes R.$$

## 1.4 Sparsame Realisierung durch nichtdegenerierte Simplizes

Während die Definition simplizialer Mengen und ihrer Realisierung mit Degenerationsabbildungen wie gesehen von einem formalen Standpunkt aus sehr elegant ist, ist für die konkrete Arbeit häufig eine explizitere Form der Realisierung praktischer, die “unnötige Simplizes von vornherein weglässt”.

**Definition 1.8** ([?], I.2.9). Sei  $X \in \mathbf{sEns}$  eine simpliziale Menge. Ein Simplex  $x \in X_n$  heißt degeneriert, falls es einen Simplex  $y \in X_m$  und eine surjektive monotone Abbildung  $s : [n] \rightarrow [m], n > m$  gibt mit  $x = s^*y$ .

Andernfalls heißt ein Simplex nichtdegeneriert. Für  $X \in \mathbf{sEns}$  bezeichne  $NX_n$  die Menge der nichtdegenerierten  $n$ -Simplizes von  $X$ .

**Lemma 1.9** ([?], Prop. 9). Sei  $X \in \mathbf{sEns}$  eine simpliziale Menge und  $x \in X_n$  ein  $n$ -Simplex. Dann gibt es eine eindeutige Darstellung  $x = s^*y$  für  $y \in NX_m$  einen nichtdegenerierten Simplex von  $X$  und  $s : [n] \rightarrow [m]$  eine surjektive monotone Abbildung.

*Beweis.* Ist  $x$  nichtdegeneriert, wähle  $y = x$  und  $s = \text{id}_{[n]}$ . Andernfalls gibt es nach Definition ein  $y$  eine Surjektion mit der gewünschten Eigenschaft. Diese sind eindeutig nach den Relationen aus 1.2, vergleiche [?], Prop. 9.  $\square$

Wir definieren nun die *sparsame geometrische Realisierung* einer simplizialen Menge  $X$  wie folgt:

$$||X|| := \coprod_n NX_n \times |\Delta^n| / \sim_N,$$

wobei wie gehabt  $NX_n$  die diskrete Topologie trägt und die Äquivalenzrelation erzeugt ist von

$$(x, d_i p) \sim_N (y, sp),$$

falls  $s^*y = d_i^*x$  die eindeutige Darstellung von  $d_i^*x$  aus 1.9 ist. Diese Äquivalenzrelation lässt sich interpretieren als das Umgehen der mittleren Schritte in der Rechnung

$$(x, d_i p) \sim (d_i^*x, p) \sim (s^*y, p) \sim (y, sp).$$

**Satz 1.10.** *Die von der Inklusion*

$$\coprod_n NX_n \times |\Delta^n| \hookrightarrow \coprod_n X_n \times |\Delta^n|$$

*induzierte Abbildung  $||X|| \xrightarrow{\sim} |X|$  ist ein Homöomorphismus.*

*Beweis.* Die Abbildung existiert und ist stetig nach der universellen Eigenschaft topologischer Quotienten, denn die Äquivalenzrelation  $\sim$  umfasst  $\sim_N$ . Sie ist bijektiv, denn für die dazukommenden Punkte in degenerierten Simplexes  $s^*x$  gilt ohnehin  $(s^*x, p) \sim (x, sp)$ . Weiter ist sie offen: Ist  $U \subset ||X||$  eine offene Teilmenge, so berechnen wir ihr Bild in  $|X|$  durch das Bild ihres Urbilds  $V$  in  $\coprod_n NX_n \times |\Delta^n|$  unter

$$\coprod_n NX_n \times |\Delta^n| \hookrightarrow \coprod_n X_n \times |\Delta^n| \xrightarrow{q} |X|.$$

Bezeichne  $\bar{V}$  den Abschluss von  $V \subset \coprod_n X_n \times |\Delta^n|$  unter  $\sim$ -Äquivalenz. Es gilt  $\bar{V} = q^{-1}(q(V))$  und wir müssen nach Definition der Quotiententopologie zeigen, dass  $\bar{V}$  offen ist. Bezeichne für  $x$  einen nichtdegenerierten Simplex von  $X$  den Schnitt von  $V$  mit dem zu  $x$  gehörigen geometrischen Simplex  $|\Delta^n|$  mit  $V_x$ . Bei Übergang von  $V$  zu  $\bar{V}$  kommen dann alle Punkte  $(s^*x, p)$  mit  $(x, sp) \in U_x$  hinzu. Das Urbild der offenen Menge  $U_x$  unter dem stetigen  $s$ -Kollaps  $|s|$  ist dann natürlich wieder offen.  $\square$

## 1.5 Iterative Konstruktion der geometrischen Realisierung

Wir geben eine weitere Interpretation der geometrischen Realisierung als iteratives Ankleben geometrischer Simplexes an ihre Ränder an und werden so insbesondere sehen, dass die geometrische Realisierung einen Hausdorffraum liefert.

Bezeichne dazu  $||X^{\leq k}|| = \coprod_{0 \leq n \leq k} NX_n \times |\Delta^n| / \sim_N$  die geometrische Realisierung durch nichtdegenerierte Simplexes der Dimension  $\leq k$ . Wir erhalten Einbettungen  $||X^{\leq k}|| \hookrightarrow ||X||$  sowie  $||X|| = \bigcup_k ||X^{\leq k}||$ , denn die Äquivalenzrelation von ganz  $||X||$  fügt keine neuen Identifikationen auf den Teilmengen  $||X^{\leq k}|| \subset ||X||$  hinzu.

Wir können die  $||X^{\leq k}||$  iterativ konstruieren. Setze dazu  $||X^{\leq 0}|| = X_0$  mit der diskreten Topologie. Nun ist  $||X^{\leq k}||$  der Pushout topologischer Räume

## 1.6 Kompakt erzeugte Hausdorffräume

Die geometrischen Realisierungen simplizialer Mengen liegen tatsächlich sogar in einer in ihren kategoriellen Eigenschaften bequemen (*convenient*) Kategorie topologischer Räume, den kompakt erzeugten Hausdorffräumen.

**Definition 1.11** ([?]). Ein topologischer Raum  $X$  heißt kompakt erzeugt, falls gilt: eine Teilmenge  $A \subset X$  ist abgeschlossen, falls  $A \cap K$  abgeschlossen ist für jedes Kompaktum  $K \subset X$ .

*Bemerkung 1.12.* Äquivalent dazu ist: eine Teilmenge  $U \subset X$  ist offen, falls  $U \cap K$  offen ist für jedes Kompaktum  $K \subset X$ .

Wir notieren volle Unterkategorie der kompakt erzeugten Hausdorffräume in den topologischen Räumen mit CGHaus. Die kompakt erzeugten Hausdorffräume umfassen eine sehr große Klasse an relevanten topologischen Räumen, etwa CW-Komplexe oder erstabzählbare Räume. Für uns relevant sind die folgenden Kriterien:

**Lemma 1.13.** (i) Ist  $X$  ein lokal kompakter topologischer Raum, so ist  $X$  kompakt erzeugt.

(ii) Ist  $p : X \twoheadrightarrow Y$  eine Quotientenabbildung (d. h.  $Y$  trägt die Finaltopologie bezüglich  $p$ ) und  $X$  kompakt erzeugt, so ist auch  $Y$  kompakt erzeugt.

*Beweis.* (i) Sei  $U \subset X$  mit  $U \cap K$  offen für alle  $K \subset X$  kompakt. Mit der Lokalkompaktheit von  $X$  wählen wir zu jedem  $x \in X$  eine kompakte Umgebung  $K_x$  und erhalten, dass  $U = \bigcup_{x \in X} U \cap K_x$  offen ist als Vereinigung offener Mengen.

(ii) Sei  $A \subset Y$  mit  $A \cap K$  abgeschlossen für alle  $K \subset Y$  kompakt. Mit der Finaltopologie auf  $Y$  gilt, dass  $A \subset Y$  genau dann abgeschlossen ist, wenn  $p^{-1}(A) \subset X$  abgeschlossen ist. Sei nun  $\tilde{K} \subset X$  kompakt. Es ist  $p^{-1}(A) \cap \tilde{K}$  abgeschlossen, denn  $p(p^{-1}(A) \cap \tilde{K}) = p(\tilde{K}) \cap A$  ist abgeschlossen nach Voraussetzung ( $p(\tilde{K}) \subset Y$  ist kompakt als stetiges Bild eines Kompaktums). Da  $X$  kompakt erzeugt ist, folgt nun, dass  $p^{-1}(A)$  abgeschlossen ist und somit auch  $A \subset Y$ .

□