

Analisi Matematica 2

Enrico Favretto

28/02/2022

Contents

1	Funzioni a più variabili, [BDPG, 10]	4
1.1	Lez - 01	4
1.1.1	Grafico di una funzione scalare di più variabili	5
1.1.2	Curve di livello di una funzione di più variabili	5
1.1.3	Limiti e continuità per funzioni di più variabili	6
1.2	Lez - 02	7
1.2.1	Calcolo dei limiti	8
1.2.2	Esempi calcolo limiti	9
1.3	Lez - 03	11
1.3.1	Definizioni limiti e continuità per \mathbb{R}^n	11
1.3.2	Calcolo differenziale per funzioni a più variabili	12
1.3.3	Piano tangente al grafico	13
1.4	Lez - 04	15
1.4.1	Differenziabilità in $n \geq 3$	16
1.5	Lez - 05	20
1.5.1	Condizioni sulle derivate parziali che assicurino la differenziabilità	20
1.5.2	Derivate direzionali	21
1.5.3	Teo: Diff. vs. Deriv. direz.	22
1.5.4	Teorema del valore medio	23
1.6	Lez - 06	24
1.6.1	Derivate parziali di una f composta di più variabili	24
1.6.2	I caso particolare	24
1.6.3	II caso particolare	26
1.6.4	Caso generale di RDC	27
1.6.5	Teorema RDC	28
1.7	Lez - 07	29
1.7.1	Derivate parziali di ordine superiore	29
1.7.2	Teo: Inversione dell'ordine di derivazione	29
1.7.3	Taylor per funzioni di più variabili	30
1.7.4	Taylor del II ordine + resto di Peano	31
1.8	Lez - 08	33
1.8.1	Massimi e minimi per funzioni a più variabili	33
1.8.2	Estremi liberi di una funzione (min/max relativi)	33

1.8.3	Matrice Hessiana	34
1.8.4	Teorema: Criterio per il segno di una matrice	35
1.8.5	Esempi	36
1.9	Lez - 09	38
1.9.1	Ricerca del max e min (assoluto) su insieme limitato e chiuso	38
1.9.2	Frontiera attraverso parametrizzazione	39
1.9.3	Metodo dei moltiplicatori di Lagrange, TML	41
2	Integrale per funzioni a più variabili, [BDPG, 14]	44
2.1	Lez - 10, Integrale doppio su un rettangolo	44
2.1.1	Proprietà importanti delle somme sup. ed inf.	45
2.1.2	Teoremi: Esistenza & Proprietà integrale	46
2.1.3	Formula di riduzione sui rettangoli	47
2.1.4	Esempio	47
2.2	Lez 11 - Integrale doppio su insiemi generali	49
2.2.1	Insiemi numerabili e loro area	50
2.2.2	Integrali doppi su insiemi misurabili	51
2.2.3	Teo.: Integrale doppio su insieme di misura nulla	51
2.3	Integrali doppi su domini semplici e formule di riduzione	51
2.3.1	Teorema: Formula di riduzione su domini semplici	52
2.4	Lez - 12	54
2.4.1	Applicazione della formula di riduzione su domini semplici al calcolo di volumi di solidi	54
2.4.2	Teorema: Additività dell'integrale doppio	55
2.5	Cambiamento di var. per gli integrali doppi	55
2.5.1	Caso particolare: coordinate polari	55
2.5.2	Caso generale	57
2.5.3	Teorema: Cambiamento di variabili negli integrali doppi	58
2.6	Lez - 13, Integrali tripli, [BDPG,14.5]	61
2.6.1	Integrale triplo su un parallelepipedo	61
2.6.2	Integrale triplo su insiemi generali	62
2.6.3	Formule di riduzione per integrali tripli	63
2.6.4	Cambiamento di variabili negli integrali tripli	65
3	Curve ed integrali curvilinei, [BDPG, 12]	67
3.1	Lez - 14, Curve in \mathbb{R}^n	67
3.1.1	Orientazione di una curva semplice	68
3.1.2	Vettore velocità di una curva	69
3.1.3	Cambiamento di parametro di una curva	71
4	Esercitazioni	72
4.1	Lezione 1 - 09/03/2022	72
4.2	Esercitazione 2 - 23/03/2022	76
4.3	Lezione 3 - 06/04/2022	81

5	Teoremi Orale	85
5.1	Continuità , derivabilità , differenziabilità , polinomio di Taylor. .	85
5.1.1	Teorema del confronto	85
5.1.2	Definizione di limite per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. .	87
5.1.3	Definizione di continuità per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$	88
5.1.4	Definizione di derivate parziali e di vettore gradiente per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ A aperto	89
5.1.5	Definizione di differenziabilità in un punto per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e relazione con l'esistenza del gradiente in quel punto	90
5.1.6	Regola della catena nel caso generale di due funzioni, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$	91
5.1.7	Formula di Taylor del II ordine per una funzione di due variabili	92
5.1.8	Definizione di matrice Hessiana per un funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sua applicazione nella formula di Taylor del II ordine	93
5.2	Massimi e minimi	94
5.2.1	Definizione di punto di massimo/minimo relativo, massimo/minimo assoluto e punto di sella per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$	94
5.2.2	Teorema di Fermat sui punti stazionari di una funzione .	95
5.2.3	Teorema di Weierstrass sull'esistenza del massimo e minimo assoluto di una funzione	96
5.2.4	Metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la ricerca di massimi e minimi vincolati per funzioni di due variabili .	97
5.3	Integrali per funzioni in più variabili	98
5.3.1	Definizione di insieme insieme semplice (o normale) in \mathbb{R}^2 rispetto agli assi cartesiani	98
5.3.2	Formula di riduzione di integrali doppi su insiemi semplici	99
5.3.3	Formula di cambiamento di variabili per integrali doppi e tripli	100
5.3.4	Cambiamento di coordinate cilindriche e sferiche	102
5.3.5	Formule di riduzione per integrali tripli su un parallelepipedo	103
5.3.6	Definizione di insieme definito per fili e per strati	104
5.3.7	Formula di integrazione per fili e per strati	105
5.4	Curve e forme differenziali	106
5.4.1	Definizione di curva in \mathbb{R}^n , supporto di una curva, estremi di una curva, equazione parametrica di una curva	106
5.4.2	Definizione di curva chiusa, semplice, regolare, orientazione (o verso di percorrenza) di una curva semplice	107
5.4.3	Definizione di versore tangente ad una curva regolare . . .	108

Chapter 1

Funzioni a più variabili, [BDPG, 10]

1.1 Lez - 01

Studieremo funzioni a più variabili reali a valori scalari e vettoriali, cioè $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ con $n, k \in \mathbb{N}$ e $n \geq 1, k \geq 1$.

Se $k = 1, n \geq 2$, f si dice funzione di più variabili a valori scalari;

Se $k \geq 1, n \geq 1$, f si dice funzione di più variabili a valori vettoriali.

Incominciamo a trattare il caso in cui $n = 2, 3$ e $k = 1$.

MOTIVAZIONE: I fenomeni in Fisica/Ingegneria sono modellizzati da funzioni che dipendono da due/tre variabili.

Esempio 1 1. La funzione temperatura di una piastra piana $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

La funzione temperatura della piastra A può essere modellizzata da una funzione

$$T : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty] \subseteq \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

2. La funzione distanza dall'origine in \mathbb{R}^3 ,

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow [0, +\infty]$$

$$f(p) := d(O, p) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\mathbb{R}^3 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.1.1 Grafico di una funzione scalare di più variabili

Ricordiamo che nel caso di una funzione scalare da una variabile $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($y = f(x)$, $x \in A$), A intervallo di \mathbb{R} .

$$G_f := \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ($z = f(x, y)$, $(x, y) \in A$)

$$G_f := \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in A\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ($t = f(x, y, z)$, $(x, y, z) \in A$)

$$G_f := \{(x, y, z, f(x, y, z)) \mid (x, y, z) \in A\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

Disegnare G_f in \mathbb{R}^4 ? Non può essere facilmente studiato, il grafico è una iper-superficie di \mathbb{R}^4

1.1.2 Curve di livello di una funzione di più variabili

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, fissato $t \in \mathbb{R}$,

$$C_t := \{(x, y) \in A \mid f(x, y) = t\}$$

(è un insieme di tipo "curva" contenuto in A)

Esempio 2 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := x - y$, ($z = x - y$) $x - y - z = 0$,

$$((1, -1, -1), (x, y, z)) = 0$$

$$C_t := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = t\}$$

fascio di rette parallele al variare di t

$$G_f := \{(x, y, x - y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

piano di \mathbb{R}^3 contenente la retta r e ortogonale al vettore $(1, -1, -1)$

$$r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$$

Più in generale se $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $C_t := \{(x, y, z) \in A \mid f(x, y, z) = t\}$ è un insieme di tipo "superficie".

Esercizio 1 *Studiare le curve di livello della funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$.*

$$C_t := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = t\}$$

- C_t è la circonferenza di centro $(0, 0)$ e raggio \sqrt{t} , se $t \geq 0$
- C_t è vuoto (\emptyset), se $t < 0$

1.1.3 Limiti e continuità per funzioni di più variabili

Problema: Data $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, fissato $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ introdurre la definizione

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

Ricordiamo la definizione di limite per funzioni reali di una variabile, $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in [a, b]$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R} \iff (def.)$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0 \mid |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\forall x \in (a, b) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta), x \neq x_0, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$$

$$B(x_0, \delta) := (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \delta\}$$

intorno sferico di centro x_0 e raggio $\delta > 0$

Idea per l'introduzione di limite per funzioni di $n = 2$ variabili

Generalizzazione:

1. La definizione di intorno di centro x_0 e raggio $r > 0$ a \mathbb{R}^2
2. La nozione di intervallo aperto e chiuso a \mathbb{R}^2 , come pure la nozione di punto estremo di un intervallo.

1.2 Lez - 02

Definizione 1.2.1 (Distanza Euclidea in \mathbb{R}^2) Si chiama distanza euclidea di \mathbb{R}^2 (o nel piano) la funzione, $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$:

$$d(p, q) := \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$p = (x_1, y_1), q = (x_2, y_2)$$

Definizione 1.2.2 Si chiama intorno (sferico) di centro $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e raggio $r > 0$ (o anche palla aperta di centro p_0 e raggio $r > 0$), l'insieme:

$$\begin{aligned} B_r(p_0) = B(p_0, r) &:= \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d(p, p_0) < r\} = \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\} \end{aligned}$$

Definizione 1.2.3 Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$

1. Un punto $p_0 \in \mathbb{R}^2$ si dice punto di frontiera di A se

$$B(p_0, r) \cap A \neq \emptyset \text{ e } B(p_0, r) \cap (\mathbb{R}^2 \setminus A) \neq \emptyset, \forall r > 0$$

L'insieme di tutti i punti di frontiera di A è detto frontiera di A e si denota ∂A

2. L'insieme A è detto chiuso se ogni punto di frontiera di A appartiene ad A
3. L'insieme A è detto aperto se non contiene alcun punto della sua frontiera
4. L'insieme di tutti i punti di A che non sono di frontiera si chiama parte interna di A e si denota con \mathring{A}
5. L'insieme A è detto limitato se $\exists R_0 > 0$ t.c. $A \subseteq B(O, R_0)$

Esempio 3 1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, allora

- $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$
- $\mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$

2. $A = \mathbb{R}^2, \partial A = \emptyset, \mathring{A} = A = \mathbb{R}^2$

Definizione 1.2.4 Dato $A \subseteq \mathbb{R}^2$

1. $p_0 \in \mathbb{R}^2$ si dice punto di accumulazione per A se

$$B(p_0, r) \cap (A \setminus \{p_0\}) \neq \emptyset, \forall r > 0$$

2. $p_0 \in A$ si dice punto isolato di A se p_0 non è un punto di accumulazione, cioè se:

$$\exists r_0 > 0 \mid B(p_0, r_0) \cap A = \{p_0\}$$

Definizione 1.2.5 (Limite di funzioni di due variabili) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $p_0 \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A . Si dice che:

$$\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R}$$

oppure $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = d(p_0, \varepsilon) > 0 \mid |f(x,y) - L| < \varepsilon, \forall (x,y) \in B(p, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

Osservazione 1.2.1 Tenendo presente il caso di funzioni di una variabile, si può enunciare anche la definizione nel caso in cui $L = \pm\infty$

1.2.1 Calcolo dei limiti

Proposizione 1.2.1 (Unicità del limite) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $p_0 \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A . Supponiamo che $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L \in \mathbb{R}$. Allora L è unico.

Teorema 1.2.2 (Tecniche per il calcolo dei limiti) Siano $g, f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A . Supponiamo che $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L \in \mathbb{R}$ e $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} g(p) = M \in \mathbb{R}$, allora:

1. $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) + g(p) = L + M$
2. $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) \cdot g(p) = L \cdot M$
3. Se $g(p) \neq 0, \forall p \in A \setminus \{p_0\}$ e $M \neq 0$, allora $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{f(p)}{g(p)} = \frac{L}{M}$
4. Sia $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia $h(p) = F(f(p))$, allora $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} h(p) = F(L)$
5. **Teorema del confronto:** Sia $h, g, f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, supponiamo che:

$$5.1 \quad f(p) \leq g(p) \leq h(p), \quad \forall p \in A \setminus \{p_0\}$$

$$5.2 \quad \exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = \lim_{p \rightarrow p_0} h(p) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

$$\text{allora } \exists \lim_{p \rightarrow p_0} g(p) = L$$

Dim. 1 Le dimostrazioni di 1-4 sono lasciate al lettore :)

5 Supponiamo che $L \in \mathbb{R}$, dobbiamo provare che $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} g(p) = L$, cioè per definizione:

$$1^* \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta (= \delta(p_0, \varepsilon)) > 0 \text{ t.c. } |g(p) - L| < \varepsilon \quad \forall p \in B(p_0, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\}). \text{ Per ipotesi sappiamo che}$$

$$\lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L, \quad \lim_{p \rightarrow p_0} h(p) = L$$

cioè :

$$2^* \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 (= \delta_1(p_0, \varepsilon)) > 0 \text{ t.c. } |f(p) - L| < \varepsilon \text{ o equivalentemente } L - \varepsilon < f(p) < L + \varepsilon \quad \forall p \in B(p_0, \delta_1) \cap (A \setminus \{p_0\}), \text{ e:}$$

$3^* \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 (= \delta_2(p_0, \varepsilon)) > 0$ t.c. $|h(p) - L| < \varepsilon$ o equivalentemente
 $L - \varepsilon < h(p) < L + \varepsilon \forall p \in B(p_0, \delta_2) \cap (A \setminus \{p_0\})$

Da (5.1), (2*), (3*) segue che $\forall \varepsilon > 0$, scegliendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ vale che

$$L - \varepsilon < f(p) \leq g(p) \leq h(p) < L + \varepsilon$$

$\forall p \in B(p_0, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$ e dunque vale la (1*).

Introduciamo un altro strumento importante per il calcolo dei limiti per funzioni di due variabili.

Ricordiamo che data $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $B \subseteq A$ si chiama funzione restrizione $f|_B : B \rightarrow \mathbb{R}$, $f|_B(x) := f(x)$ se $x \in B$.

Teorema 1.2.3 (Limite lungo direzioni) Siano $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $p_0 \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione, allora sono equivalenti

1. $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L$
2. Per ogni sottoinsieme $B \subseteq A$, per cui p_0 è un punto di accumulazione per B , $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f|_B(p) = L$

Un insieme $B \subseteq A$ può essere visto come una direzione lungo cui $p \rightarrow p_0$.

Osservazione 1.2.4 Il teorema precedente risulta efficace solo per provare che il limite non esiste.

1.2.2 Esempi calcolo limiti

Esercizio 2 1. Calcola, se esiste, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 1$

Dim. 2 Nel calcolo del limite bisogna valutare:

- Esistenza (il limite può non esistere)
- Tecniche appropriate per il calcolo

Utilizziamo il punto (4) del primo teorema.

Ricordiamo anche il limite notevole $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

Denotiamo:

- $h(x, y) = \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ se $(x, y) \in A = (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$
- $t = x^2 + y^2$
- Sia $p_0 = (0, 0)$ punto di accumulazione per A .

Osserviamo che $h(x, y) = F(f(x, y))$, dove $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F := \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

è continua, e $f(x, y) = x^2 + y^2$ $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Poichè $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$, dal punto (4)

$$\exists \lim_{p \rightarrow p_0} h(p) = \lim_{p \rightarrow p_0} F(f(p)) = F(0) = 1$$

2. Calcola se esiste $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$

Dim. 3 Sia

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$\forall (x, y) \in A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $p_0 = (0, 0)$.

Utilizziamo il teorema per provare che il limite non esiste.

Infatti se

$$\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = L$$

allora

(1*) $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = L, \forall m \in \mathbb{R}$

dove $y = mx$, $B = \{y = mx\}$ (direzionale) e m è finito.

Osserviamo che $f(x, mx) = \frac{mx^2}{(m^2+1)x^2} = \frac{m}{m^2+1}$ se $x \neq 0$, quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \frac{m}{m^2 + 1}$$

ma se $m = 0, 1$ il limite prende valore $0, \frac{1}{2}$ ($0 \neq \frac{1}{2}$),

dunque non può valere (1*), quindi il limite non esiste

Dalla definizione di limite per funzioni di due variabili segue subito la nozione di continuità .

Esercizio 3 Calcolare se esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

Sugg: Provare che \nexists

1.3 Lez - 03

1.3.1 Definizioni limiti e continuità per \mathbb{R}^n

Definizione 1.3.1 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

1. f si dice continua in $p_0 \in A$ se

(a) p_0 è un punto isolato di A , oppure

(b) p_0 è un punto di accumulazione ed $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = f(p_0)$

2. f si dice continua su A se f è continua in ogni punto $p_0 \in A$

Le nozioni di limite e continuità, introdotte per funzioni $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, si possono estendere al caso di funzioni $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $n \geq 3$.

Più precisamente su \mathbb{R}^n possiamo definire la distanza Euclidea:

$$d(p, q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

se $p = (x_1, \dots, x_n)$ e $q = (y_1, \dots, y_n)$.

Intorno di centro $p_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ e $r > 0$ è l'insieme:

$$B(p_0, r) = \{p \in \mathbb{R}^n \mid d(p, p_0) < r\}$$

$$= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (x_1 - x_1^0)^2 + \dots + (x_n - x_n^0)^2 < r^2\}$$

Tramite la nozione di intorni, si possono estendere a \mathbb{R}^n la nozione di:

- frontiera di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- insieme aperto/chiuso $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- insieme limitato $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- punto di accumulazione/isolato di $A \subseteq \mathbb{R}^n$

Pertanto:

Definizione 1.3.2 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $p_0 \in \mathbb{R}^n$ punto di accumulazione di A . Allora si dice che:

$$\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L \in \mathbb{R}$$

se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(p, \varepsilon) > 0 \text{ t.c. } |f(p) - L| < \varepsilon, \forall p \in B(p_0, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

In modo simile si può introdurre la nozione di continuità per funzioni $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

1.3.2 Calcolo differenziale per funzioni a più variabili

Derivate parziali

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, essendo A aperto, $\exists \delta_0 > 0$ t.c.

$$[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta] \subset A$$

In particolare i segmenti:

- $(x, y_0) \in A \ \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$
- $(x_0, y) \in A \ \forall y \in [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$

Pertanto son ben definiti i rapporti incrementali

- $((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \setminus \{x_0\}) \ni x \rightarrow \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$
- $((y_0 - \delta_0, y_0 + \delta_0) \setminus \{y_0\}) \ni y \rightarrow \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$

Definizione 1.3.3 1. Si dice che f è derivabile(parzialmente) rispetto alla variabile x nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$ se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} := \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = D_1 f(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$$

2. Si dice che f è derivabile(parzialmente) rispetto alla variabile y nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$ se

$$\exists \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} := \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = D_2 f(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$$

3. Se f è derivabile (parzialmente) sia rispetto ad x ed y nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$, si chiama (vettore)gradiente di f in p_0 il vettore:

$$\nabla f(p_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \right) \in \mathbb{R}^2$$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A insieme aperto. Supponiamo che:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : A \rightarrow \mathbb{R}$$

allora è ben definito il campo dei vettori gradiente:

$$\nabla f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \ni p \rightarrow \nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p) \right) \in \mathbb{R}^2$$

Applicazione: Sia $V : A \rightarrow \mathbb{R}$ il potenziale di una carica elettrica in un insieme A del piano. Allora vale la relazione $\nabla V = \underline{E}$, dove $\underline{E} := (E_1(x, y), E_2(x, y)) \rightarrow$ vettore campo elettrico.

Problema: $\exists \nabla f(p_0)$ è la nozione corretta di derivabilità per funzioni di due variabili? Per esempio se $\exists \nabla f(p_0) \Rightarrow f$ è continua in p_0 ?

Esempio 4 Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 = (0, 0)$ e

$$f(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

Abbiamo visto che: $\nexists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) \Rightarrow f$ non è continua in p_0 .

D'altra parte:

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

$$\text{se } x \neq 0 \Rightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

$$\frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

$$\text{se } y \neq 0 \Rightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pertanto $\exists \nabla f(0, 0) = (0, 0)$ ma f non è continua nel punto $(0, 0)$.

1.3.3 Piano tangente al grafico

Approssimazione lineare e nozione di differenziabilità per funzioni di più variabili.

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, $z = f(x, y)$.

Problema: Definire il "piano tangente" alla "superficie" G_f nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ se esiste.

Ricordiamo che l'equazione di un piano π di \mathbb{R}^3 , non parallelo all'asse z , passante per il punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ è del tipo

$$\pi : z = a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

dove $a, b \in \mathbb{R}$.

Ricordiamo inoltre che per funzioni di $n = 1$ variabile, se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, la retta tangente r a G_f nel punto $(x_0, f(x_0))$ ha equazione:

$$r : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

ed è caratterizzata dalla proprietà di essere l'unica retta del fascio di rette $y = m(x - x_0) + f(x_0)$, $m \in \mathbb{R}$ t.c.

$$(D) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - [m(x - x_0) + f(x_0)]}{|x - x_0|} = 0$$

(miglior approssimazione lineare al primo ordine) Infatti: $n = 1$, $L(x) = ax$, $a \in \mathbb{R}$ sono le applicazioni lineari di \mathbb{R} in \mathbb{R}

Esercizio 4 $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \iff \exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. vale } (D)$, inoltre $m = f'(x_0)$.

Sugg: Utilizzare (D) nel caso di funzioni di due variabili per definire il piano tangente.

Più precisamente, data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto, sia $p_0 = (x_0, y_0) \in A$. Supponiamo che esistono $a, b \in \mathbb{R}$ t.c.

$$(D) \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x) - [a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0)]}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

Allora se vale (D:)

Definizione 1.3.4 1. il piano $\pi : z = a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0, y_0)$ si dice piano tangente al grafico G_f nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

2. f si dice differenziabile nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$ proveremo che:

- (a) Se f è differenziabile in $p_0 \in A \Rightarrow f$ è continua
- (b) Se f è differenziale in $p_0 \in A$, allora

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \exists \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$$

Esercizio 5 $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} = 0$? NO.

1.4 Lez - 04

Piano tangente al grafico G_f in un punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è un piano π di equazione $z = a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0, y_0)$ dove $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, verificante la seguente equazione:

$$(D) \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x) - [a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0)]}{d(p, p_0)}$$

dove $d(p, p_0) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$

Definizione 1.4.1 Dato $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e dato $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ si dice differenziabile nel punto p_0 se vale (D), per $a, b \in \mathbb{R}$ opportuni.

Proposizione 1.4.1 Se f è differenziabile nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$, allora

$$\exists \nabla f(p_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \right)$$

e

$$a = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0), b = \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$$

Dim. 4 Supponiamo che f sia differenziabile in p_0 , cioè che valga (D). Ponendo nella (D), $y = y_0$ otteniamo che:

$$\begin{aligned} \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) [a(x - x_0) + f(x_0, y_0)]}{|x - x_0|} &= 0 \\ \Rightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) &= a \end{aligned}$$

procediamo allo stesso modo, ponendo $x = x_0$ nella (D) e otteniamo $\frac{\partial f}{\partial y}(p_0) = b$

Definizione 1.4.2 L'applicazione lineare $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$L(x, y) := \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)y$$

si chiama differenziale di f in p_0 , si denota con:

$$L = df(p_0) := \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)dy$$

Definizione 1.4.3 (Piano tangente) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto con f differenziabile in p_0 . Si chiama piano tangente al grafico G_f nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ il piano π di equazione:

$$z = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

Teorema 1.4.1 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, f differenziabile in $p_0 \in A$, allora f è continua in p_0

Dim. 5

$$\begin{aligned} f(p) - f(p_0) &= \frac{f(p) - f(p_0) - df(p_0)(p - p_0)}{d(p, p_0)} \cdot d(p, p_0) + df(p_0)(p - p_0) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)(y - y_0) \end{aligned}$$

Il tutto tende a 0 per $p \rightarrow p_0$.

$$\Rightarrow \exists \lim_{p \rightarrow p_0} (f(p) - f(p_0)) = 0$$

1.4.1 Differenziabilità in $n \geq 3$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, $p_0 \in A$, $p = (x_1, \dots, x_n)$, $p_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ possiamo definire

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + h e_i) - f(p_0)}{h}$$

dove $i = 1, \dots, n$, e_i, \dots, e_n denota la base canonica di \mathbb{R}^n , cioè $e_i = (0, 0, \dots, 0, 1_{i\text{-esimo elemento}}, 0, 0, \dots, 0)$
Diremo che

$$\exists \nabla f(p_0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) \right)$$

gradiente di f in p_0 , se $\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0)$, $\forall i = 1, \dots, n$

Definizione 1.4.4 f si dice differenziabile in un punto $p_0 \in A$ se esiste un'applicazione lineare $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

$$(D) \exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{f(p) - f(p_0) - L(p - p_0)}{d(p, p_0)} = 0$$

L'applicazione lineare $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ per cui valga (D) si denota con $L = df(p_0)$

Proposizione 1.4.2 (11.4) Se f è differenziabile nel punto p_0 allora

$$i \quad \exists \nabla df(p_0)$$

ii

$$df(p_0)(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) v_i := \nabla f(p_0) \cdot v$$

$$\text{se } v = (v_1, \dots, v_n)$$

Osservazione 1.4.2 Se $v = e_i$, $\nabla f(p_0) \cdot e_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0)$

Notazione 1.4.3 $df(p_0) := \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) dx_i$

Osservazione 1.4.4 Dalla definizione di differenziabilità nel caso $n = 1$, segue che, se $A = (a, b)$, $x_0 \in A$, allora **Esercizio 1.5, foglio 2**:

$$\exists f'(x_0) \iff f \text{ è differenziabile in } x_0$$

Esercizio 6 (1b, foglio 2) Calcolare se esiste

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - e^{xy^2}}{\sqrt{x^4 + y^4}}$$

Dim. 6 Ricordiamo che (1) $\exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$.

Utilizzando il precedente limite possiamo eseguire il seguente bilanciamento:

$$\frac{1 - e^{xy^2}}{xy^2} \cdot \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}}$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, con $xy^2 \neq 0$. Osserviamo che:

(2)

$$\frac{1 - e^{xy^2}}{\sqrt{x^4 + y^4}} = 0$$

Se $xy^2 \neq 0$ e $(x, y) \neq (0, 0)$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - e^{xy^2}}{xy^2} = 1.$$

Rimane da calcolare, se esiste:

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}}$$

è molto utile, per studiare limite del tipo (4) fare un cambiamento di variabili ed utilizzare le coordinate polari:

Coordinate polari

Consideriamo il seguente cambiamento di variabili $\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases}$ con $\rho > 0$ e $0 \leq \vartheta \leq \pi$, quindi:

$$\frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} \rightarrow \frac{\rho \cdot \cos \vartheta \cdot \rho^2 \sin^2 \vartheta}{\sqrt{\rho^4 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)}} = \rho \cdot \frac{\cos \vartheta \cdot \sin^2 \vartheta}{\sqrt{(\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)}}$$

Dalla (2) sappiamo che se $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - e^{xy^2}}{\sqrt{x^4 + y^4}} = L \Rightarrow L = 0$.

Idea: Utilizzare la funzione in coordinate polari, per cercare di provare tramite il teorema del confronto che (5) $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}}$.

Le coordinate polari risultano molto utili per trovare delle stime per applicare il teorema del confronto:

$$(6) \quad 0 \leq \left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} \right| = \left| \rho \cdot \frac{\cos \vartheta \cdot \sin^2 \vartheta}{\sqrt{(\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)}} \right| \leq$$

$$\leq \rho \cdot \frac{|\cos \vartheta \cdot \sin^2 \vartheta|}{\sqrt{(\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)}} \leq \frac{\rho \cdot 1}{\sqrt{\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta}}$$

Esercizio 7 $\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta \geq \frac{1}{2}$, $\forall \vartheta \in [0, 2\pi]$

Pertanto da (6) segue che

$$\begin{cases} \vartheta > 0 & \forall \vartheta \in (0, 2\pi) \\ \frac{1}{\vartheta} > 0 & \vartheta \rightarrow 0^+ \end{cases}$$

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} \right| \leq \sqrt{2} \cdot \rho = \sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ se $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ Dunque vale (5) e possiamo concludere che

$$\exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1 - e^{xy^2}}{\sqrt{x^4 + y^4}} = 0$$

$$f(x, y) = \frac{1 - e^{xy^2}}{\sqrt{x^4 + y^4}}$$

se $(x, y) \neq (0, 0)$,

- $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$
- $\exists \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 0$

$$\Rightarrow \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = L \Rightarrow L = 0$$

Dim. 7 (1.5, foglio 2) $(\Rightarrow) \exists f'(p_0) \Rightarrow f$ è differenziabile in x_0 .

Ricordiamo che per definizione

$$\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \iff (1) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{N.B.}: \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

Esercizio 8

$$(1) \iff (2) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{|x - x_0|} = 0$$

Osserviamo che per definizione f è differenziabile in $x_0 \iff$ vale (2).
Mostriamo l'implicazione (\Leftarrow) , Supponiamo che valga (2).

Esercizio 9

$$(2) \iff (3) \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

È chiaro che

$$\begin{aligned} (3) &\iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = 0 \iff \\ &\iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \stackrel{def}{\iff} \exists f'(x_0) \end{aligned}$$

1.5 Lez - 05

1.5.1 Condizioni sulle derivate parziali che assicurino la differenziabilità

Osservazione 1.5.1 *La derivabilità parziale non è sufficiente ad assicurare la differenziabilità*

Problema: Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e supponiamo che $\exists \nabla f(p_0)$ con $p_0 \in A$. Quale proprietà ulteriore bisogna aggiungere per ottenere la differenziabilità di f in p_0 ?

Teorema 1.5.2 (del differenziale totale) *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto, $p_0 \in A$. Supponiamo che*

(i)

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : A \rightarrow \mathbb{R}$$

(ii) $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ siano continue nel punto p_0 , cioè

$$\exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{\partial f}{\partial x}(p) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \text{ e } \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{\partial f}{\partial y}(p) = \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$$

Allora f è differenziabile nel punto p_0 . [BDPG, 11.5]

Osservazione 1.5.3 *È sufficiente richiedere la (i) e (ii) in un intorno di p_0*

Il teorema del differenziale totale giustifica la seguente definizione:

Definizione 1.5.1 *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$*

(i) *f si dice differenziabile su A se è diff su ogni punto di A .*

(ii) *f si dice di classe C^1 su A se f è continua e*

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ continui}$$

In questo caso scriveremo che $f \in C^1(A)$

Dal teorema del differenziale totale segue anche:

Corollario 1.5.1 *Sia $f \in C^1(A)$ allora f è differenziabile su ogni punto di $p_0 \in A$*

1.5.2 Derivate direzionali

Norma di un vettore di \mathbb{R}^n

Sia $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, si chiama norma di v , e si denota

$$\|v\| := \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2} = d(v, \underline{0}) = \sqrt{v \cdot v}$$

Esempio 5 1. $n = 1$, $\|v\| = |v|$ se $v \in \mathbb{R}$

2. $n = 2$. (immaginarsi il piano cartesiano)

Osservazione 1.5.4 Se $p, q \in \mathbb{R}^n \Rightarrow d(p, q) = \|p - q\|$

Esercizio 10 (6, foglio 1) 1. $\|v\| = 0 \iff v = \underline{0} = (0, \dots, 0)$

2. Se $\lambda \in \mathbb{R}$ e $\lambda v = (\lambda v_1, \dots, \lambda v_n)$ con $v = (v_1, \dots, v_n)$, allora $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$

3. Disuguaglianza triangolare: Se $v, w \in \mathbb{R}^n$, $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Definizione 1.5.2 Un vettore $v \in \mathbb{R}^n$ si dice direzione (vettore unitario, versore) se $\|v\| = 1$

Esempio 6 $n = 2$, i vettori $e_1 = (1, 0)$ ed $e_2 = (0, 1)$ sono direzioni di \mathbb{R}^2

Sia $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ una direzione, e $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, allora $\exists \delta > 0$ t.c.

$$p_0 + hv = (x_0 + hv_1, y_0 + hv_2) \in A$$

se $|h| \leq \delta$, pertanto è ben definita:

$$(-\delta, \delta) \setminus \{0\} \ni h \rightarrow \frac{f(p_0 + hv) - f(p_0)}{h}$$

Definizione 1.5.3 Si dice che f è derivabile (parzialmente) rispetto alla direzione v nel punto p_0 se

$$\exists \frac{\partial f}{\partial v}(p_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + hv) - f(p_0)}{h} \in \mathbb{R}$$

Notazione 1.5.5 Talvolta $\frac{\partial f}{\partial v}(p_0) = D_v f(p_0)$

Osservazione 1.5.6 (i) Sia $F : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$, (funzione di $n = 1$ variabile)

$$F(t) := f(p_0 + tv) \text{ se } t \in (-\delta, \delta)$$

Allora è immediato verificare che

$$\exists \frac{\partial f}{\partial v}(p_0) \iff \exists F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F'(h) - F(0)}{h}$$

ed in questo case, $\frac{\partial f}{\partial v}(p_0) = F'(0)$

(ii) È immediato verificare che se $v = e_1$ o $v = e_2$, allora

$$\frac{\partial f}{\partial e_1}(p_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \text{ e } \frac{\partial f}{\partial e_2}(p_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$$

1.5.3 Teo: Diff. vs. Deriv. direz.

Teorema 1.5.7 (differenziabilità vs derivabilità direzionale) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto e sia fissato $p_0 = (x_0, y_0) \in A$. Supponiamo che f sia differenziale in p_0 , allora

$$\exists \frac{\partial f}{\partial v}(p_0) = df(p_0)(v) = \nabla f(p_0) \cdot (v) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)(v_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)(v_2)$$

per ogni direzione $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$

Dim. 8 Consideriamo la funzione $F : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(t) = f(p_0 + tv) = f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$$

Per ipotesi, f è differenziabile in p_0 , cioè vale:

$$(D) \exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{f(p) - f(p_0) - \nabla f(p_0) \cdot (p - p_0)}{d(p, p_0)} = 0$$

la condizione (D) è equivalente a chiedere:

$$(D^*) f(p) = f(p_0) + \nabla f(p_0) \cdot (p - p_0) + o(d(p, p_0)) \quad \forall p \in A$$

dove con $o(d(p, p_0)) \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{o(d(p, p_0))}{d(p, p_0)} = 0$ Scegliendo $p = p_0 + hv$ in (D^*) , otteniamo che:

$$\begin{aligned} F(h) &:= f(p_0 + hv) - f(p_0) - \nabla f(p_0) \cdot (hv) + o(d(p_0 + hv, p_0)) = \\ &= F(0) + h(\nabla f(p_0) \cdot v) + o(|h|) \end{aligned}$$

Infatti ricordiamo che:

$$d(p_0 + hv, p_0) = \|p_0 + hv - p_0\| = \|hv\| = |h| \|v\| = |h|$$

Dall'identità precedente segue che:

$$\exists F'(0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \nabla f(p_0) \cdot v = df(p_0)(v)$$

Per l'osservazione precedente $F'(0) = \frac{\partial f}{\partial v}(p_0)$ da cui segue la tesi.

Dal teorema segue la generalizzazione del teorema del valore medio (G. Lagrange) a funzioni $n = 2$ variabili.

1.5.4 Teorema del valore medio

Teorema 1.5.8 (TdVM, n=1) Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e derivabile in (a, b) . Allora $\exists c \in (a, b)$ t.c.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Teorema 1.5.9 (del valore medio, n=2) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che:

- (i) $\exists p, q \in A$ t.c. $[p, q] := \{tq + (1-t)p \mid t \in [0, 1]\} \subset A$
- (ii) f è continua sull'insieme $[p, q]$ e differenziabile su $(p, q) := \{tq + (1-t)p \mid t \in (0, 1)\}$

Allora esiste un punto $\bar{c} \in (p, q)$ t.c. $f(q) - f(p) = \nabla f(\bar{c}) \cdot (q - p)$

Dim. 9 Supponiamo $p \neq q$ altrimenti la tesi è banale e sia

$$v := \frac{q - p}{\|q - p\|}$$

una direzione di \mathbb{R}^2 .

Definiamo la funzione (d $n=1$ variabile) $F(t) := f(p + tv)$ con $t \in [0, \|q - p\|]$ ($\subset \mathbb{R}$) e fissiamo p, q , osserviamo che F è ben definita per la (i) e $F(0) = f(p)$ e $F(\|q - p\|) = f(q)$. Inoltre per la (ii):

1. $F : [0, \|q - p\|] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua;
2. $\exists F'(t) = \frac{\partial f}{\partial v}(p + tv)$, $\forall t \in (0, \|q - p\|)$

Possiamo applicare il teorema del valore medio ($n=1$ variabile) a F e otteniamo che esiste $\bar{t} \in (0, \|q - p\|)$ t.c.

$$\begin{aligned} f(q) - f(p) &= F(\|q - p\|) - F(0) = F(\bar{t}) \|q - p\| = \\ &=_{(2)} \frac{\partial f}{\partial v}(p + \bar{t}v) \|q - p\| = (\nabla f(p + \bar{t}v) \cdot v) \|q - p\| = \\ &= \left(\nabla f(p + \bar{t}v) \cdot \frac{q - p}{\|q - p\|} \right) \cdot \frac{q - p}{\|q - p\|} = \nabla f(p + \bar{t}v)(q - p) \end{aligned}$$

Scegliendo $\bar{c} = p + \bar{t}v \in (p, q)$ otteniamo la tesi

Corollario 1.5.2 Sia $f : B(p_0, r_0) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che $\exists \nabla f(p_0) = (0, 0) \forall p \in B(p_0, r_0)$. Allora $f(p) = f(p_0)$, $\forall p \in B(p_0, r_0)$

Dim. 10 per il teorema del diff. tot. f è differenziale su $B(p_0, r_0)$. Possiamo applicare il teorema del valore medio e otteniamo che $\exists \bar{c} \in (p, p_0)$ t.c. $f(p) - f(p_0) = \nabla f(\bar{c})(p - p_0) = 0$, $\forall p \in B(p_0, r_0)$

1.6 Lez - 06

1.6.1 Derivate parziali di una f composta di più variabili

Problema: Vogliamo determinare una formula generale che ci consente di calcolare le derivate parziali di una (generica) funzione composta di più variabili.

Esercizio 11 (7, foglio 3) Consideriamo la funzione composta $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $h := f \circ g$, dove $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

se $(x, y) \neq (0, 0)$ e

$$g(t) = (g_1(t), g_2(t)) = (\sin^2(t), \cos^2(t)), t \in \mathbb{R} \text{ Calcolare } h'(t), t \in \mathbb{R}$$

Richiami della RDC

Siano $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(J) \subseteq I$, I, J intervalli aperti di \mathbb{R} .
 $h := f \circ g$, $h(x) := f(g(x))$, $x \in I$

Proposizione 1.6.1 (Regola della catena, RDC) Se f, g sono derivabili, rispettivamente, in $g(x_0)$ e in x_0 , allora $\exists h'(x) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$

Esempio 7 $f(y) = \sin y$, $g(x) = x^2$, $h = f \circ g$, $h(x) = \sin x^2$, $\exists h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos x^2 \cdot 2x$

Prima di arrivare alla formula generale di derivazione di una funzione composta, introduciamo alcuni casi particolari

1.6.2 I caso particolare

Consideriamo $g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, I intervallo aperto di \mathbb{R} , $t_0 \in I$ fissato.

$$I \ni t \rightarrow g(t) = (g_1(t), g_2(t)) = (x(t), y(t))$$

con $g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo che $\exists g'_1(t_0), g'_2(t_0)$ e $g(I) \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^2$, A aperto.

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e supponiamo che f sia differenziabile in

$$p_0 = (x_0, y_0) = g(t_0) = (g_1(t_0), g_2(t_0))$$

Consideriamo la funzione composta $h : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h := f \circ g$

$$I \ni t \rightarrow h(t) := (f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(g_1(t), g_2(t))$$

Teorema 1.6.1

$$(1) \exists h'(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \cdot g'_1(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cdot g'_2(t_0)$$

oppure tramite matrici

$$(1bis) \exists h'(t_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} g'_1(t_0) \\ g'_2(t_0) \end{bmatrix} =$$

$$= \nabla f(p_0) \cdot g'(t_0), \text{ dove } g'(t_0) = (g'_1(t_0), g'_2(t_0)).$$

Espansione classica di RDC, Leibniz

Se scriviamo g e f , in termini di "variabili dipendenti", cioè

$$g = \begin{cases} x = x(t) = g_1(t) \\ y = y(t) = g_2(t) \end{cases} \quad (\text{curva del piano})$$

$z = z(x, y) = f(x, y)$, allora componendo f con g , la variabile dipendente z dipenderà dalla sola variabile indipendente t per cui, $z = z(t) = z(x(t), y(t))$, $t \in I$.

Quindi in termini di queste variabili (z, x, y, t) si può scrivere la (1) come:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

oppure utilizzando (1bis)

$$\frac{dz}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial t} \end{bmatrix}$$

Dim. 11 (Idea!) Proviamo la (1), cioè provare che

$$(2) \exists h'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} = \nabla f(p_0) \cdot g'(t_0)$$

Essendo f differenziabile in p_0 vale che:

$$(3) f(p) = f(p_0) + df(p_0) \cdot (p - p_0) + o(\|p - p_0\|)$$

$\forall p \in A$ se $p_0 = g(t_0)$.

Da (3) segue che, se scegliamo $p = g(t)$ otteniamo:

$$f(g(t)) = f(g(t_0)) + df(g(t_0)) \cdot (g(t) - g(t_0)) + o(\|g(t) - g(t_0)\|)$$

$\forall t \in I$, da cui:

$$(4) \frac{f(g(t)) - f(g(t_0))}{t - t_0} = \frac{df(g(t_0)) \cdot (g(t) - g(t_0))}{t - t_0} + \frac{o(\|g(t) - g(t_0)\|)}{t - t_0}$$

$t \in I, t \neq t_0$.

Osserviamo che essendo $df(p_0) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lineare allora:

$$(5) \frac{df(p_0)(g(t) - g(t_0))}{t - t_0} = df(p_0) \cdot \left(\frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} \right)$$

Passando al limite nella (5) per $t \rightarrow t_0$, dalla continuità della funzione $df(p_0)$, si ottiene che:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} df(p_0) \left(\frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} \right) = df(p_0) \cdot g'(t_0)$$

$$(6) \exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{df(p_0)(g(t) - g(t_0))}{t - t_0} = df(p_0) \cdot g'(t_0) = \nabla f(p_0) \cdot g'(t_0)$$

Si può provare anche (ed è il punto delicato che omettiamo)

$$(7) \exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{o(\|g(t) - g(t_0)\|)}{t - t_0} = 0$$

Da (6) e (7), possiamo passare al limite per $t \rightarrow t_0$ nella (4) ed otteniamo la (2) e dunque la tesi.

1.6.3 II caso particolare

$g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, A aperto, e $p_0 = (s_0, t_0) \in A$

$$A \ni (s, t) \rightarrow g(s, t) = (g_1(s, t), g_2(s, t))$$

$g_1, g_2 : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo che g_1 e g_2 siano differenziabili in p_0 e $g(A) \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, B aperto.

In particolare:

$$\exists \nabla g_i(p_0) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial s}(p_0), \frac{\partial g_i}{\partial t}(p_0) \right) \quad i = 1, 2$$

Sia $f : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, B aperto, f differenziabile in $q_0 = (x_0, y_0) = (g_1(p_0), g_2(p_0))$,

$B \ni (x, y) \rightarrow f(x, y) \in \mathbb{R}$.

Supponiamo che f sia differenziabile in q_0 .

Consideriamo $h := f \circ g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$A \ni (s, t) \rightarrow (f \circ g)(s, t) = f(g(s, t)) = f(g_1(s, t), g_2(s, t))$$

Teorema 1.6.2

$$(1) \quad \begin{aligned} \exists \frac{\partial h}{\partial s}(p_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(g(p_0)) \cdot \frac{\partial g_1}{\partial s}(p_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(g(p_0)) \cdot \frac{\partial g_2}{\partial s}(p_0) \\ \exists \frac{\partial h}{\partial t}(p_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(g(p_0)) \cdot \frac{\partial g_1}{\partial t}(p_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(g(p_0)) \cdot \frac{\partial g_2}{\partial t}(p_0) \end{aligned}$$

in termini di matrici:

$$(1bis) \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial s}(p_0) & \frac{\partial h}{\partial t}(p_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(g(p_0)) & \frac{\partial f}{\partial y}(g(p_0)) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial s}(p_0) & \frac{\partial g_1}{\partial t}(p_0) \\ \frac{\partial g_2}{\partial s}(p_0) & \frac{\partial g_2}{\partial t}(p_0) \end{bmatrix}$$

Dove $\frac{\partial g_1}{\partial s}(p_0), \frac{\partial g_1}{\partial t}(p_0) = \nabla g_1(p_0)$ e $\frac{\partial g_2}{\partial s}(p_0), \frac{\partial g_2}{\partial t}(p_0) = \nabla g_2(p_0)$

Esercizio 12 Utilizzare (1bis) del teorema nel secondo caso e svolgere esercizio 7 foglio 3

1.6.4 Caso generale di RDC

Vogliamo ora trattare il caso generale della formula di derivazione per funzioni composte di più variabili.

Matrice Jacobiana

Definizione 1.6.1 (Matrice Jacobiana) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, A aperto,

$$A \ni x = (x_1, \dots, x_n) \rightarrow f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$$

con $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$.

Supponiamo che dato $x_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in A$,

$$\exists \nabla f_i(x_0) := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x_0) \right)$$

con $i = 1, \dots, m$.

Si chiama Matrice Jacobiana di f nel punto x_0 la matrice $m \times n$

$$Df(x_0) = Jf(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{bmatrix}$$

Osservazione 1.6.3 (i) La nozione di matrice Jacobiana generalizza la nozione di vettore gradiente per una funzione (scalare) $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Si noti che in questo caso la matrice Jacobiana $1 \times n$ è data da

$$Df(x_0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right) \equiv \nabla f(x_0)$$

(ii) La riga i -esima della matrice Jacobiana $Df(x_0)$ coincide con $\nabla f_i(x_0)$

(iii) La (1bis) del precedente teorema, in termini di matrici Jacobiane può scriversi come

$$Dh(p_0) = Df(g(p_0)) \cdot Dg(p_0) \text{ (RDC)}$$

1.6.5 Teorema RDC

Teorema 1.6.4 (Regola della catena, RDC) Siano $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $f : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, A e B aperti

(i) $g(A) \subseteq B$

(ii) Se $g = (g_1, \dots, g_m)$, $f = (f_1, \dots, f_k)$

Supponiamo che $g_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, m)$ sia diff. in un dato $x_0 \in A$
 $f_i : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, k)$ sia diff. in un dato $y_0 = g(x_0)$

Consideriamo ora la funzione $h := f \circ g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $h = (h_1, \dots, h_k)$

con $h_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

allora le funzioni $h_i : A \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, k)$ sono diff. in x_0 e

$$Dh(x_0) = Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)$$

1.7 Lez - 07

1.7.1 Derivate parziali di ordine superiore

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che $\exists \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : A \rightarrow \mathbb{R}$ poniamo:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &:= \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &:= \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \end{aligned} \right\} \text{Derivate parziali seconde pure}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &:= \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &:= \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \end{aligned} \right\} \text{Derivate parziali seconde miste}$$

quando tutte le derivate parziali scritte esistono.

Osservazione 1.7.1 In generale $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

1.7.2 Teo: Inversione dell'ordine di derivazione

Teorema 1.7.2 (sull'inversione dell'ordine di derivazione) [BDPG, 11.11]

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, $p_0 = (x_0, y_0) \in A$ fissato. Supponiamo $\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} : A \rightarrow \mathbb{R}$ e siano continue in p_0 , allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0)$

Il teorema precedente può estendersi al caso di funzioni $n \geq 2$ variabili.

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che esista $\frac{\partial f}{\partial x_i} : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, n$).

Se $\exists \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(x_0)$ in un punto $x_0 \in A$ per $j = 1, \dots, n$, diciamo che

$$\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0) := \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(x_0)$$

Nel caso in cui $j = i \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i}(x_0)$.

Con queste notazioni, vale la seguente generalizzazione del teorema sull'inversione dell'ordine di derivazione.

Teorema 1.7.3 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che per fissati $i, j = 1, \dots, n$, con $i \neq j$, $\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} : A \rightarrow \mathbb{R}$ e siano continue in x_0 . Allora:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)$$

Definizione 1.7.1 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto

- (a) f si dice di classe $C^2(A)$ e scriveremo $f \in C^2(A)$ se $f \in C^0(A)$ ed $\exists \frac{\partial f}{\partial x_i} : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\forall i = 1, \dots, n$, $\exists \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\forall i, j = 1, \dots, n$
- (b) f si dice di classe $C^m(A)$ e scriveremo $f \in C^m(A)$, ($m \geq 1$) se $f \in C^0(A)$ e $\exists \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\forall i_1, \dots, i_k = 1, \dots, n$ e $\forall 1 \leq k \leq m$

Osservazione 1.7.4 Se $f \in C^m(A)$, con $m \geq 2$ per il teo sull'inversione dell'ordine di derivazione

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$

$\forall x \in A, \forall i, j = 1, \dots, n$

1.7.3 Taylor per funzioni di più variabili

Problema: Data $f : B(p_0, r) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funzione di classe $C^m(B(p_0, r))$, approssimare f con un polinomio di $n = 2$ variabili di ordine m , nel modo "migliore possibile"

Definizione 1.7.2 Dato $m \in \mathbb{N}$, $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ fissato, si chiama polinomio di ordine m di $n = 2$ variabili, centrato in p_0 , una funzione $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$T(x, y) = \sum_{h=0}^m \sum_{i=0}^n c_{i, h-i} (x - x_0)^i (y - y_0)^{h-i}$$

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$, dove $c_{i, h-i}$ ($i = 0, \dots, h$ e $h = 0, \dots, m$) sono $\frac{(m+1)(m+2)}{2}$ coeff. ass.

Esempio 8 (a) Se $m = 0$, $T(x, y) = c_{0,0} \in \mathbb{R} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

(b) Se $m = 1$, $T(x, y) = c_{0,0} + c_{1,0}(x - x_0) + c_{0,1}(y - y_0)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

(c) Se $m = 2$, $T(x, y) = c_{0,0} + c_{1,0}(x - x_0) + c_{0,1}(y - y_0) + c_{2,0}(x - x_0)^2 + c_{1,1}(x - x_0)(y - y_0) + c_{0,2}(y - y_0)^2$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Problema: Sia $f \in C^2(B(p_0, r))$, determinare se esiste un polinomio $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ di ordine 2, centrato in p_0 , t.c.

$$f(p) = T(p) + o(\|p - p_0\|^2)$$

$\forall p = (x, y) \in B(p_0, r)$

Notazione 1.7.5 Se $v, w \in \mathbb{R}^n$, $v \cdot w = \langle v, w \rangle$

Definizione 1.7.3 Data $f \in C^2(A)$, $A \in \mathbb{R}^2$ aperto, si chiama, matrice hessiana di f in un punto $p \in A$, la matrice 2×2

$$D^2 f(p) = H(f)(p) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p) \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Osservazione 1.7.6 per il teo. dell'inv. dell'ordine di derivazione $D^2 f(p)$ è simmetrica

1.7.4 Taylor del II ordine + resto di Peano

Sia $f \in C^2(B(p_0, r))$, $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e $r > 0$ fissato. Allora vale:

$$(FT_2) f(p) = T_2(p) + o(\|p - p_0\|^2)$$

$\forall p = (x, y) \in B(p_0, r)$, dove

$$T_2(p) := f(p_0) + \langle \nabla f(p_0), p - p_0 \rangle + \frac{1}{2} \langle D^2 f(p_0) \cdot (p - p_0), p - p_0 \rangle$$

se $p \in \mathbb{R}^2$.

(polinomio di Taylor del II ordine di f , centrato in p_0)

Ricordiamo che con $o(\|p - p_0\|^2) \Rightarrow \exists \lim_{p \rightarrow p_0} \frac{o(\|p - p_0\|^2)}{\|p - p_0\|^2} = 0$

Dim. 12 Fissiamo $p \in B(p_0, r) \setminus \{p_0\}$ e denotiamo $v := \frac{p - p_0}{\|p - p_0\|} = (v_1, v_2)$, (direzione $p - p_0$) e definiamo: $F(t) := f(p_0 + tv)$, con $t \in (-r, r)$. Poichè la funzione $g : (-r, r) \rightarrow B(p_0, r) \subseteq \mathbb{R}^2$, $g(t) = p_0 + tv := (x_0 + tv_1, y_0 + tv_2)$ è una funzione di classe $C^2((-r, r))$, come pure f , per RDC la funzione composta: $F(t) = f(g(t))$, $t \in (-r, r)$, è di classe $C^2((-r, r))$. Pertanto possiamo applicare la formula di Taylor del II ordine per una funzione di una variabile per $t = 0$ e otteniamo:

$$(1) F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{1}{2}F''(0)t^2 + o(t^2) \text{ per } t \rightarrow 0$$

Calcoliamo $F(0), F'(0), F''(0)$. Per RDC:

•

$$F'(t) = \langle \nabla f(p_0 + tv), v \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0 + tv)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0 + tv)v_2$$

•

$$\begin{aligned} F''(t) &= v_1 \cdot \left\langle \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (p_0 + tv), v \right\rangle + v_2 \cdot \left\langle \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (p_0 + tv), v \right\rangle = \\ &= v_1 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_2 \right) + v_2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p_0 + tv)v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2 \right) = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_1v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2^2 \end{aligned}$$

Pertanto

$$(2) F(0) = f(p_0)$$

$$(3) F'(0) = \langle \nabla f(p_0), v \rangle$$

$$(4) F''(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_1v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2^2$$

Osserviamo che $F''(0)$ può essere riscritto mediante hessiana $D^2f(p_0)$, come (4bis) $F''(0) = \langle D^2f(p_0)v, v \rangle$, pertanto da (1), (2), (3), (4bis) otteniamo:

$$f(p_0 + tv) = F(t) = f(p_0) + \langle \nabla f(p_0), v \rangle t + \frac{1}{2} \langle D^2f(p_0)v, v \rangle t^2 + o(t^2), \text{ per } t \rightarrow 0$$

Scegliendo $t = \|p - p_0\|$, otteniamo la tesi.

Osservazione 1.7.7 (BDPG, 11.14) Si può ottenere una formula di Taylor con resto di Peano e Lagrange anche per funzioni $f : B(p_0, r) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ di classe $C^2(B(p_0, r))$ con $n \geq 3$.

Essa è molto più complicata perciò la omettiamo

Esercizio 13

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ x^2 \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \end{cases}$$

$\exists f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ma f' non è continua nel punto $x_0 = 0$

1.8 Lez - 08

1.8.1 Massimi e minimi per funzioni a più variabili

Problema: Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e data $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, determinare, se esistono, i punti di max e min di f .

Definizione 1.8.1 Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

1. $p_0 \in A$ si dice, punto di massimo ($= \max$) relativo di f su A se $\exists r_0 > 0$ t.c. $f(p) \leq f(p_0) \forall p \in A \cap B(p_0, r_0)$
Rispettivamente $p_0 \in A$ si dice, punto di minimo ($= \min$) relativo di f su A se $\exists r_0 > 0$ t.c. $f(p) \geq f(p_0) \forall p \in A \cap B(p_0, r_0)$
2. $p_0 \in A$ si dice punto di massimo ($= \text{MAX}$) assoluto se $\forall p \in A, f(p) \leq f(p_0)$
Rispettivamente $p_0 \in A$ si dice punto di minimo ($= \text{MIN}$) assoluto se $\forall p \in A, f(p) \geq f(p_0)$

Osservazione 1.8.1 Se p_0 è un punto di max (o min) assoluto $\Rightarrow p_0$ è punto di max (o min) relativo. Il viceversa non può valere.

N.B.: 1.8.2 Non confondere i punti di max e min di una funzione con il suo massimo e minimo.

- $\text{Min}_A f := \text{Min} f(p) : p \in A \in \mathbb{R}$, se esiste è unico
- $\text{Max}_A f := \text{Max} f(p) : p \in A \in \mathbb{R}$, se esiste è unico

Consideriamo il seguente esempio:

Esempio 9 $n = 1, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} f(x) =: x(3 - x^2)$

In particolare si può vedere che i punti $x = \pm 1$ sono rispettivamente max e min relativi, ma $x = -1$ non è minimo assoluto e $x = +1$ non è massimo assoluto.

Infatti essendo la funzione non limitata ($\sup_{\mathbb{R}} f = +\infty$ e $\inf_{\mathbb{R}} f = -\infty$) / $\exists \text{max}_{\mathbb{R}} f$ e $\text{min}_{\mathbb{R}} f$

1.8.2 Estremi liberi di una funzione (min/max relativi)

Problema: Supponiamo che $A \subseteq \mathbb{R}^n$ sia aperto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, vogliamo determinare se esistono i punti di max e min relativo su A . Questi punti sono detti estremi liberi di f .

Lo strumento principale per la ricerca di estremi liberi è :

Teorema 1.8.3 (Fermat) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che esista $p_0 \in A$ t.c.

(i) f differenziabile in p_0 . In particolare $\exists \nabla f(p_0)$

(ii) p_0 sia un estremo libero di f in A

Allora $\nabla f(p_0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0)$ (n -volte)

Il precedente teorema giustifica la seguente definizione:

Definizione 1.8.2 Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, un punto $p_0 \in A$ si chiama punto stazionario (o critico) di f se f è differenziabile in p_0 e $\nabla f(p_0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^n}$

Dim. 13 Per semplicità, $n = 2$, $p_0 = (x_0, y_0)$. Essendo A aperto esiste $\delta > 0$ t.c. $p_0 + te_1 \in A$ se $t \in (-\delta, \delta)$.

Consideriamo $F : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(t) := f(p_0 + te_1)$, da (i)

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \iff (1) \begin{cases} F \text{ è derivabile nel punto } t = 0 \\ e F'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \end{cases}$$

Dall'altra parte, da (ii) p_0 estremo libero di f (2) $t = 0$ è un estremo libero di F . Possiamo applicare il teorema di Fermat di una variabile ed otteniamo $F'(0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0)$.

Analogamente consideriamo $F(t) = f(p_0 + te_2)$ e si prova che $\frac{\partial f}{\partial y}(p_0) = 0$.

Pertanto si prova che $\nabla f(p_0) = (0, 0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^2}$

Osservazione 1.8.4 Non ogni punto stazionario di f è un punto di estremo libero.

Esempio 10 $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = y^3$, $p_0 = (x_0, 0)$.

Poichè $\nabla f(x, y) = (0, 3y^2)$, $\nabla f(p_0) = (0, 0)$. Pertanto ogni punto $p_0 = (x_0, 0)$ (per un fissato $x_0 \in \mathbb{R}$) è un punto stazionario di f , ma p_0 non è un estremo libero, infatti $\forall r > 0$ $f(x_0, 0) = 0 \forall x_0 \in \mathbb{R}$, quindi $p_0 = (x_0, 0)$ si dice punto di sella.

Definizione 1.8.3 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Un punto $p_0 \in A$ si dice punto di sella se p_0 è un punto stazionario di f e $f(p) - f(p_0)$ ammette sia valori positivi che negativi in ogni intorno di p_0

1.8.3 Matrice Hessiana

Problema: Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C^2(A)$. Supponiamo che $p_0 \in A$ sia un punto stazionario di f .

Come determinare se p_0 sia un estremo libero o un punto di sella?

Definizione 1.8.4 Sia $f \in C^2(A)$, si chiama, matrice hessiana di f nel punto $p_0 \in A$ la matrice simmetrica ($n \times n$)

$$D^2 f(p_0) = Hf(p_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(p_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(p_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(p_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(p_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)(p_0) \\ \vdots \\ \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)(p_0) \end{bmatrix}$$

1.8.4 Teorema: Criterio per il segno di una matrice

Richiami di algebra lineare

Definizione 1.8.5 Sia H una matrice $n \times n$

- (i) H si dice definita positiva se $\langle Hv, v \rangle > 0, \forall v \in \mathbb{R}^n \times \{\underline{0}\}$
- (ii) H si dice semi-definita positiva se $\langle Hv, v \rangle \geq 0, \forall v \in \mathbb{R}^n \times \{\underline{0}\}$
- (iii) H si dice definita negativa se $\langle Hv, v \rangle < 0, \forall v \in \mathbb{R}^n \times \{\underline{0}\}$
- (iv) H si dice semi-definita negativa se $\langle Hv, v \rangle \leq 0, \forall v \in \mathbb{R}^n \times \{\underline{0}\}$

Un criterio semplice per verificare il segno di una matrice H $n \times n$:

Teorema 1.8.5 (criterio per il segno di una matrice) Sia

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{n1} & \dots & h_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{una matrice } n \times n$$

Definiamo

$$D_i = \det \begin{bmatrix} h_{11} & \dots & h_{1i} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{i1} & \dots & h_{ii} \end{bmatrix} \quad \text{con } 1 \leq i \leq n$$

Allora

- (a) H è definita positiva $\iff D_i > 0 \forall i = 1, \dots, n$
- (b) H è definita negativa $\iff \begin{cases} D_i > 0 \text{ per } i \text{ valori pari di } i \\ D_i < 0 \text{ per } i \text{ valori dispari di } i \end{cases}$
- (c) Se $\det H = D_n \neq 0$ e nessuna delle condizioni precedenti fosse soddisfatta, allora H non è semi-definita positiva nè semi-definita negativa

Corollario 1.8.1 Se H (2×2) matrice simmetrica $H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$ con $h_{12} = h_{21}$

- (a) H è definita positiva $\iff h_{11} > 0$ e $\det H > 0$
- (b) H è definita negativa $\iff h_{11} < 0$ e $\det H > 0$
- (c) Se $\det H < 0$, allora H non è semi-def. pos. nè semi-def. neg.

Teorema 1.8.6 (BDPG, 11.25) Sia A aperto di \mathbb{R}^n , $f \in C^2(A)$ e sia $p_0 \in A$ un punto stazionario di f

- (i) Se $D^2 f(p_0)$ fosse def. pos. $\Rightarrow p_0$ è un punto di minimo relativo di f su A

- (ii) Se $D^2f(p_0)$ fosse def. neg. $\Rightarrow p_0$ è un punto di massimo relativo di f su A
- (iii) Se $D^2f(p_0)$ non fosse semi-def. pos. nè semi-def. neg. $\Rightarrow p_0$ è un punto di sella di f su A
- (iv) Se $D^2f(p_0)$ fosse semi-def. pos. o semi-def. neg. $\Rightarrow p_0$ può essere un punto di massimo o minimo relativo o un punto di sella di f su A

1.8.5 Esempi

Esempio 11 (1a, foglio 5) Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + 2kxy + y^2$.
Determinare al variare di $k \in \mathbb{R}$, i punti di max e min relativo di f .

Soluzione 1. Punti stazionari di f su \mathbb{R}^2

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 2ky = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2kx + 2y = 0 \end{cases}$$

- **Esercizio 14** Se $k \neq 1 \Rightarrow (0, 0)$ è l'unico punto stazionario
- Se $k = 1 \Rightarrow I$ punti della retta $x + y = 0$ sono tutti e soli i punti stazionari
- Se $k = -1 \Rightarrow I$ punti della retta $x - y = 0$ sono tutti e soli i punti stazionari

Soluzione 2. Studio del segno della matrice Hessiana

$$D^2f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} (x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 2k \\ 2k & 2 \end{bmatrix}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ e } \det D^2f(x, y) = 4 - 4k^2 = 4(1 - k^2)$$

- **Esercizio 15** Se $k^2 < 1 \Rightarrow D^2f(0, 0)$ è def. positiva $\Rightarrow (0, 0)$ è un punto di minimo relativo
- Se $k = 1$, $\det D^2f(x_0, -x_0) = 0 \Rightarrow D^2f(x_0, -x_0)$ non è def-neg. nè def-pos. \Rightarrow nulla si può dire
 - * Se $k = 1$, $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 \Rightarrow (x_0, -x_0)$ è un punto di minimo assoluto
 - * Se $k = -1$, $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2 \Rightarrow (x_0, -x_0)$ è un punto di minimo assoluto

Appendice:

1. Se f è differenziabile in p_0 e $\nabla f(p_0) = (0, 0) \Rightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial v}(p_0) = 0 \forall v \in \mathbb{R}^2$, $\|v\| = 1$.
Infatti poichè $\frac{\partial f}{\partial v}(p_0) = \nabla f(p_0) \cdot \underline{Q}_{\mathbb{R}^2} \cdot v = 0$

2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, $x_0 = 0$, il punto di $x_0 = 0$ è un punto di minimo assoluto per f .
3. Se $k = 1$ i punti della retta di eq: $x + y = 0$ sono tutti e soli i punti stazionari di f .
4. $k = 1$, $f(x, y) = (x + y)^2 \geq 0 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x_0, -x_0) = 0$

1.9 Lez - 09

Problema: Condizioni che assicurino l'esistenza di $\min_A f$ e $\max_A f$ e come determinarli

Teorema 1.9.1 (Weirestrass) [BDPG,10.10] Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, Supponiamo che:

(i) A sia limitato e chiuso, (in $n = 1$, $A = [a, b]$, $\partial A = \{a, b\}$, $\mathring{A} = (a, b)$)

(ii) f sia continua su A

Allora esiste $\min_A f$ e $\max_A f$

1.9.1 Ricerca del max e min (assoluto) su insieme limitato e chiuso

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato e chiuso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora per il Teorema di Weirestrass $\exists \min_A f = f(p_1)$ e $\exists \max_A f = f(p_2)$.

Vi sono le seguenti possibilità se $i = 1, 2$

(i) $p_i \in \mathring{A}$ e $\exists \nabla f(p_i) = (0, 0)$

(ii) $p_i \in \mathring{A}$ ma $\nexists \nabla f(p_i)$, diremo in questo caso che p_i è punto singolare

(iii) $\partial_i \in \partial A$

Problema:[BDPG,13.2] Ricerca dei punti di max e min nei punti della frontiera di A , detti anche estremi vincolati

- $\max, \min \in \mathring{A} \Rightarrow$ estremi liberi
- $\max, \min \in \partial A \Rightarrow$ estremi vincolati

Esempio 12 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f(x, y) = x^2 + 2y^2$

- $\mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$
- $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
- $\nabla f(x, y) = (2x, 4y) \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$f(p_2) = \exists \max_A f$ e $f(p_1) = \exists \min_A f$, $\nabla f(x, y) = (0, 0) \iff x = y = 0$

$f(0, 0) = 0$ e $p_1 = (0, 0)$ è un punto di minimo assoluto di f .

È chiaro che $p_2 \in \partial A$ e dunque vale che $\max_A f = \max_{\partial A} f$
quindi ci poniamo il problema di come determinare $\max_{\partial A} f$

Osservazione 1.9.2 $\nabla f(x, y) = (2x, 4y) \neq (0, 0) \quad \forall (x, y) \in \partial A$

1.9.2 Frontiera attraverso parametrizzazione

Caso $n = 2$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato e chiuso.

Si chiama parametrizzazione di ∂A una funzione $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (detta curva)

- (P1) $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$
- (P2) con $\gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1
- (P3) e $\gamma([a, b]) = \partial A$

Supponiamo che $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e vogliamo minimizzare/massimizzare f su ∂A

Definiamo $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(t) = f(\gamma(t))$.

Si può provare tramite RDC che $F \in C^1([a, b])$. Inoltre è immediato verificare

$\min_{\partial A} f = \min_{[a, b]} F$ e $\max_{\partial A} f = \max_{[a, b]} F$

Pertanto la ricerca di $\min_{\partial A} f$ e $\max_{\partial A} f$ si riduce a $\min_{[a, b]} F$ e $\max_{[a, b]} F$

Ritorniamo all'esempio 12:

Una parametrizzazione di $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ è data da

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t) \quad t \in [0, 2\pi] \quad \gamma([0, 2\pi]) = \partial A$$

$F(t) = f(\cos t, \sin t) = \cos^2 t + 2\sin^2 t = 1 + \sin^2(t)$, allora è facile verificare che

$$\max_{[0, 2\pi]} F = 2 = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{3}{2}\pi\right)$$

Pertanto i punti di ∂A dove è raggiunto il massimo sono dati da:

$$\gamma\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1) \text{ e } \gamma\left(\frac{3}{2}\pi\right) = (0, -1)$$

Infatti $f(0, 1) = f(0, -1) = 2$

Caso $n = 3$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ chiuso e limitato. Si chiama parametrizzazione di ∂A una funzione

$\gamma : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\gamma(s, t) = (\gamma_1(s, t), \gamma_2(s, t), \gamma_3(s, t))$$

Con $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 : B \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

(P1) B chiuso e limitato

(P2) $\gamma(B) = \partial A$

(P3) $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in C^1(\overset{\circ}{B}) \cap C^0(B)$

∂A è detta superficie.

Sia $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ si vuole determinare $\max_{\partial A} f$ e $\min_{\partial A} f$.
Definiamo $F : B \rightarrow \mathbb{R}$, $F(s, t) := f(\gamma(s, t))$ con $(s, t) \in B$, allora

$$\min_{\partial A} f = \min_B F \text{ e } \max_{\partial A} f = \max_B F$$

Osservazione 1.9.3 *Pertanto il $\min_{\partial A} f$ e il $\max_{\partial A} f$ (di una funzione di 3 variabili sul bordo di A) viene riportato al $\min_B F$ e $\max_B F$ (di una funzione di 2 variabili) su un insieme $B \subseteq \mathbb{R}^2$*

Esempio 13 *Sia $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $f(x, y, z) = x + y - z$. Determinare $\min_A f$ e $\max_A f$.*

Soluzione:

1. **Punti stazionari di \mathring{A}**
Osserviamo che $f \in C^\infty(\mathring{A})$.

Esercizio 16 *Non ci sono punti stazionari in \mathring{A}*

Dal'altra parte $f \in C^0(A)$ ed $A \subseteq \mathbb{R}^3$ è chiuso e limitato. Pertanto per il teorema di Weirestrass

$$\exists \min_A f = \min_{\partial A} f \text{ e } \max_A f = \max_{\partial A} f$$

2. **Max e min su ∂A**
 $\partial A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, $B = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \subseteq \mathbb{R}^2 \ni (\vartheta, \varphi)$

$$\gamma(\vartheta, \varphi) = (\cos \vartheta \sin \varphi, \sin \vartheta \sin \varphi, \cos \varphi)$$

γ è una parametrizzazione di ∂A (cambiamento di coordinate sferiche)
 $F(\vartheta, \varphi) := f(\gamma(\vartheta, \varphi)) = \cos \vartheta \sin \varphi + \sin \vartheta \sin \varphi - \cos \varphi = \sin \varphi \cdot (\cos \vartheta + \sin \vartheta) - \cos \varphi$

Per proseguire nella nostra strategia dovremmo determinare $\min_B F$ e $\max_B F$ con $F : B = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$.

Ci rendiamo conto subito che questa ricerca non è semplice.

Osservazione 1.9.4 *In effetti il metodo di ricerca dei max e min di una funzione su un bordo dato come parametrizzazione, diventa complesso, e dunque inefficace per funzioni di variabili $n \geq 3$*

1.9.3 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange, TML

Caso $n = 2$

Supponiamo che l'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) \leq 0\}$ dove $\partial A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$.

Un insieme del piano $V := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ è detto vincolo (è una curva del piano)

Teorema 1.9.5 (Teorema dei moltiplicatori di Lagrange, TML) Sia $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ dove $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Supponiamo che:

(i) $\exists \min_V f = f(p_0)$ (o $\exists \max_V f = f(p_0)$) con $p_0 = (x_0, y_0) \in V$

(ii) $\exists \nabla g(p_0) \neq (0, 0)$

Allora esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ (detto moltiplicatore) t.c. $(x_0, y_0, \lambda_0) \in \mathbb{R}^3$ è un punto stazionario della funzione.

Equivalentemente:

$$\exists \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \begin{cases} g(p_0) = 0 \\ \nabla f(p_0) + \lambda_0 \nabla g(p_0) = (0, 0) \end{cases} \quad (*)$$

Definizione 1.9.1 Un punto $p_0 \in V$ verificante 5.2.3 (*) su opportuno $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ si dice **punto stazionario vincolato alla funzione f relativamente al vincolo V**

Esempio 14 Trovare $\max_{\partial A} f$ se $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ e $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Sia $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Allora:

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0\}$, $\nabla g(x, y) = (2x, 2y) \neq (0, 0) \forall (x, y) \in \partial A$.

Pertanto possiamo applicare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange:

Sia $L(x, y, \lambda) := x^2 + 2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$,

$$\nabla L(x, y, \lambda) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y + 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff (x, y, \lambda) = (\pm 1, 0, -1), (0, \pm 1, -2),$$

$$\min_{\partial A} f = f(\pm 1, 0) = 1 \text{ e } \max_{\partial A} f = f(0, \pm 1) = 2$$

Teorema della funzione implicita, U. Dini

Prima della dimostrazione del metodo dei moltiplicatori di Lagrange, premettiamo il seguente teorema:

Teorema 1.9.6 (della funzione implicita, U. Dini) [BDPG, 13.3] Supponiamo che, per esempio, $g(p_0) = 0$ e $\frac{\partial g}{\partial y}(p_0) \neq 0$.

Allora \mathcal{V} è localmente grafico di una funzione $y = \varphi(x)$, cioè $\exists \delta_0 > 0$ ed è un'unica funzione $\varphi : (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \rightarrow \mathbb{R}$, $\exists r_0 > 0$ t.c.

(D_1) $\mathcal{V} \cap B(p_0, r_0) = \{(x, \varphi(x)) : x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)\}$ e $\varphi(x_0) = y_0$

(D_2) φ è derivabile e

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial g}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

$$\forall x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$$

Dim. 14 (TML, 5.2.3) Supponiamo per esempio che $\frac{\partial g}{\partial y}(p_0) \neq 0$.

Possiamo applicare il teorema della funzione implicita 1.9.6: per D_1 , possiamo definire $h(x) := f(x, \varphi(x))$ $x \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$

Essendo $p_0 \in \mathcal{V}$ un punto di minimo (da ipotesi) di f su $\mathcal{V} \Rightarrow (1)x_0$ è un punto di minimo di h si $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$.

D'altra parte, per RDC, $h \in C^1((x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0))$.

Per il teorema di Fermat, per funzioni di 1 variabile,

$$\begin{aligned} 0 = h'(x_0) &=_{(RDC)} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \varphi(x_0)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0) = \\ &=_{(D_2)} \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cdot \left(-\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial g}{\partial y}(x, \varphi(x))} \right) \iff \\ \iff \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(p_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(p_0) \end{bmatrix} &= 0 \iff \exists \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \nabla f(p_0) = -\lambda_0 \nabla g(p_0) \end{aligned}$$

Caso $n = 3$

Il teorema dei moltiplicatori di Lagrange su può estendere a funzioni di $n = 3$ variabili

Teorema 1.9.7 (TML con $n = 3$) Sia $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ e $\mathcal{V} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = 0\}$ dove $g \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Supponiamo che:

(i) $\exists \min_{\mathcal{V}} f = f(p_0)$ (o $\exists \max_{\mathcal{V}} f = f(p_0)$) con $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{V}$

(ii) $\exists \nabla g(p_0) \neq (0, 0, 0)$

Allora

$$\exists \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \begin{cases} g(p_0) = 0 \\ \nabla f(p_0) + \lambda_0 \nabla g(p_0) = (0, 0, 0) \end{cases} \quad (*)$$

Osservazione 1.9.8 Il vincolo \mathcal{V} in questo caso è una superficie di \mathbb{R}^3

Esempio 15 Trovare $\max_{\partial A} f$, $f(x, y, z) = x + y - z$ e $\partial A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ **Soluzione:**

Applichiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per funzioni di $n = 3$ variabili

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = x + y - z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

se $(x, y, z, \lambda) \in \mathbb{R}^4$, in quanto $\partial A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = 0\}$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2x\lambda & = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + 2y\lambda & = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = -1 + 2z\lambda & = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 1 & = 0 \end{cases} \iff (x, y, z, \lambda) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \mp \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \max_{\partial A} f = \max \left\{ f \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\} = \sqrt{3} \text{ e}$$

$$\min_{\partial A} f = \min \left\{ f \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\} = -\sqrt{3}$$

Chapter 2

Integrale per funzioni a più variabili, [BDPG, 14]

Vogliamo introdurre la nozione di integrale per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n = 2, 3$), detto anche integrale multiplo

2.1 Lez - 10, Integrale doppio su un rettangolo

Caso $n = 2$

$A = Q = [a, b] \times [c, d]$ e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, cioè $\exists M > 0$ t.c. $|f(p)| \leq M \forall p \in A$

Idea:(Interpretazione geometrica dell'integrale)

Supponiamo $f(p) \geq 0 \forall p \in A$, definiamo

$$\mathbb{T}_f(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq f(x, y), (x, y) \in A\}$$

(trapezoidale indotta da $f : A \rightarrow \mathbb{R}$).

$\mathbb{T}_f(A) \equiv$ solido di \mathbb{R}^3 sotteso dal grafico di f , G_f .

Vogliamo definire un numero reale non negativo:

$$L = \iint_A f(x, y) dx dy \text{ (integrale doppio di } f \text{ su } A)$$

t.c. $L = \text{volume}(\mathbb{T}_f(A))$

Definizione 2.1.1 (i) Si chiama suddivisione dell'intervallo $[a, b]$ un insieme finito (detto retta reale) $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ t.c. $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$

(ii) Si chiama *suddivisione dell'insieme* $Q = [a, b] \times [c, d]$ *l'insieme (del piano)*
 $\mathcal{D} := \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 = \{(x_i, y_j) : i = 0, \dots, n, j = 0, \dots, m\}$, *dove:*

$$\mathcal{D}_1 = \{x_0, \dots, x_n\} \text{ suddivisione di } [a, b]$$

$$\mathcal{D}_2 = \{y_0, \dots, y_m\} \text{ suddivisione di } [c, d]$$

Dato \mathcal{D} una suddivisione di Q , Q resta suddiviso in $n \times m$ rettangoli

$$Q_{ij} := [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

con $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$

$$\text{Definiamo } \text{area}(Q_{ij}) := (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

Definizione 2.1.2 Si chiama *somme superiore* (risp. *somme inferiore*) di f rispetto alla suddivisione \mathcal{D} di Q , fissata una funzione $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$, il numero reale

$$S(f, \mathcal{D}) := \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n M_{ij} \text{area}(Q_{ij}) \quad M_{ij} := \sup_{Q_{ij}} f$$

rispettivamente il numero reale

$$s(f, \mathcal{D}) := \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} \text{area}(Q_{ij}) \quad m_{ij} := \inf_{Q_{ij}} f$$

Osservazione 2.1.1 Essendo f limitata, $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$

$$M_{ij} := \sup_{Q_{ij}} f := \sup\{f(p) : p \in Q_{ij}\}$$

$$m_{ij} := \inf_{Q_{ij}} f := \inf\{f(p) : p \in Q_{ij}\}$$

2.1.1 Proprietà importanti delle somme sup. ed inf.

(PS1) Se $f \geq 0$ su Q , allora $M_{ij} \text{area}(Q_{ij})$ e $m_{ij} \text{area}(Q_{ij})$ rappresentano il volume di un parallelepipedo di base Q_{ij} ed altezza M_{ij} o m_{ij}

(PS2) Per ogni suddivisione \mathcal{D} di Q

$$\text{area}(Q) \cdot \inf_Q f \leq s(f, \mathcal{D}) \leq S(f, \mathcal{D}) \leq \text{area}(Q) \cdot \sup_Q f$$

(PS3) Si potrebbe provare (ma lo omettiamo) che, prese \mathcal{D}' e \mathcal{D}'' due suddivisioni di Q , allora $s(f, \mathcal{D}') \leq S(f, \mathcal{D}'')$

Definizione 2.1.3 Siano $Q = [a, b] \times [c, d]$ e $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. La funzione si dice *integrabile (secondo Reimann)* su Q , e scriveremo $f \in \mathcal{R}(Q)$, se

$$L = \sup\{s(f, \mathcal{D}) : \mathcal{D} \text{ sudd. di } Q\} = \inf\{S(f, \mathcal{D}) : \mathcal{D} \text{ sudd. di } Q\}$$

Il numero reale L si chiama integrale(doppio) e si denota

$$L = \iint_Q f(x, y) dx dy = \iint_Q f = \int_Q f$$

Nel caso in cui $f \geq 0$ ed $f \in \mathcal{R}(Q)$, definiamo il volume del solido $\mathbb{T}_f(Q)$

$$\text{vol}(\mathbb{T}_f(Q)) := \iint_Q f$$

2.1.2 Teoremi: Esistenza & Proprietà integrale

Problema: Condizioni che assicurano $f \in \mathcal{R}(Q)$?

Richiami per funzioni di $n = 1$ variabili $Q = [a, b]$

Teorema 2.1.2 $f \in C^0([a, b])$, allora $f \in \mathcal{R}([a, b])$,
 $f \geq 0, f \in C^0([a, b])$, $\text{area}(\mathbb{T}_f([a, b])) := \int_a^b f(x) dx$

Teorema 2.1.3 Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è non decrescente (cioè $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$), allora $f \in \mathcal{R}([a, b])$

Teorema 2.1.4 (Esistenza dell'integrale) [BDPG, 14.4] Sia $f \in C^0(Q)$ allora $f \in \mathcal{R}(Q)$

Teorema 2.1.5 (Proprietà dell'integrale) [BDPG, 14.5] Siano $f, g \in \mathcal{R}(Q)$ con $Q = [a, b] \times [c, d]$

(i) **Linearità** : $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(Q)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e

$$\iint_Q (\alpha f + \beta g) = \alpha \iint_Q f + \beta \iint_Q g$$

(ii) **Monotonia**: Se $g \leq f$ su Q , allora

$$\iint_Q g \leq \iint_Q f$$

(iii) **Valore assoluto**: $|f| \in \mathcal{R}(Q)$ e

$$\left| \iint_Q f \right| \leq \iint_Q |f|$$

(iv) **Teorema della media interale**

$$\inf_Q f \leq \frac{1}{\text{area}(Q)} \iint_Q f \leq \sup_Q f$$

e il valore $\frac{1}{\text{area}(Q)} \iint_Q f \equiv \text{media integrale di } f \text{ su } Q$.
 Se $f \in C^0(Q)$, allora esiste $p_0 = (x_0, y_0) \in Q$ t.c.

$$f(p_0) = \frac{1}{\text{area}(Q)} \iint_Q f$$

2.1.3 Formula di riduzione sui rettangoli

Problema: Sia $f \in \mathcal{R}(Q)$, come calcolare $\iint_Q f$?

Teorema 2.1.6 (Formula di riduzione sui rettangoli) [BDPG, 14.6] Siano $Q = [a, b] \times [c, d]$ e $f \in \mathcal{R}(Q)$

- (i) Supponiamo che, $\forall y \in [c, d]$, la funzione $[a, b] \ni x \rightarrow f(x, y)$ sia integrabile (come funzione di una variabile), allora la funzione $[c, d] \ni y \rightarrow \int_a^b f(x, y) dx$ è integrabile su $[c, d]$ e

$$(1) \iint_Q f = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

- (ii) Supponiamo che, $\forall x \in [a, b]$, la funzione $[c, d] \ni y \rightarrow f(x, y)$ sia integrabile (come funzione di una variabile), allora

$$(2) \iint_Q f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

In particolare se $f \in C^0(Q)$, valgono (i) e (ii) e

$$(3) \iint_Q f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Osservazione 2.1.7 (Principio di Cavalieri) La formula (2) può essere interpretata geometricamente nel modo seguente:

sia $f \geq 0$, definiamo la regione piana $\mathbb{T}_f^x(Q) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq f(x, y)\}$ per $x \in [a, b]$ fissato. Allora

$$A(x) = \int_c^d f(x, y) dy = \text{area}(\mathbb{T}_f^x(Q))$$

Pertanto la (2) si può interpretare come

$$\begin{aligned} \text{volume}(\mathbb{T}_f(Q)) &:= \iint_Q f =_{(2)} \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \\ &= \int_a^b \text{area}(\mathbb{T}_f^x(Q)) dx \text{ somma di volumi infinitesimi} \end{aligned}$$

2.1.4 Esempio

Esempio 16 Calcolare $\iint_Q f$ dove $Q = [0, 1] \times [0, \pi]$, $f(x, y) := x \cdot \sin(xy)$

Soluzione:

È facile verificare che $f \in C^0(Q)$, quindi possiamo utilizzare la formula (3), però osserviamo che, ai fini del calcolo, utilizzare (1) o (2) può essere differente.

$$\iint_Q f = \int_0^1 \left(\int_0^\pi x \cdot \sin(xy) dy \right) dx$$

Fissiamo $0 \leq x \leq 1$

$$\int_0^\pi x \cdot \sin(xy) dy = x \int_0^\pi \sin(xy) dy = x \left(-\frac{\cos(xy)}{x} \right) \Big|_0^\pi = -\cos(\pi x) + 1$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^\pi x \cdot \sin(xy) dy \right) dx &= \int_0^1 (-\cos(\pi x) + 1) dx = \\ &= -\frac{\sin(\pi x)}{\pi} + x \Big|_0^1 = -\frac{\sin \pi}{\pi} + 1 + \frac{\sin 0}{\pi} - 0 = 1 \end{aligned}$$

Esercizio 17 Verificare che l'integrale iterato

$$1 = \iint_Q f = \int_0^\pi \left(\int_0^1 x \cdot \sin(xy) dx \right) dy = \int_0^\pi \frac{\sin(y) - y \cos(y)}{y^2} dy$$

L'ultimo integrale, esiste, ma la funzione integranda non ammette come primitiva rappresentabile come funzioni elementari, come, per esempio $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int e^{-x^2} dx$, $[0, 1] \ni x \rightarrow \frac{\sin(x)}{x}$ è continua, dunque $\exists \int_0^1 \frac{\sin(x)}{x} dx \in \mathbb{R}$

2.2 Lez 11 - Integrale doppio su insiemi generali

Vogliamo definire la nozione di integrale per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, dove A è un dominio più generale di un rettangolo.

Definizione 2.2.1 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e A limitato e sia $Q = [a, b] \times [c, d] \supset A$. Definiamo

$$\tilde{f} : Q \rightarrow \mathbb{R}, \tilde{f}(x, y) := \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in A \\ 0 & \text{se } (x, y) \in Q \setminus A \end{cases}$$

Si dice che f è integrabile su A , e scriveremo $f \in \mathcal{R}(A)$, se $\tilde{f} \in \mathcal{R}(Q)$. In questo caso:

$$\iint_A f = \iint_Q \tilde{f} \text{ (integrale doppio di } f \text{ su } A)$$

Osservazione 2.2.1 (i) Si può verificare (ma omettiamo) che l'integrabilità di f su A non dipende dalla scelta del rettangolo Q , come pure il valore $\iint_Q \tilde{f}$

(ii) La funzione \tilde{f} , tipicamente, non sarà continua nei punti di frontiera ∂A

Esempio 17 $A =$ cerchio del piano, $f = 1$ su A .

$$G_{\tilde{f}} := \{(x, y, 1) : (x, y) \in A\} \cup \{(x, y, 0) : (x, y) \in Q \setminus A\}$$

Se Q è un rettangolo contenente A , allora $\tilde{f} : Q \rightarrow \mathbb{R}$, come definita in 2.2.1, è discontinua in tutti i punti di ∂A .

In accordo con la nostra definizione precedente e tenendo conto della nostra idea geometrica di integrale doppio

$$\iint_Q \tilde{f} := \text{volume}(\mathcal{T}_{\tilde{f}}(Q))$$

dove $\mathcal{T}_{\tilde{f}}(Q) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq \tilde{f}(x, y)\} = \{(x, y, 0) : (x, y) \in Q \setminus A\} \cup \{(x, y, z) : (x, y) \in A, 0 \leq z \leq 1\} = P \cup \mathcal{T}_f(A)$, essendo P una parte limitata di un piano, $\text{volume}(P) = 0$, mentre $\text{volume}(\mathcal{T}_f(A)) = \text{volume}(A \times [0, 1]) = \text{area}(A)$.

Quindi questo ragionamento ci porta a concludere:

$$\iint_A f := \iint_Q \tilde{f} = \text{volume}(\mathcal{T}_{\tilde{f}}(Q)) = \text{area}(A)$$

Pertanto, da questo ragionamento, risulta evidente che, se per l'insieme A non fosse definita una nozione di area non sapremmo come calcolare $\iint_A f$

2.2.1 Insiemi numerabili e loro area

Definizione 2.2.2 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definita come $f(x) := 1$ se $x \in A$, con A limitato. L'insieme A si dice misurabile (secondo Peano-Jordan) se $f \in \mathcal{R}(A)$. In questo caso il valore dell'integrale si chiama misura (o area) di A e si denota

$$|A|_2 := \iint_A 1 \, dx \, dy$$

Osservazione 2.2.2 Se $A = Q = [a, b] \times [c, d]$, allora è facile verificare che Q è misurabile e

$$|Q|_2 = \text{area}(Q) = (b - a)(d - c)$$

Teorema: Caratterizzazione degli insiemi misurabili

Teorema 2.2.3 (Caratterizzazione degli insiemi misurabili) [BDPG, 14.9]
Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato. Allora

$$A \text{ è misurabile} \iff \partial A \text{ è misurabile e } |\partial A|_2 = 0$$

Teorema 2.2.4 (BDPG, 14.11) Sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile (come funzione di $n=1$ variabile). Allora $G_g := \{(x, g(x)) : x \in [a, b]\}$ è misurabile e $|G_g|_2 = 0$

Tramite i teoremi 2.2.3, 2.2.4 si può provare il seguente corollario.

Corollario 2.2.1 Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato. Supponiamo che

$$\partial A = \bigcup_{i=1}^k G_{g_i}$$

dove $g_i : [a_i, b_i] \rightarrow \mathbb{R}$ continue $\forall i = 1, \dots, k$
Allora A è misurabile.

Esempio 18 (Misurabilità insiemi semplici del piano) Siano $g_1, g_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue e supponiamo che $g_1(x) \leq g_2(x) \forall x \in [a, b]$. Sia

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

insieme semplice rispetto all'asse y .

Esercizio 18 A è limitato e chiuso.

$$\partial A = G_{g_1} \cup \{(b, y) : g_1(b) \leq y \leq g_2(b)\} \cup G_{g_2} \cup \{(a, y) : g_1(a) \leq y \leq g_2(a)\}$$

Pertanto $|\partial A|_2 = 0$ e, per il corollario 2.2.1, A è misurabile.

2.2.2 Integrali doppi su insiemi misurabili

Teorema: Esistenza integrale doppio su insiemi misurabili

Teorema 2.2.5 (Esistenza integrale doppio su insiemi misurabili) [BDPG, 14.13] Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che:

- A sia limitato e misurabile
- f sia limitato e $f \in C^0(A)$

Allora $f \in \mathcal{R}(A)$

Osservazione 2.2.6 • Dal 2.2.5, segue che, se A è limitato, chiuso e misurabile e $f \in C^0(A)$, allora $f \in \mathcal{R}(A)$

- Continuano a valere le proprietà di linearità, monotonia e il teorema della media integrale, che abbiamo visto per l'integrale doppio di una funzione definita su un rettangolo

Infine vale il seguente risultato, molto utili nel calcolo di integrali.

2.2.3 Teo.: Integrale doppio su insieme di misura nulla

Teorema 2.2.7 (Integrale doppio su insieme di misura nulla) [BDPG, 14.15]

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un insieme limitato e misurabile, sia $f \in \mathcal{R}(A)$. Supponiamo che $A = B \cup C$, con B e C misurabili e $|C|_2 = 0$. Allora:

$$\iint_A f = \iint_B f$$

Osservazione 2.2.8 Una immediata conseguenza di 2.2.3 e 2.2.7 è la seguente: sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato e misurabile e sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{R}(A)$, allora

$$\iint_A f = \iint_{\dot{A}} f$$

2.3 Integrali doppi su domini semplici e formule di riduzione

Definizione 2.3.1 Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^2$ si dice

- Dominio semplice (o normale) rispetto all'asse y se esistono $g_1, g_2 \in C^0([a, b])$ t.c. $g_1 \leq g_2$ su $[a, b]$ e

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

- Dominio semplice (o normale) rispetto all'asse x se esistono $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$ t.c. $h_1 \leq h_2$ su $[c, d]$ e

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Osservazione 2.3.1 Ricordiamo che, per quanto visto prima, un dominio semplice è limitato e misurabile. Inoltre, per il 2.2.5, se A è semplice ed $f \in C^0(A)$, allora $f \in \mathcal{R}(A)$

Vogliamo ora introdurre una formula per il calcolo di integrali doppi su domini semplici.

2.3.1 Teorema: Formula di riduzione su domini semplici

Teorema 2.3.2 (Formula di riduzione su domini semplici) [BDPG, 14.17]

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio semplice rispetto ad uno degli assi. Supponiamo che $f \in C^0(A)$, allora $f \in \mathcal{R}(A)$ e valgono le seguenti formule:

1. Se $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ con $g_1, g_2 \in C^0([a, b])$, allora

$$(1) \iint_A f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

In particolare A è misurabile e $|A|_2 = \iint_A 1 = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x)) dx$

2. Se $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ con $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$, allora

$$(2) \iint_A f = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

In particolare A è misurabile e $|A|_2 = \iint_A 1 = \int_c^d (h_2(y) - h_1(y)) dy$

Osservazione 2.3.3 Le proprietà di linearità, monotonia e il teorema della media integrale, continuano a valere per integrali doppi su domini semplici.

Esempio 19 Calcolare $\iint_A f(x, y) dx dy$ nei seguenti casi:

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$, $f(x, y) = x$

Soluzione:

A è un dominio semplice rispetto all'asse y ed $f \in C^0(A)$, possiamo applicare la 2.3.2 (1), ottenendo che

$$\iint_A f = \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} x dy \right) dx$$

Fissato $x \in [0, 1]$,

$$\int_0^{x^2} x dy = x \int_0^{x^2} 1 dy = xy \Big|_0^{x^2} = x^3$$

Pertanto

$$\iint_A x dx dy = \int_0^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$$

2. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$, $f(x, y) = \frac{\sin(x)}{x}$

Soluzione:

A è un dominio semplice rispetto all'asse x ed $f \in C^0(A)$, possiamo applicare la 2.3.2 (2), ottenendo che

$$\iint_A \frac{\sin(x)}{x} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{x} dx \right) dy$$

Fissiamo $y \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\exists \int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{x} dx, \text{ ma non si può calcolare}$$

Osserviamo che A è un dominio semplice anche rispetto all'asse y , infatti:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq x\}$$

possiamo quindi applicare 2.3.2 (1) ed otteniamo

$$\iint_A \frac{\sin(x)}{x} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx$$

Fissiamo $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$

$$\int_0^x \frac{\sin(x)}{x} dy = \frac{\sin(x)}{x} \int_0^y dy = \frac{\sin(x)}{x} \cdot x = \sin(x)$$

Pertanto

$$\iint_A \frac{\sin(x)}{x} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx = -\cos(x)|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

2.4 Lez - 12

2.4.1 Applicazione della formula di riduzione su domini semplici al calcolo di volumi di solidi

Definizione 2.4.1 Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato e misurabile e $f \in \mathcal{R}(A)$, con $f \geq 0$ su A . Denotiamo

$$\mathbb{T}_f(A) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in A\}$$

Si chiama volume del solido $\mathbb{T}_f(A)$ il numero

$$\text{volume}(\mathbb{T}_f(A)) := \iint_A f$$

Tramite la formula (1) e (2) del precedente teorema 2.3.2 si possono calcolare i volumi di diversi solidi.

Esempio 20 Sappiamo che $A \subseteq \mathbb{R}^2$ sia un dominio semplice rispetto a y , allora dalla (1) si ottiene:

$$(*) \text{ volume}(\mathbb{T}_f(A)) = \iint_A f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Esercizio 19 Calcolare il volume del solido di \mathbb{R}^3 ,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq y^2, (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]\}$$

Soluzione:

È facile verificare che $S = \mathbb{T}_f(A)$ con $A = [0, 1] \times [0, 1]$ dominio semplice sia rispetto y che x , ed $f(x, y) := y^2$, $f \in C^0(A)$. Pertanto possiamo applicare (*) e otteniamo

$$\text{volume}(S) = \text{volume}(\mathbb{T}_f(A)) = \iint_A f = \int_0^1 \left(\int_0^1 y^2 dy \right) dx$$

se rappresentiamo

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

Fissato $x \in [0, 1]$,

$$\int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Pertanto

$$\text{volume}(S) = \int_0^1 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}$$

Infine vale la seguente proprietà, molto utili nel calcolo di integrali doppi

2.4.2 Teorema: Additività dell'integrale doppio

Teorema 2.4.1 (Additività dell'integrale doppio) [BDPG, 14.18]

Siano $A_1, \dots, A_m \subseteq \mathbb{R}^2$ insiemi semplici t.c.

$$A_i \cap A_j \subseteq \partial A_i \cap \partial A_j$$

se $i \neq j, i, j = 1, \dots, m$.

Sia $f : A_1 \cup \dots \cup A_m \rightarrow \mathbb{R}$ e supponiamo che $f \in \mathcal{R}(A_i) \forall i = 1, \dots, m$.

Allora f è integrabile su $A_1 \cup \dots \cup A_m$, cioè $f \in \mathcal{R}(A_1 \cup \dots \cup A_m)$ e

$$\iint_{A_1 \cup \dots \cup A_m} f = \sum_{i=1}^m \iint_{A_i} f$$

2.5 Cambiamento di var. per gli integrali doppi

2.5.1 Caso particolare: coordinate polari

Problema: Calcolare il volume della semisfera di centro $(0, 0, 0)$ e raggio $r > 0$ in \mathbb{R}^3 .

È facile verificare che, se denotiamo S la semisfera di centro $(0, 0, 0)$ e raggio $r > 0$,

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2, z \geq 0\}$$

$$z^2 \leq r^2 - (x^2 + y^2), 0 \leq z \leq \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)}$$

Inoltre, se denotiamo $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ allora S può essere anche rappresentato nella forma

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} \right\} = \mathcal{T}_f(D)$$

dove $f(x, y) := \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)}, (x, y) \in D$.

Utilizzando la nostra definizione di volume $\mathcal{T}_f(D)$, otteniamo che

$$\text{volume}(S) = \text{volume}(\mathcal{T}_f(D)) := \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

Esercizio 20 Calcolare $\iint_D \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} \, dx \, dy$

Soluzione:

- **Primo modo**

Osserviamo che l'insieme D può essere rappresentato come un dominio semplice rispetto all'asse y . Infatti

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -r \leq x \leq r, -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}$$

Utilizzando la formula di riduzione per integrali doppi su domini semplici, otteniamo

$$\iint_D \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dx dy = \int_{-r}^r \left(\int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dy \right) dx$$

Notiamo che il calcolo dell'integrare iterato risulta abbastanza complicato.

• **Secondo modo**

Utilizziamo le coordinate polari, cioè consideriamo l'applicazione $\psi : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\rho, \vartheta \rightarrow (\rho \cos \vartheta, \rho \sin \vartheta)$

$$\begin{cases} x = x(\rho, \vartheta) = \rho \cos \vartheta \\ y = y(\rho, \vartheta) = \rho \sin \vartheta \end{cases}$$

È facile verificare che $\psi : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$ è bigettiva e se $D^* := (0, r) \times (0, 2\pi)$

$$\psi(D^*) = \overset{\circ}{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq r\}$$

Poichè

$$area(D) = area\left(\overset{\circ}{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq r\}\right)$$

e

$$area(\partial D) = area(\{(x, 0) : 0 \leq x \leq r\}) = 0$$

per la proprietà degli integrali doppi sugli insiemi di misura nulla, segue che

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dx dy &= \iint_{\overset{\circ}{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq r\}} \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dx dy \\ &= \iint_{\overset{\circ}{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq r\}} \sqrt{r^2 - \rho^2} d\rho d\vartheta \end{aligned}$$

Idea: Vogliamo cambiare le variabili di integrazione nell'integrale doppio da $(x, y) \rightarrow (\rho, \vartheta)$.

Il problema è capire come si trasforma l'elemento infinitesimo di area $dA = dx dy$ in funzione dell'elemento infinitesimo $dA^* = d\rho d\vartheta$

Più precisamente capire quale sia il coefficiente di trasformazione $k = k(\rho, \vartheta)$ per cui $dA = dx dy = k(\rho, \vartheta) d\rho d\vartheta = k(\rho, \vartheta) dA^*$

Utilizziamo un ragionamento intuitivo: il rettangolo $Q^* = [\rho, \rho + d\rho] \times [\vartheta, \vartheta + d\vartheta]$, sarà trasportato nella regione piana $Q = \psi(Q^*)$ delimitata da:

- L_1 = il segmento che congiunge i punti $\psi(\rho, \vartheta)$ e $\psi(\rho + d\rho, \vartheta)$
- L_2 = l'arco di cerchio che congiunge i punti $\psi(\rho + d\rho, \vartheta)$ e $\psi(\rho + d\rho, \vartheta + d\vartheta)$
- L_3 = il segmento che congiunge i punti $\psi(\rho + d\rho, \vartheta + d\vartheta)$ e $\psi(\rho, \vartheta + d\vartheta)$

– L_4 = l'arco di cerchio che congiunge i punti $\psi(\rho, \vartheta + d\vartheta)$ e $\psi(\rho, \vartheta)$

Se $d\rho$ e $d\vartheta$ sono "molto piccoli", $dA = dx dy \cong \text{area}(Q) \cong \text{lunghezza}(L_4)d\rho = \rho d\vartheta d\rho = \rho dA^*$ con $A = [x, x + dx] \times [y, y + dy]$.

Si può provare rigorosamente che $dA = \rho dA^*$.

Ritornando al calcolo dell'integrale doppio

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dx dy &= \iint_{\dot{D} \setminus \{(x,0): 0 \leq x \leq r\}} \sqrt{r^2 - \rho^2} dA = \\ &= \iint_{(0,r) \times (0,2\pi)} \sqrt{r^2 - \rho^2} \rho dA^* = \iint_{(0,r) \times (0,2\pi)} \sqrt{r^2 - \rho^2} \rho d\rho d\vartheta = \\ &= \int_0^r \left(\int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 - \rho^2} \rho d\vartheta \right) d\rho = 2\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - \rho^2} \rho d\rho \end{aligned}$$

Esercizio 21 $\int_0^r \sqrt{r^2 - \rho^2} \rho d\rho = \frac{r^3}{3}$

In conclusione

$$\text{volume}(S) = \iint_D \sqrt{r^2 - (x^2 + y^2)} dx dy = \frac{2}{3} \pi r^3$$

2.5.2 Caso generale

Siano $D, D^* \subseteq \mathbb{R}^2$ aperti limitati e misurabili e sia

$$\psi : D^* \rightarrow D, \psi(u, v) = (\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)) = (x(u, v), y(u, v))$$

$$\psi_1, \psi_2 : D^* \rightarrow \mathbb{R}$$

Definizione 2.5.1 La mappa ψ si dice un cambiamento di variabili se

- ψ è bigettiva
- $\psi_i \in C^1(D^*)$, $\psi_i, \frac{\partial \psi_i}{\partial u}, \frac{\partial \psi_i}{\partial v} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$ limitate ($i=1,2$)
- $\det D\psi(u, v) \neq 0$, $\forall (u, v) \in D^*$, dove

$$D\psi(u, v) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \psi_1}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \psi_2}{\partial v}(u, v) \end{bmatrix} \quad (\text{Matrice Jacobiana})$$

Denotiamo $dA^* = du dv$ e $dA = dx dy$

Problema: Legame tra dA e dA^* ?

Si può provare che $dA = |[\det D\psi(u, v)]| dA^*$.

Più precisamente vale:

2.5.3 Teorema: Cambiamento di variabili negli integrali doppi

Teorema 2.5.1 (Cambiamento di variabili negli integrali doppi) [BDPG,14.19]
 Siano $D, D^* \subseteq \mathbb{R}^2$ aperti limitati e misurabili, sia $\psi : D^* \rightarrow D$ un cambiamento di variabili e sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua e limitata.
 Allora vale la formula

$$(FCV)_2 \quad \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D^*} f(\psi(u, v)) |\det D\psi(u, v)| \, du \, dv$$

Esercizio 22 (i) Calcolare l'area dell'insieme

$$D := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$$

dove $a > 0, b > 0$ fissati.

Soluzione:

L'insieme D rappresenta un'elisse con semiassi di lunghezza a e b . L'insieme D è limitato e misurabile. Infatti:

Esercizio 23 D è un dominio semplice rispetto all'asse y . Quindi D è misurabile.

Per definizione

$$\text{area}(D) = |D|_2 = \iint_D 1 \, dx \, dy$$

Utilizzando il cambiamento di variabili rispetto a coordinate ellittiche, il calcolo dell'integrale doppio diventa abbastanza semplice. Infatti, consideriamo il cambiamento

$$\begin{cases} x(\rho, \vartheta) = \psi_1(\rho, \vartheta) := a\rho \cos \vartheta \\ y(\rho, \vartheta) = \psi_2(\rho, \vartheta) := b\rho \sin \vartheta \end{cases} \quad \rho \geq 0, \vartheta \in [0, 2\pi]$$

e sia $D^* := (0, 1) \times (0, 2\pi)$, $\psi : D^* \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\psi(\rho, \vartheta) := (\psi_1(\rho, \vartheta), \psi_2(\rho, \vartheta))$

Esercizio 24 Verificare che la mappa $\psi : D^* \rightarrow \mathring{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq a\}$ è un cambiamento di variabili, in accordo con la definizione 5.3.2 prima introdotta. Inoltre $\det D\psi(\rho, \vartheta) = ab\rho$.

Possiamo applicare $(FCV)_2$ con $f \equiv 1$ su D , ed otteniamo

$$\begin{aligned} \text{area}(D) &= \iint_D 1 \, dx \, dy = \iint_{\mathring{D} \setminus \{(x, 0) : 0 \leq x \leq a\}} 1 \, dx \, dy = \\ &= \iint_{D^*} 1 \cdot |\det D\psi(\rho, \vartheta)| \, d\rho \, d\vartheta = 2\pi ab \int_0^1 \rho \, d\rho = \pi ab \end{aligned}$$

(ii) Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \frac{y^2}{x} dx dy$$

Dove $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y \leq 2x^2, y^2 \leq x \leq 3y^2\}$

Soluzione:

L'insieme D può essere visto come $D = D_1 \cap D_2$, dove

- $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y \leq 2x^2\}$
- $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 \leq x \leq 3y^2\}$

Incominciamo a studiare la geometria di D . È chiaro che $(0, 0) \in D$. Supponiamo che $(x, y) \in D \setminus \{(0, 0)\}$ allora per definizione di D , $(x, y) \in (D_1 \setminus \{(0, 0)\}) \cap (D_2 \setminus \{(0, 0)\})$. È chiaro che, per come sono definiti D_1 e D_2 , necessariamente

1. $x > 0$ e $y > 0$
2. $x^2 \leq y \leq 2x^2$
3. $y^2 \leq x \leq 3y^2$

Dividendo la disuguaglianza (2) per x^2 e la (3) per y^2 , grazie alla condizione (1), si intuisce che un possibile cambiamento di variabili $x = \psi_1(u, v)$, $y = \psi_2(u, v)$ potrebbe essere quello per cui

$$\begin{cases} u = \frac{y}{x^2} \\ v = \frac{x}{y^2} \end{cases} \quad \text{con } 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 3$$

Esercizio 25 Risolvere il sistema precedente rispetto ad x e y .

Otteniamo

$$\begin{cases} x = x(u, v) = \psi_1(u, v) = \frac{1}{u^{\frac{2}{3}} v^{\frac{1}{3}}} \\ y = y(u, v) = \psi_2(u, v) = \frac{1}{u^{\frac{1}{3}} v^{\frac{2}{3}}} \end{cases}$$

Sia $D^* := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 < u < 2, 1 < v < 3\}$ è chiaro per costruzione che:

- $\psi : D^* \rightarrow \overset{\circ}{D}$ è bigettiva
- D^* e $\overset{\circ}{D}$ sono limitati e misurabili (da 2.2.1)
- $\psi_i \in C^1(D^*)$, $i = 1, 2$

– **Esercizio 26**

$$D\psi(u, v) = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}u^{-\frac{5}{3}}v^{-\frac{1}{3}} & -\frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}v^{-\frac{4}{3}} \\ -\frac{1}{3}u^{-\frac{4}{3}}v^{-\frac{2}{3}} & -\frac{2}{3}u^{-\frac{1}{3}}v^{-\frac{5}{3}} \end{bmatrix}$$

$\det D\psi(u, v) = \frac{1}{3}u^{-2}v^{-2}$ se $(u, v) \in D^*$ Possiamo applicare l'osservazione (??) e $(FCV)_2$, ottenendo che

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y^2}{x} dx dy &= \iint_{\tilde{D}} \frac{y^2}{x} dx dy = \\ &= \iint_{D^*} \frac{1}{v} \frac{1}{3} \frac{1}{u^2} \frac{1}{v^2} du dv = \frac{1}{3} \iint_{D^*} \frac{du dv}{u^2 v^3} \end{aligned}$$

L'ultimo integrale doppio risulta essere un integrale doppio su un rettangolo, applicando la formula di riduzione sui rettangoli otteniamo:

$$\begin{aligned} \iint_{D^*} \frac{du dv}{u^2 v^3} &= \int_1^2 u^{-2} du \cdot \int_1^3 v^{-3} dv = \\ &= -\frac{1}{u} \Big|_1^2 \cdot -2v^{-2} \Big|_1^3 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

Pertanto

$$\iint_D \frac{y^2}{x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{27}$$

2.6 Lez - 13, Integrali tripli, [BDPG,14.5]

2.6.1 Integrale triplo su un parallelepipedo

Sia $Q := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3] \subset \mathbb{R}^3$ un parallelepipedo. Siano

- $\mathcal{D}_1 := \{a_1 = x_0 \leq \dots \leq x_i \leq \dots x_{n_1} = b_1\}$ sudd. di $[a_1, b_1]$
- $\mathcal{D}_2 := \{a_2 = y_0 \leq \dots \leq y_j \leq \dots y_{n_2} = b_2\}$ sudd. di $[a_2, b_2]$
- $\mathcal{D}_3 := \{a_3 = z_0 \leq \dots \leq z_k \leq \dots z_{n_3} = b_3\}$ sudd. di $[a_3, b_3]$

Definizione 2.6.1 Si chiama suddivisione \mathcal{D} del parallelepipedo $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$ un insieme del tipo

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \times \mathcal{D}_3 = \{(x_i, y_j, z_k) : i = 0, \dots, n_1; j = 0, \dots, n_2; k = 0, \dots, n_3\}$$

se $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \mathcal{D}_3$ sono definiti come sopra.

Data una suddivisione \mathcal{D} di Q , Q risulta suddiviso in $n_1 \times n_2 \times n_3$ parallelepipedi

$$Q_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k]$$

con $i = 1, \dots, n_1, j = 1, \dots, n_2, k = 1, \dots, n_3$, il cui volume è

$$\text{vol}(Q_{ijk}) = |Q_{ijk}|_3 := (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})(z_k - z_{k-1})$$

Sia $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e definiamo

$$m_{ijk} = \inf_{Q_{ijk}} f \in \mathbb{R} \text{ e } M_{ijk} = \sup_{Q_{ijk}} f \in \mathbb{R}$$

con $i = 1, \dots, n_1, j = 1, \dots, n_2, k = 1, \dots, n_3$ Definiamo

- $S(f, Q) = \sum_{ijk} M_{ijk} \cdot |Q_{ijk}|_3$ (somma superiore di f su Q)
- $s(f, Q) = \sum_{ijk} m_{ijk} \cdot |Q_{ijk}|_3$ (somma inferiore di f su Q)

Definizione 2.6.2 Si dice che f è integrabile su Q e si scrive $f \in \mathcal{R}(Q)$ se

$$L = \sup_{\mathcal{D}} s(f, \mathcal{D}) = \inf_{\mathcal{D}} S(f, \mathcal{D}) \in \mathbb{R}$$

Il valore L prende nome di integrale triplo di f su Q e si denota con i simboli

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz, \iiint_Q f, \int_Q f, \int_Q f dx dy dz$$

Continuano a valere i risultati degli integrali doppi su rettangoli.

Proprietà

Teorema 2.6.1 (Esistenza dell'integrale) Sia $f \in C^0(Q)$ allora $f \in \mathcal{R}(Q)$

Teorema 2.6.2 (Proprietà dell'integrale) Siano $f, g \in \mathcal{R}(Q)$

(i) **Linearità** : $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(Q)$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_Q f + \beta \int_Q g$$

(ii) **Monotonia**: Se $g \leq f$ su Q , allora

$$\int_Q g \leq \int_Q f$$

(iii) **Valore assoluto**: $|f| \in \mathcal{R}(Q)$ e

$$\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f|$$

(iv) **Teorema della media interale**

$$\inf_Q f \leq \frac{1}{|Q|_3} \int_Q f \leq \sup_Q f$$

Se $f \in C^0(Q)$, allora esiste $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in Q$ t.c.

$$f(p_0) = \frac{1}{|Q|_3} \int_Q f$$

2.6.2 Integrale triplo su insiemi generali

Definizione 2.6.3 Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ limitato, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Allora f si dice integrabile su A , e si scrive $f \in \mathcal{R}(A)$ se la funzione $\tilde{f} : Q \rightarrow \mathbb{R}$ definita come

$$\tilde{f}(x, y, z) := \begin{cases} f(x, y, z) & \text{se } (x, y, z) \in A \\ 0 & \text{se } (x, y, z) \in Q \setminus A \end{cases}$$

è integrabile su Q , dove Q è un (qualunque) parallelepipedo contenente A .

Si pone:

$$\int_A f := \int_Q \tilde{f}$$

Definizione 2.6.4 Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^3$ limitato si dice misurabile (secondo Peano-Jordan) se la funzione $\tilde{f} : Q \rightarrow \mathbb{R}$, definita come

$$\tilde{f}(x, y, z) := \begin{cases} 1 & \text{se } (x, y, z) \in A \\ 0 & \text{se } (x, y, z) \in Q \setminus A \end{cases}$$

è integrabile su Q , per un opportuno parallelepipedo $Q \supseteq A$

$$|A|_3 := \iiint_A 1 \, dx \, dy \, dz$$

(misura 3-dimensionale o volume di A)

Continuano a valere

Teorema 2.6.3 (Caratterizzazione degli insiemi misurabili) Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ limitato. Allora

$$A \text{ è misurabile} \iff \partial A \text{ è misurabile e } |\partial A|_3 = 0$$

Teorema 2.6.4 (BDPG, 14.11) Sia $E \subseteq \mathbb{R}^3$ limitato e misurabile, sia $g \in \mathcal{R}(E)$. Allora $G_g := \{(x, y, g(x, y)) : (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^3$ è misurabile e $|G_g|_3 = 0$

Teorema 2.6.5 (Esistenza integrale tripli su insiemi misurabili) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che:

- A sia limitato e misurabile
- f sia limitato e $f \in C^0(A)$

Allora $f \in \mathcal{R}(A)$

2.6.3 Formule di riduzione per integrali tripli

Teorema 2.6.6 (Formule di riduzione su parallelepipedi) [BDPG, 14.26]
Siano $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$, $f \in C^0(Q)$

(i) La funzione

$$[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \ni (x, y) \rightarrow \int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) \, dz$$

è integrabile su $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ e

$$(1) \iiint_Q f = \iint_{[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) \, dz \right)$$

(ii) La funzione

$$[a_1, b_1] \ni x \rightarrow \iint_{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]} f(x, y, z) \, dy \, dz$$

è integrabile su $[a_1, b_1]$ e

$$(2) \iiint_Q f = \int_{a_1}^{b_1} \left(\iint_{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]} f(x, y, z) \, dy \, dz \right)$$

La

(1) si chiama formula di riduzione per fili

(2) si chiama formula di riduzione per strati

- L'insieme $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]\}$ è uno strato.
- L'insieme $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [a_3, b_3]\}$ è un filo.

Un'immediata conseguenza della formula di riduzione sui parallelepipedi e di quella per i rettangoli 2.1.6 segue il seguente risultato:

Corollario 2.6.1 Sia $f \in C^0(Q)$ allora

$$\iiint_Q f = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx$$

Definizione 2.6.5 Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^3$ si chiama semplice (o normale) rispetto all'asse z se

$$(*) A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

dove $g_1, g_2 : E \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g_1, g_2 \in C^0(E)$

Osservazione 2.6.7 Definizioni analoghe si possono dare per insiemi semplici rispetto agli assi x ed y .

Teorema 2.6.8 (Formule di riduzione per integrali tripli rispetto a domini semplici) [BDPG, 14.28] Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un insieme semplice rispetto all'asse z di tipo $(*)$ e sia $f \in C^0(A)$. Allora

$$(3) \iiint_A f = \iint_E \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

Osservazione 2.6.9 La formula (3) è una formula di riduzione per fili che generalizza la formula (1) di quella sui parallelepipedi.

La formula (2) di riduzione per strati su parallelepipedi può essere estesa ad insiemi più generali. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ limitato e misurabile e supponiamo che

$$(**) A = A \cap (\mathbb{R} \times [a, b] \times \mathbb{R})$$

e sia tale che, lo strato di A

$$(***) A_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in A\} \text{ sia misurabile (come insieme del piano } x, z)$$

Teorema 2.6.10 (Formula di riduzione per strati) [BDPG, 14.28] Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ verificante $(**)$ e $(***)$ e sia $f \in C^0(A)$ limitata. Allora

$$(4) \iiint_A f = \int_a^b \left(\iint_{A_y} f(x, y, z) dx dz \right) dy$$

Applicazione della formula di riduzione per strati: volume di un solido di rotazione

Sia $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [c, d], x^2 + y^2 \leq f(z)^2\}$ dovve $f \in C^0([c, d])$, $f \geq 0$.
A può essere visto come il solido di rotazione ottenuto ruotando l'insieme

$$F := \{(y, z) : z \in [c, d], 0 \leq y \leq f(z)\}$$

attorno all'asse z.

Fissato $z \in [c, d]$ lo strato di A

$$A_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq f(z)^2\}$$

rappresenta un cerchio (nel piano x,y) con centro (0,0) e raggio $f(z)$.

Quindi

$$area(A_z) = \pi f(z)^2 \forall z \in [c, d]$$

Pertanto applicando la (4), otteniamo

$$\begin{aligned} |A|_3 &= \iiint_A 1 \, dx \, dy \, dz = \int_c^d \left(\iint_{A_z} 1 \, dx \, dy \, dz \right) = \\ &= \int_c^d area(A_z) \, dz = \pi \int_c^d f(z)^2 \, dz \end{aligned}$$

(formula del volume di un solido di rotazione)

2.6.4 Cambiamento di variabili negli integrali tripli

Siano $D^*, D \subseteq \mathbb{R}^3$ aperti limitati e misurabili, e sia $\Psi : D^* \rightarrow \mathcal{D}$, $\Psi = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3) = (x, y, z)$, $\Psi_i = \Psi_i(u, v, w) : D^* \rightarrow \mathbb{R}$ ($i=1,2,3$).

Definizione 2.6.6 La mappa Ψ si dice cambiamento di variabile (in \mathbb{R}^3) Se

(i) Ψ è bigettiva

(ii) $\Psi_i \in C^1(D^*)$,

$$\Psi_i, \frac{\partial \Psi_i}{\partial u}, \frac{\partial \Psi_i}{\partial v}, \frac{\partial \Psi_i}{\partial w} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$$

limitate ($i = 1,2,3$)

(iii) $\det D\Psi(u, v, w) \neq 0$, dove

$$D\Psi(u, v, w) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \Psi_1}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial w} \\ \frac{\partial \Psi_2}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial w} \\ \frac{\partial \Psi_3}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial w} \end{bmatrix}$$

se $(u, v, w) \in D^*$

Teorema 2.6.11 (Cambiamento di variabili negli integrali tripli) *Siano $D^*, D \subset \mathbb{R}^3$ aperti limitati e misurabili, sia $\Psi : D^* \rightarrow D$ un cambiamento di variabili e sia $f \in C^0(D)$ e limitata. Allora*

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{D^*} f(\Psi(u, v, w)) |\det D\Psi(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

Definizione 2.6.7 *Coordinate sferiche:*

$$\Psi \equiv \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \vartheta \\ y = r \sin \varphi \sin \vartheta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$$0 \leq \vartheta \leq 2\pi, r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, |\det D\Psi(r, \vartheta, \varphi)| = r^2 \sin \varphi$$

Chapter 3

Curve ed integrali curvilinei, [BDPG, 12]

3.1 Lez - 14, Curve in \mathbb{R}^n

Definizione 3.1.1 (i) Si chiama curva una mappa $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$ con I intervallo di \mathbb{R}

(ii) Se $I = [a, b]$, i punti $\gamma(a)$, $\gamma(b)$ di \mathbb{R}^n si chiamano estremi della curva

(iii) Si chiama sostegno (o supporto) della curva γ , l'insieme $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^n$. Si chiama equazione parametrica di γ l'equazione $x = (x_1, \dots, x_n) = \gamma(t)$ $t \in I$

(iv) La curva γ si dice chiusa se $I = [a, b]$ e $\gamma(a) = \gamma(b)$

(v) La curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice semplice se γ è iniettiva, o se γ è chiusa e $I = [a, b]$, allora $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è iniettiva.

I casi più significativi di curve, interessanti per le applicazioni, sono in $n = 2, 3$.

Esempio 21 (i) Sia $f \in C^0([a, b])$ e consideriamo le curve $\gamma, \gamma^* : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (t, f(t))$ e $\gamma^*(t) = (f(t), t)$, $t \in [a, b]$.
 γ, γ^* sono dette curve piane cartesiane.

– Gli estremi della curva γ sono i punti: $(a, f(a)), (b, f(b))$

– Gli estremi della curva γ^* sono i punti: $(f(a), a), (f(b), b)$

Il supporto della curva γ, γ^* coincide rispettivamente, con il grafico della funzione f , G_f , vista, nel primo caso, come funzione di y rispetto a x , cioè

$$G_f := \{(t, f(t)) : t \in [a, b]\}$$

e, nel secondo caso, come funzione di x rispetto a y , cioè

$$G_f := \{(f(t), t) : t \in [a, b]\}$$

Osserviamo che le due curve sono semplici e non chiuse.

Le eq. parametriche sono, rispettivamente,

$$\begin{aligned} - (x, y) = \gamma(t) = (t, f(t)) \quad t \in [a, b] &\iff \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b] \text{ e} \\ - (x, y) = \gamma(t) = (f(t), t) \quad t \in [a, b] &\iff \begin{cases} x = f(t) \\ y = t \end{cases}, \quad t \in [a, b] \end{aligned}$$

- (ii) Sia $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva definita da $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$. È facile verificare che γ è una curva piana chiusa ($\gamma(0) = (1, 0) = \gamma(2\pi)$) e semplice.

Il sostegno di $\gamma, \gamma([0, 2\pi])$ è dato da

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

L'equazione parametrica di γ è data da

$$(x, y) = \gamma(t) = (\cos(t), \sin(t)), t \in [0, 2\pi] \iff \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

- (iii) Sia $\gamma : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva definita come nell'esempio (ii), cambiando il dominio.

La curva è ancora una curva piana chiusa ($\gamma(0) = (1, 0) = \gamma(4\pi)$) ma non è semplice. Infatti la funzione $\gamma : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ non è iniettiva.

La curva ha come sostegno C dell'esempio (ii). Da un punto di vista intuitivo, il sostegno di γ è percorso due volte.

N.B.: 3.1.1 Due curve possono avere lo stesso sostegno ma essere differenti, come gli esempi (ii) e (iii)

- (iv) Sia $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la curva definita da $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, $t \in \mathbb{R}$. γ è una curva semplice, non chiusa ed il suo sostegno rappresenta un'elica infinita contenuta nel cilindro $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$.

L'eq. parametrica è data da

$$(x, y, z) = \gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), t) \quad t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3.1.1 Orientazione di una curva semplice

Sia data una curva semplice $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Allora essa induce un'orientazione sul suo sostegno $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Più precisamente

Definizione 3.1.2 Data $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva semplice, si dice che il punto $x_1 = \gamma(t_1)$ precede il punto $x_2 = \gamma(t_2)$ se $t_1 < t_2$. L'orientazione della curva viene detta anche verso della curva.

Esempio 22 Le curve degli esempi (i), (ii), (iv), essendo semplici, sono tutte orientabili, mentre la curva (iii) non essendo semplice, non è orientabile.

3.1.2 Vettore velocità di una curva

Sia $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. Se le componenti $\gamma_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, n$) sono derivabili in un fissato punto $t_0 \in I$, il vettore

$$\gamma'(t_0) = (\gamma'_1(t_0), \dots, \gamma'_n(t_0))$$

è detto vettore velocità di γ in t_0 .

Essendo la funzione γ_i derivabile, sappiamo che

$$(*) \gamma_i(t) = \gamma_i(t_0) + \gamma'_i(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0) \quad (t \rightarrow t_0)$$

per $i = 1, \dots, n$.

Una forma più compatta per scrivere (*) è

$$\gamma(t) = \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)(t - t_0) + o(t - t_0) \quad (t \rightarrow t_0)$$

Osservazione 3.1.2 È immediato verificare che $\gamma'(t_0) = D\gamma(t_0)^T$, dove

$$D\gamma(t_0) = \begin{bmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \vdots \\ \gamma'_n(t_0) \end{bmatrix} \quad \text{matrice Jacobiana } n \times 1$$

Definizione 3.1.3 Se $\gamma'(t_0) \neq \underline{0}_{\mathbb{R}^n}$, si chiama retta tangente alla curva γ nel punto $x_0 = \gamma(t_0)$ la retta di equazione parametrica

$$x = \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)(t - t_0) = \gamma_1(t_0) + \gamma'_1(t_0)(t - t_0) + \dots + \gamma_n(t_0) + \gamma'_n(t_0)(t - t_0)$$

se $t \in I$

Osservazione 3.1.3 (i) Sia $n = 2$, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, $t \in I$, $p_0 = \gamma(t_0) = (x_0, y_0)$, $\gamma'(t_0) = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$. Supponiamo per esempio, $v_2 \neq 0$.

L'eq. parametrica della retta tangente diventa

$$\begin{cases} x = v_1(t - t_0) + x_0 \\ y = v_2(t - t_0) + y_0 \end{cases} \iff \begin{cases} t - t_0 = \frac{y - y_0}{v_2} \\ x = v_1(t - t_0) + x_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = \frac{v_1}{v_2}(y - y_0) + x_0 \iff$$

$$\iff r : v_2(x - x_0) - v_1(y - y_0) = 0$$

(eq. di una retta nel piano x, y passante per (x_0, y_0) di direzione v)

N.B.: 3.1.4 Si noti che il vettore $(v_2, -v_1)$ è ortogonale al vettore (v_1, v_2) , in quanto $(v_1, v_2) \cdot (v_2, -v_1) = 0$, e la retta r può essere riscritta come:

$$r : (x - x_0, y - y_0) \cdot (v_2, -v_1)$$

(ii) Se $\gamma'(t_0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^n}$, la retta tangente può non esistere

Esempio 23 $n = 2$, $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, definita come $\gamma(t) = (x_0, y_0) \forall t \in \mathbb{R}$. Il sostegno di γ è il punto (x_0, y_0) : non è una curva regolare.

Definizione 3.1.4 Una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$

(a) si dice di classe C^m se $\gamma_i : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono di classe $C^m \forall i = 1, \dots, n$

(b) si dice regolare se γ è di classe C^1 e $\gamma'(t) \neq \underline{0}_{\mathbb{R}^n} \forall t \in I$

Definizione 3.1.5 Data $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare, si chiama versore (o direzione) tangente a γ il campo vettore

$$\mathbf{T}_\gamma(t) := \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} t \in I$$

Definizione 3.1.6 Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice C^1 a tratti (o regolare a tratti) se esiste una suddivisione $a = t_0 < \dots < t_n = b$ di $[a, b]$ t.c.

$$\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]} : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

è di classe C^1 (rispettivamente regolare).

In tal caso γ si dice anche unione delle N curve $\gamma_i := \gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ e si scrive

$$\gamma := \bigcup_{i=1}^N \gamma_i$$

Esempio 24 Sia $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva $\gamma(t) = (t, |t|)$, $t \in [-1, 1]$.

Allora è facile verificare che γ una curva regolare a tratti. Infatti se $-1 = t_0 < 0 = t_1 < t_2 = 1$, è facile verificare che

$$\gamma_i \equiv \gamma|_{[t_{i-1}, t_i]} : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

è regolare.

Poichè

- $\gamma_1 := (t, -t)$, $t \in [t_0, t_1]$
- $\gamma_2 := (t, t)$, $t \in [t_1, t_2]$

Si noti che il sostegno di γ è il grafico della funzione $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x) = |x|$

3.1.3 Cambiamento di parametro di una curva

Definizione 3.1.7 Due curve $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\tilde{\gamma} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si dicono equivalenti se esiste una funzione bigettiva $\varphi : \tilde{I} \rightarrow I$ t.c.

$$\varphi \in C^1(\tilde{I}); \varphi'(\tau) \neq 0 \forall \tau \in \tilde{I}; \tilde{\gamma}(\tau) = \gamma(\varphi(\tau)) \tau \in \tilde{I};$$

In tal caso $\tau \rightarrow t = \varphi(\tau) \in I$ si dice cambiamento di parametrizzazione.

Se $\varphi'(\tau) > 0$, $\forall \tau \in \tilde{I}$, allora si dice che $\gamma, \tilde{\gamma}$ hanno lo stesso verso; Se $\varphi'(\tau) < 0$, $\forall \tau \in \tilde{I}$, allora si dice che $\gamma, \tilde{\gamma}$ hanno verso opposto

Esercizio 27 Siano

- $\gamma(t) := (\cos(t), \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$
-
- $\tilde{\gamma}(\tau) := (\cos(2\tau), \sin(2\tau))$, $\tau \in [0, \pi]$
- $\gamma^*(s) := (\cos(s), -\sin(s))$, $s \in [0, 2\pi]$

Provare che:

1. $\gamma, \tilde{\gamma}, \gamma^*$ sono equivalenti
2. $\gamma, \tilde{\gamma}$ hanno lo stesso verso, mentre γ, γ^* hanno verso opposto

Soluzione:(suggerimento)

1. Per provare che $\gamma, \tilde{\gamma}$ sono eq. basta considerare il cambiamento di parametrizzazione $\varphi : [0, \pi] \rightarrow [0, 2\pi]$, $\varphi(\tau) := 2\tau$ per provare che γ, γ^* sono eq. basta considerare il cambiamento di parametrizzazione $\varphi : [0, 2\pi] \rightarrow [0, 2\pi]$, $\varphi(s) = 2\pi - s$

Osservazione 3.1.5 Si può che: date due curve equivalenti, allora

1. esse hanno lo stesso sostegno
2. se una delle due fosse semplice, anche l'altra sarebbe semplice

Chapter 4

Esercitazioni

4.1 Lezione 1 - 09/03/2022

Esercizio 4.1.1 Determinare e disegnare nel piano xy il dominio delle seguenti funzioni, $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dove A : dominio che dobbiamo determinare.

$$f(x, y) = \log(4(x^2 + y^2) - 1)$$

Soluzione:

$$4(x^2 + y^2) - 1 > 0 \iff x^2 + y^2 > \frac{1}{4}$$

Studiamo quindi: $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ la circonferenza di centro $c = (0, 0)$ e raggio $r = \frac{1}{2}$,

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > \frac{1}{4}\} = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{B((0, 0), \frac{1}{2})}$$

dove:

- $\overline{B((0, 0), \frac{1}{2})} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}\}$
- $B((0, 0), \frac{1}{2}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < \frac{1}{2}\}$

Insiemi aperti e chiusi

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$, A è chiuso $\iff A^c$ è aperto.

Definiamo $\bar{A} = A$, $xy \geq 0 \iff \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x \leq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ Disegnando gli assi:

$A^c = \mathbb{R}^2 \setminus A$ è aperto. Fisso ora $(x_0, y_0) \in A^c$, $r = d(\partial A, (x_0, y_0)) = \min |x_0|, |y_0|$.

La palla $B((x_0, y_0), \frac{r}{2}) \subset A^c \Rightarrow A^c$ è aperto $\Rightarrow A$ è chiuso.

Esercizio 4.1.2 $f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^4}$, $y^2 \geq x^4$.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 \geq x^4\}$$

Proviamo a scrivere $y^2 - x^4$ come

$$y^2 - x^4 = (y - x^2)(y + x^2) \geq 0$$

Due casi:

- $y \geq x^2$
- $y \geq -x^2$

(Dal grafico otteniamo)

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2 \vee y \leq -x^2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq -x^2\}$$

Esercizio 4.1.3 Disegnare l'insieme di livello delle seguenti funzioni

$$C_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = t\}$$

con $t \in \mathbb{R}$.

$$f(x, y) = x^2y, \text{ fissiamo } t \in \mathbb{R}, t = x^2y$$

$$1. t = 0, x^2y = 0 \Rightarrow y = 0 \vee x = 0$$

$$2. t > 0, t = x^2y \iff y = \frac{t}{x^2}$$

- $t = 1, y = \frac{1}{x^2}$
- $t = 2, y = \frac{2}{x^2}$

$$3. t < 0, t = x^2y \iff y = \frac{t}{x^2}$$

- $t = -1, y = -\frac{1}{x^2}$
- $t = -2, y = -\frac{2}{x^2}$

Esercizio 4.1.4 $f(x, y) = ye^{-x}, t \in \mathbb{R}, t = ye^{-x} \iff e^x t = y$

- $t = 0 \Rightarrow y = 0$
- $t = 1 \Rightarrow y = e^{-x}$
- $t = 2 \Rightarrow y = 2e^{-x}$
- $t = -1 \Rightarrow y = -e^{-x}$
- $t = -2 \Rightarrow y = -2e^{-x}$

Esercizio 4.1.5

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}} = ?$$

eleviamo x e y al numeratore per $\frac{3}{3}$, otteniamo:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(\sqrt[3]{x})^3 - (\sqrt[3]{y})^3}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}}$$

Ricordiamo ora la differenza tra cubi $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$, otteniamo:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}) ((\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y} + (\sqrt[3]{y})^2)}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y}} &= \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y} + (\sqrt[3]{y})^2 = 0 \end{aligned}$$

Esercizio 4.1.6

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = ?$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = l \iff$ per ogni restrizione a un sottoinsieme B ,
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f|_B(x, y) = l$

- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = mx\}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}|_B = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 mx}{x^4 + m^2 x^2} =$

$$= \frac{x^3 m}{x^2(x^2 + m^2)} = x \left(\frac{m}{x^2 + m^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{m}{x^2 + m^2} \right) = 0$$

- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = mx^2\}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}|_B =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^4}{x^4 + m^2 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2}$$

Proviamo due valori di m :

- $m = 1, \frac{1}{2}$
- $m = 2, \frac{2}{5}$

Ho trovato due restrizioni $\{y = x^2\}$ e $\{y = 2x^2\}$ dove il limite assume due valori distinti. Allora per l'unicità del limite, il limite non esiste.

Esercizio 4.1.7

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

Coordinate polari

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \vartheta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

- $x = \rho \cos \vartheta$
- $y = \rho \sin \vartheta$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\rho^2 \cos^2 \vartheta \cdot \rho \sin \vartheta}{\rho^2 \cos^2 \vartheta + \rho^2 \sin^2 \vartheta} = \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\rho^3 \cos^2 \vartheta \cdot \sin \vartheta}{\rho^2 (\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta)} \end{aligned}$$

Sappiamo che $\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$, quindi il limite rimane:

$$\lim \rho \cos^2 \vartheta \cdot \sin \vartheta$$

$$0 \leq |\rho \cos^2 \vartheta \cdot \sin \vartheta| < \rho$$

Da cui se $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ allora anche $\rho \rightarrow 0$ e siccome $\begin{cases} \cos^2 \vartheta < 1 \\ \sin \vartheta < 1 \end{cases}$, grazie al **teorema del confronto** il limite vale 0.

Esercizio 4.1.8 Dire quali insiemi sono aperti/chiusi e quali limitati, inoltre determinare la frontiera.

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (xy)(y - 1) \geq 0\}$$

- $x \geq 0$
- $y \geq 0$
- $y - 1 \geq 0, y \geq 1$

Frontiera: $\partial H = \{y = 1\} \cup \{x = 0\} \cup \{y = 0\}$

4.2 Esercitazione 2 - 23/03/2022

Esercizio 4.2.1 (a)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^{xy^2} - 1) \log(1 + x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2) \sin(xy)}$$

Ricordiamo che:

- $\frac{\log(1+t)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$
- $\frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$
- $\frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$

Grazie a ciò il nostro limite diventa:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy^2} - 1}{xy^2} \cdot \frac{\log(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \cdot \frac{xy}{\sin(xy)} \cdot y$$

(i) Definiamo $t = x^2 + y^2 \rightarrow 0$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$,

$$\frac{\log(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{\log(1 + t)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$$

(ii) Definiamo $t = xy \rightarrow 0$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$,

$$\frac{xy}{\sin(xy)} = \frac{t}{\sin(t)} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$$

(iii) Definiamo $t = xy^2 \rightarrow 0$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$,

$$\frac{e^{xy^2} - 1}{xy^2} = \frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$$

$$= 1 \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$$

(c)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{\log(1 + x^2 + y^2)}$$

Ricordiamo che:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = \frac{1}{2}$$

Allora il limite diventa:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{(xy)^2} \cdot \frac{x^2 + y^2}{\log(1 + x^2 + y^2)} \cdot \frac{(xy)^2}{x^2 + y^2}$$

(i) $t = xy \rightarrow 0$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$\frac{1 - \cos(xy)}{(xy)^2} = \frac{1 - \cos(t)}{t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

(ii) Per (i) dell'esercizio (a) si ha:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} &= 1 \\ &= 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} = ? \end{aligned}$$

Passiamo alle coordinate polari: $\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases}$

$$0 \leq \frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\rho^4 \cdot \cos^2 \vartheta \cdot \sin^2 \vartheta}{\rho^2 (\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta)} \leq \rho^2$$

Per $\rho \rightarrow 0$ tutto $0 \rightarrow 0$ e $\rho^2 \rightarrow 0$, quindi anche il limite tende a zero per il teorema del confronto.

Consideriamo il caso in cui $x = 0$ o $y = 0$

- Vediamo $x = 0$,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(0)}{\log(1 + y^2)} = \left[\frac{0}{0} \right]_{F.I.N.D.} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 - \cos(0) \cdot \frac{y^2}{\log(1 + y^2)} \cdot \frac{1}{y^2} = 0$$

- Vediamo $y = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(0)}{\log(1 + x^2)} = \left[\frac{0}{0} \right]_{F.I.N.D.} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos(0) \cdot \frac{x^2}{\log(1 + x^2)} \cdot \frac{1}{x^2} = 0$$

(e)

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} \frac{xy(z-1)}{x^2 + y^2 + (z-1)^2}$$

- **Primo metodo**

$$\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \\ t = z - 1 \xrightarrow{z \rightarrow 1} t \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$0 \leq \left| \frac{\rho \cos \vartheta \cdot \rho \sin \vartheta \cdot t}{\rho^2 (\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta) + t^2} \right| \leq \left| \frac{\rho^2 \cdot t}{\rho^2 + t^2} \right| \leq 1 \cdot t$$

$$\left(\frac{\rho^2}{\rho^2 + t^2} \leq 1 \iff \rho^2 \leq \rho^2 + t^2 \iff t^2 \geq 0 \Rightarrow \text{sempre} \right)$$

Quindi per $t \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 0$ e $t \rightarrow 0$, quindi per il teorema del confronto il limite

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} \frac{xy(z-1)}{x^2 + y^2 + (z-1)^2} = 0$$

- **Secondo metodo:** $t = z - 1 \xrightarrow{z \rightarrow 1} 0$
 $\lim_{(x,y,t) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyt}{x^2+y^2+t^2}$

$$0 \leq \left| \frac{xyt}{x^2+y^2+t^2} \right| \leq? \frac{\left(\sqrt{x^2+y^2+t^2} \right)^3}{x^2+y^2+t^2} = \sqrt{x^2+y^2+t^2}$$

In particolare si ha $|x| \leq \sqrt{x^2+y^2+t^2} \Rightarrow x^2 \leq x^2+y^2+t^2 \iff y^2+t^2 \geq 0$, lo stesso vale per $|y| \leq \sqrt{x^2+y^2+t^2}$ e $|t| \leq \sqrt{x^2+y^2+t^2}$, quindi otteniamo:

$$0 \leq \left| \frac{xyt}{x^2+y^2+t^2} \right| \leq \sqrt{x^2+y^2+t^2}$$

Che tende a 0 per $(x,y,t) \rightarrow (0,0,0)$, quindi grazie al teorema del confronto il limite vale 0

Esercizio 4.2.2 Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x,y) = \begin{cases} g(x,y) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

a)

$$g(x,y) = \frac{x \sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \quad \forall (x,y) \neq (0,0)$$

La funzione f , che coincide con $g \quad \forall (x,y) \neq (0,0)$, è **continua** $\forall (x,y) \neq (0,0)$ perchè è **composizione** e **prodotto** di funzioni continue (Teorema). Dobbiamo quindi vedere il comportamento della funzione in $(0,0)$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$$

cioè

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \cdot \frac{x^2 y}{x^2 y}$$

per $x \neq 0$ e $y \neq 0$.

$$(i) \quad t = x^2 y \rightarrow 0 \text{ per } (x,y) \rightarrow (0,0), \quad \frac{\sin(t)}{t} \rightarrow 1$$

$$= 1 \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} = 1 \cdot 0 = 0$$

Verifichiamolo tramite le coordinate polari.

$$x = \rho \cos \vartheta$$

$$y = \rho \sin \vartheta$$

$$0 \leq \left| \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{\rho^4 \cdot \cos^3 \vartheta \sin \vartheta}{\rho^2 (\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta)} \right| \leq \rho^2$$

Quindi per $\rho \rightarrow 0$ anche il limite vale 0 grazie al teorema del confronto.
Abbiamo verificato che il limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$, quindi la funzione f è continua.

Controlliamo ora:

- $y = 0$ e $x \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2} = 0$
- $y \neq 0$ e $x = 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$

b)

$$g(x,y) = \frac{\sin(2xy)}{e^{x^2+y^2} - 1}$$

Dobbiamo studiarne il comportamento in $(0,0)$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2 \cdot \frac{\sin(2xy)}{2xy} \cdot \frac{xy}{x^2+y^2} \cdot \frac{x^2+y^2}{e^{x^2+y^2} - 1}$$

$$(i) \quad t = 2xy, \quad \frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1 \text{ per } (x,y) \rightarrow (0,0)$$

$$(ii) \quad t = x^2 + y^2 \rightarrow 0 \text{ per } (x,y) \rightarrow (0,0), \quad \frac{t}{e^t - 1} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$$

- Proviamo con le coordinate polari: $\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases}$

$$\Rightarrow \frac{\rho^2 \sin \vartheta \cos \vartheta}{\rho^2} \Rightarrow \sin \vartheta \cos \vartheta$$

Quindi non va bene, allora proviamo a prendere una restrizione del dominio.

- $y = mx$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 m}{x^2(m^2 + 1)} \rightarrow \frac{m}{m^2 + 1}$$

Otteniamo due risultati diversi, $((m = 1, \lim = \frac{1}{2}), (m = 2, \lim = \frac{2}{5}))$, quindi ho trovato due restrizioni dove il limite è diverso, perciò $\nexists \lim$.

Esercizio 4.2.3 Calcolare il gradiente delle seguenti funzioni:

$$1. \quad f(x,y) = \sin(xy), \quad \nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \right)$$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \cos(xy) \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial x} = \cos(xy) \cdot y$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \cos(xy) \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial y} = \cos(xy) \cdot x$

$$\nabla f(x,y) = (y \cos(xy), x \cos(xy)) = \cos(xy) \cdot (y, x).$$

Calcolare la derivata direzionale rispetto al vettore $v = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x,y) = \langle \nabla f(x,y), v \rangle = \frac{\cos(xy)}{\sqrt{3}} \left\langle (y, x), \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right) \right\rangle =$$

$$= \frac{\cos(xy)}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{y}{2} + \frac{3x}{2} \right) = \frac{\cos(xy)}{2\sqrt{3}}(3x - y)$$

Calcoliamo il piano tangente nei punti $(0, 0, f(0, 0))$ e $(1, 2, f(1, 2))$, ricordiamo la formula del piano:

$$z = f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0), (x, y) - (x_0, y_0) \rangle$$

Cerchiamo ora i valori:

- $f(x, y) = \sin(xy)$, $f(0, 0) = 0$
- $\nabla f(x, y) = \cos(xy)(y, x)$, $\nabla f(0, 0) = 1 \cdot (0, 0) = 0$

Quindi $z = 0 + 0 \Rightarrow$ il piano tangente è $z = 0$.

Chi è il normale?

$$n = (0, 0, 1), (x_0, y_0) = (1, 2)$$

- $f(x, y) = \sin(xy)$, $f(1, 2) = \sin(2)$
- $\nabla f(x, y) = \cos(xy)(y, x)$, $\nabla f(1, 2) = \cos(2) \cdot (2, 1)$

$$z = \sin(2) + \langle \cos(2) \cdot (2, 1), (x - 1, y - 2) \rangle = \sin(2) + \cos(2) \cdot (2x + y - 4)$$

4.3 Lezione 3 - 06/04/2022

Esercizio 4.3.1 (Es 2, Provetta) Siano $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

- $f(t, u, v) = (k(t + v), u^2 + v)$
 $f_1 = k(t + v)$
 $f_2 = u^2 + v$
- $g(x, y) = (\log(1 + x^2 + y^2), \sin(x - y), x - y)$
 $g_1 = \log(1 + x^2 + y^2)$
 $g_2 = \sin(x - y)$
 $g_3 = x - y$

(1) Calcolare $Df(t, u, v) \forall (t, u, v) \in \mathbb{R}^3$ e $Dg(x, y) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

(2) Calcolare la matrice Jacobiana di h in $(0, 0)$, $Dh(0, 0)$, dove $h = f \circ g$

(1) Iniziamo osservando che le funzioni $f_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$) sono C^∞ perchè sono polinomi e $g_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, 3$) sono C^∞ perchè composizione di funzioni C^∞ , $\Rightarrow f$ e g sono differenziabili, per definizione di jacobiana si ha

$$\begin{aligned} Df(t, u, v) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t}(t, u, v) & \frac{\partial f_1}{\partial u}(t, u, v) & \frac{\partial f_1}{\partial v}(t, u, v) \\ \frac{\partial f_2}{\partial t}(t, u, v) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(t, u, v) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(t, u, v) \\ \frac{\partial f_3}{\partial t}(t, u, v) & \frac{\partial f_3}{\partial u}(t, u, v) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(t, u, v) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \nabla f_1 \\ \nabla f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 & k \\ 0 & 2u & 1 \end{bmatrix} \\ Dg(x, y) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial g_3}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial g_3}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2x}{1+x^2+y^2} & \frac{2y}{1+x^2+y^2} \\ \cos(x-y) & -\cos(x-y) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2) $h = f \circ g = f(g(x, y)) = h(x, y)$, $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow Dh$ è 2×2 , Essendo f e g differenziabili, segue che la funzione composta $h = f \circ g$ è differenziabile e vale RDC, cioè $Dh(0, 0) = Df(g(0, 0)) \cdot Dg(0, 0)$, poichè $g(0, 0) = (0, 0, 0)$ e

$$Dg(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Df(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} k & 0 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det \begin{bmatrix} k & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = k \neq 0, \text{ se } k \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Dh(0,0) = \begin{bmatrix} k & 0 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & -k \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 4.3.2 (Es. 3, Provetta) Consideriamo la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \arctan(1 + x^3 + \sqrt{(2)}kxy + y^2 - x^2) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Determinare se esistono punti di massimo e/o minimo relativo o di sella.

$\arctan(t) \Rightarrow (\arctan(t))' = \frac{1}{1+t^2} > 0 \Rightarrow \arctan$ strettamente crescente Siccome \arctan è strettamente crescente i punti di min e max rel. e sella coincidono con i punti di max/min/sella della funzione:

$$g(x, y) = 1 + x^3 + \sqrt{(2)}kxy + y^2 - x^2$$

I punti critici di g sono quelli dove si annulla il gradiente $\nabla g(x, y) = (0, 0) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 + \sqrt{(2)}ky - 2x = 0 \\ \sqrt{(2)}kx + 2y = 0 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} 3x^2 + \sqrt{(2)}k\left(\frac{-kx}{\sqrt{(2)}}\right) - 2x = 0 \\ y = -\frac{kx}{\sqrt{(2)}} \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 - k^2x - 2x = 0 \\ y = -\frac{kx}{\sqrt{(2)}} \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x(3x - (k^2 + 2)) = 0 \\ y = -\frac{kx}{\sqrt{(2)}} \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = \frac{2+k^2}{3} \\ y = \frac{-k(2+k^2)}{3\sqrt{(2)}} \end{cases} \end{aligned}$$

$$p_1 = (0, 0)$$

$$\Rightarrow p_2 = \left(\frac{2+k^2}{3}, \frac{-k(2+k^2)}{3\sqrt{(2)}} \right) \text{ sono punti stazionari}$$

$$\bullet \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + \sqrt{(2)}ky - 2x$$

$$h_{11} = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) = 6x - 2$$

$$\bullet \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \sqrt{(2)}kx + 2y$$

$$h_{22} = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) = 2$$

- $h_{12} = h_{21} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y) = \sqrt{(2)}k = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}$ dal teorema di Schwartz

$$Hg(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} \\ h_{12} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x - 2 & \sqrt{(2)}k \\ \sqrt{(2)}k & 2 \end{bmatrix}$$

- Calcoliamo $Hg(p_1)$

$$Hg(p_1) = Hg(0, 0) = \begin{bmatrix} -2 & \sqrt{(2)}k \\ \sqrt{(2)}k & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Autovalori di } Hg(p_1), \det \begin{bmatrix} -2 - \lambda & \sqrt{(2)}k \\ \sqrt{(2)}k & 2 - \lambda \end{bmatrix} = -4 + \lambda^2 - 2k^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = 2k^2 + 4 \iff \lambda \pm \sqrt{4 + 2k^2}$$

$$- \lambda_1 = \sqrt{4 + 2k^2} > 0$$

$$- \lambda_2 = -\sqrt{4 + 2k^2} < 0$$

\Rightarrow la matrice $Hg(0, 0)$ non è definita dal corollario visto a lezione,

$\det H = -4 - 2k^2 < 0 \iff \det H < 0 \Rightarrow$ non definita

\Rightarrow per i teoremi visti a lezione $(0, 0)$ è un punto di sella.

- Calcoliamo $Hg(p_2)$

$$Hg(p_2) = Hg\left(\frac{2 + k^2}{3}, \frac{-k(2 + k^2)}{3\sqrt{(2)}}\right) = \begin{bmatrix} 2 + 2k^2 & \sqrt{(2)}k \\ \sqrt{(2)}k & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 2 + 2k^2 & \sqrt{(2)}k \\ \sqrt{(2)}k & 2 \end{bmatrix} = 4 + 4k^2 - 2k^2 = 4 + 2k^2 > 0$$

Siccome $h_{11} > 0$ e $\det Hg(p_2) > 0$ si ha dal corollario visto a lezione che $Hg(p_2)$ è definita positiva.

Quindi per il teorema visto a lezione p_2 è un punto di minimo relativo.

Esercizio 4.3.3 (Es 1, Provetta) Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(1 - \cos x)(\sin(ky))}{kx^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Dire se è continua in $(0, 0)$ Per definizione di continuità, f è continua in $(0, 0)$

$$\iff \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0.$$

Ricordiamo i limiti notevoli:

- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

Osserviamo che $f(x, 0) = 0 \forall x \neq 0$ e $f(0, y) = 0 \forall y \neq 0$ e

$$(*) f(x, y) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot x^2 \cdot \frac{\sin(ky)}{ky} \cdot \frac{ky}{kx^2 + y^4} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{ky}{kx^2 + y^4}$$

Notiamo che:

$$0 \leq \left| \frac{ky}{kx^2 + y^4} \right| \leq \left| \frac{ky}{kx^2} \right| \leq |y|$$

Quindi per $y \rightarrow 0$ e grazie al TDC $\frac{ky}{kx^2 + y^4} \rightarrow 0$, siccome tutti e tre i limiti in (*) esistono e sono finiti si ha:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0 = 0 \Rightarrow f \text{ è continua in } (0,0)$$

2. Dire se $\exists \nabla f(0,0)$

$$\nabla f(0,0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0), \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \right)$$

- $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0-0}{t} = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0-0}{t} = 0$

Quindi $\exists \nabla f(0,0) = (0,0)$

3. Dire se f è differenziabile in $(0,0)$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \langle \nabla f(0,0), (x,y) \rangle}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$\langle \nabla f(0,0), (x,y) \rangle = \langle (0,0), (x,y) \rangle = (0,0),$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - (0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ da svolgimento del primo punto (1)

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0 - (0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

Chapter 5

Teoremi Orale

5.1 Continuità , derivabilità , differenziabilità , polinomio di Taylor.

5.1.1 Teorema del confronto

Teorema 5.1.1 (Teorema del confronto) Sia $h, g, f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, supponiamo che:

$$5.1 \quad f(p) \leq g(p) \leq h(p), \quad \forall p \in A \setminus \{p_0\}$$

$$5.2 \quad \exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = \lim_{p \rightarrow p \rightarrow p_0} h(p) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

allora $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} g(p) = L$

Dim. 15 Supponiamo che $L \in \mathbb{R}$, dobbiamo provare che $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} g(p) = L$, cioè per definizione:

$$1^* \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta (= \delta(p_0, \varepsilon)) > 0 \text{ t.c.}$$

$$|g(p) - L| < \varepsilon \quad \forall p \in B(p_0, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

Per ipotesi sappiamo che

$$\lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L, \quad \lim_{p \rightarrow p_0} h(p) = L$$

cioè :

$$2^* \quad \forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists \delta_1 (= \delta_1(p_0, \varepsilon)) > 0$$

$$\text{t.c. } |f(p) - L| < \varepsilon \text{ o eq.}$$

$$L - \varepsilon < f(p) < L + \varepsilon \quad \forall p \in B(p_0, \delta_1) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

E

$$\mathcal{I}^* \quad \forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists \delta_2 (= \delta_2(p_0, \varepsilon)) > 0$$

$$\text{t.c. } |h(p) - L| < \varepsilon \text{ o eq.}$$

$$L - \varepsilon < h(p) < L + \varepsilon \quad \forall p \in B(p_0, \delta_2) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

Da (5.1), (2*), (3*) segue che $\forall \varepsilon > 0$, scegliendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ vale che

$$L - \varepsilon < f(p) \leq g(p) \leq h(p) < L + \varepsilon$$

$\forall p \in B(p_0, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$ e dunque vale la (1*).

5.1.2 Definizione di limite per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Definizione 5.1.1 (Limite di funzioni di due variabili) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $p_0 \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A . Si dice che:

$$\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R}$$

oppure $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = L$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = d(p_0, \varepsilon) > 0 \mid |f(x,y) - L| < \varepsilon, \forall (x,y) \in B(p, \delta) \cap (A \setminus \{p_0\})$$

5.1.3 Definizione di continuità per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Definizione 5.1.2 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

1. f si dice *continua* in $p_0 \in A$ se
 - (a) p_0 è un punto isolato di A , oppure
 - (b) p_0 è un punto di accumulazione ed $\exists \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = f(p_0)$
2. f si dice continua su A se f è continua in ogni punto $p_0 \in A$

5.1.4 Definizione di derivate parziali e di vettore gradiente per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ **A** aperto

Definizione 5.1.3 1. Si dice che f è derivabile(parzialmente) rispetto alla variabile x nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$ se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} := \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = D_1 f(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$$

2. Si dice che f è derivabile(parzialmente) rispetto alla variabile y nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$ se

$$\exists \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} := \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = D_2 f(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$$

3. Se f è derivabile (parzialmente) sia rispetto ad x ed y nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$, si chiama (vettore)gradiente di f in p_0 il vettore:

$$\nabla f(p_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \right) \in \mathbb{R}^2$$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A insieme aperto. Supponiamo che:

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : A \rightarrow \mathbb{R}$$

allora è ben definito il campo dei vettori gradiente:

$$\nabla f : \mathbb{R}^2 \supseteq A \ni p \rightarrow \nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p) \right) \in \mathbb{R}^2$$

5.1.5 Definizione di differenziabilità in un punto per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e relazione con l'esistenza del gradiente in quel punto

Definizione 5.1.4 Dato $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e dato $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ si dice differenziabile nel punto p_0 se vale

$$(D) \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x) - [a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0)]}{d(p, p_0)}$$

dove $d(p, p_0) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ e per $a, b \in \mathbb{R}$ opportuni.

Se f è differenziabile nel punto $p_0 = (x_0, y_0)$, allora

$$\exists \nabla f(p_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \right)$$

e

$$a = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0), b = \frac{\partial f}{\partial y}(p_0)$$

Dim. 16 Supponiamo che f sia differenziabile in p_0 , cioè che valga (D). Ponendo nella (D), $y = y_0$ otteniamo che:

$$\begin{aligned} \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - [a(x - x_0) + f(x_0, y_0)]}{|x - x_0|} &= 0 \\ \Rightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) &= a \end{aligned}$$

Procediamo allo stesso modo, ponendo $x = x_0$ nella (D) e otteniamo $\frac{\partial f}{\partial y}(p_0) = b$

5.1.6 Regola della catena nel caso generale di due funzioni,

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ e } g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$$

Teorema 5.1.2 (Regola della catena, RDC) Siano $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $f : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$, A e B aperti

(i) $g(A) \subseteq B$

(ii) Se $g = (g_1, \dots, g_m)$, $f = (f_1, \dots, f_k)$

Supponiamo che $g_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, m)$ sia diff. in un dato $x_0 \in A$
 $f_i : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, k)$ sia diff. in un dato $y_0 = g(x_0)$

Consideriamo ora la funzione $h := f \circ g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $h = (h_1, \dots, h_k)$

con $h_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

allora le funzioni $h_i : A \rightarrow \mathbb{R} \ (i = 1, \dots, k)$ sono diff. in x_0 e

$$Dh(x_0) = Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)$$

5.1.7 Formula di Taylor del II ordine per una funzione di due variabili

Definizione 5.1.5 Dato $m \in \mathbb{N}$, $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ fissato, si chiama polinomio di ordine m di $n = 2$ variabili, centrato in p_0 , una funzione $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$T(x, y) = \sum_{h=0}^m \sum_{i=0}^n c_{i,h-i} (x - x_0)^i (y - y_0)^{h-i}$$

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$, dove $c_{i,h-i}$ ($i = 0, \dots, h$ e $h = 0, \dots, m$) sono $\frac{(m+1)(m+2)}{2}$ coeff. ass.

Sia $f \in C^2(B(p_0, r))$, $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e $r > 0$ fissato. Allora vale:

$$(FT_2) f(p) = T_2(p) + o\left(\|p - p_0\|^2\right)$$

$\forall p = (x, y) \in B(p_0, r)$, dove

$$T_2(p) := f(p_0) + \langle \nabla f(p_0), p - p_0 \rangle + \frac{1}{2} \langle D^2 f(p_0) \cdot (p - p_0), p - p_0 \rangle$$

se $p \in \mathbb{R}^2$.

(polinomio di Taylor del II ordine di f , centrato in p_0)

5.1.8 Definizione di matrice Hessiana per un funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sua applicazione nella formula di Taylor del II ordine

Definizione 5.1.6 Data $f \in C^2(A)$, $A \in \mathbb{R}^2$ aperto, si chiama, matrice hessiana di f in un punto $p \in A$, la matrice 2×2

$$D^2 f(p) = H(f)(p) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p) \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

L'applicazione della matrice Hessiana nel PT2o si può trovare nello sviluppo della dimostrazione, infatti per una funzione $F(t) = f(p_0 + tv)$, $t \in (-r, r)$ e $B(p_0, r)$ andando a calcolare il polinomio di Taylor per $t = 0$, e supponendo di avere $v = \frac{p-p_0}{\|p-p_0\|}$, otteniamo che $F''(t)$:

$$\begin{aligned} F''(t) &= v_1 \cdot \left\langle \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (p_0 + tv), v \right\rangle + v_2 \cdot \left\langle \nabla \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (p_0 + tv), v \right\rangle = \\ &= v_1 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_2 \right) + v_2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p_0 + tv)v_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2 \right) = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_1 v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2^2 \end{aligned}$$

Pertanto calcolando $F''(0)$ otteniamo:

$$F''(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0 + tv)v_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0 + tv)v_1 v_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0 + tv)v_2^2$$

Che può essere riscritto mediante matrice Hessiana del tipo:

$$F''(0) = \langle D^2 f(p_0)v, v \rangle$$

E sostituendola otteniamo

$$f(p_0 + tv) = F(t) = f(p_0) + \langle \nabla f(p_0), v \rangle t + \frac{1}{2} \langle D^2 f(p_0)v, v \rangle t^2 + o(t^2), \text{ per } t \rightarrow 0$$

Scegliendo $t = \|p - p_0\|$ e otteniamo la forma del polinomio di Taylor di II ordine. Ed è questa l'applicazione della matrice Hessiana.

5.2 Massimi e minimi

5.2.1 Definizione di punto di massimo/minimo relativo, massimo/minimo assoluto e punto di sella per una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Definizione 5.2.1 Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

1. $p_0 \in A$ si dice, punto di massimo ($= \max$) relativo di f su A se $\exists r_0 > 0$ t.c. $f(p) \leq f(p_0) \forall p \in A \cap B(p_0, r_0)$
Rispettivamente $p_0 \in A$ si dice, punto di minimo ($= \min$) relativo di f su A se $\exists r_0 > 0$ t.c. $f(p) \geq f(p_0) \forall p \in A \cap B(p_0, r_0)$
2. $p_0 \in A$ si dice punto di massimo ($= \text{MAX}$) assoluto se $\forall p \in A, f(p) \leq f(p_0)$
Rispettivamente $p_0 \in A$ si dice punto di minimo ($= \text{MIN}$) assoluto se $\forall p \in A, f(p) \geq f(p_0)$

Definizione 5.2.2 Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Un punto $p_0 \in A$ si dice punto di sella se p_0 è un punto stazionario di f e $f(p) - f(p_0)$ ammette sia valori positivi che negativi in ogni intorno di p_0

5.2.2 Teorema di Fermat sui punti stazionari di una funzione

Teorema 5.2.1 (Fermat) Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che esista $p_0 \in A$ t.c.

(i) f differenziabile in p_0 . In particolare $\exists \nabla f(p_0)$

(ii) p_0 sia un estremo libero di f in A

Allora $\nabla f(p_0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0)$ (n -volte)

Definizione 5.2.3 Data $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto, un punto $p_0 \in A$ si chiama punto stazionario (o critico) di f se f è differenziabile in p_0 e $\nabla f(p_0) = \underline{0}_{\mathbb{R}^n}$

5.2.3 Teorema di Weierstrass sull'esistenza del massimo e minimo assoluto di una funzione

Teorema 5.2.2 (Weierstrass) [BDPG,10.10] Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, Supponiamo che:

(i) A sia limitato e chiuso, (in $n = 1$, $A = [a, b]$, $\partial A = \{a, b\}$, $\mathring{A} = (a, b)$)

(ii) f sia continua su A

Allora esiste $\min_A f$ e $\max_A f$

5.2.4 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la ricerca di massimi e minimi vincolati per funzioni di due variabili

Teorema 5.2.3 (Teorema dei moltiplicatori di Lagrange, TML) Sia $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ dove $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Supponiamo che:

(i) $\exists \min_V f = f(p_0)$ (o $\exists \max_V f = f(p_0)$) con $p_0 = (x_0, y_0) \in V$

(ii) $\exists \nabla g(p_0) \neq (0, 0)$

Allora esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ (detto moltiplicatore) t.c. $(x_0, y_0, \lambda_0) \in \mathbb{R}^3$ è un punto stazionario della funzione.

Equivalentemente:

$$\exists \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \begin{cases} g(p_0) = 0 \\ \nabla f(p_0) + \lambda_0 \nabla g(p_0) = (0, 0) \end{cases} \quad (*)$$

5.3 Integrali per funzioni in più variabili

5.3.1 Definizione di insieme insieme semplice (o normale) in \mathbb{R}^2 rispetto agli assi cartesiani

Definizione 5.3.1 *Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^2$ si dice*

- Dominio semplice (o normale) rispetto all'asse y se esistono $g_1, g_2 \in C^0([a, b])$ t.c. $g_1 \leq g_2$ su $[a, b]$ e

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

- Dominio semplice (o normale) rispetto all'asse x se esistono $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$ t.c. $h_1 \leq h_2$ su $[c, d]$ e

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

5.3.2 Formula di riduzione di integrali doppi su insiemi semplici

Teorema 5.3.1 (Formula di riduzione su domini semplici) [BDPG,14.17]
Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un dominio semplice rispetto ad uno degli assi. Supponiamo che $f \in C^0(A)$, allora $f \in \mathcal{R}(A)$ e valgono le seguenti formule:

1. Se $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ con $g_1, g_2 \in C^0([a, b])$, allora

$$(1) \iint_A f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

In particolare A è misurabile e $|A|_2 = \iint_A 1 = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x)) dx$

2. Se $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ con $h_1, h_2 \in C^0([c, d])$, allora

$$(2) \iint_A f = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

In particolare A è misurabile e $|A|_2 = \iint_A 1 = \int_c^d (h_2(y) - h_1(y)) dy$

5.3.3 Formula di cambiamento di variabili per integrali doppi e tripli

Integrali doppi

Definizione 5.3.2 La mappa ψ si dice un cambiamento di variabili se

- ψ è bigettiva
- $\psi_i \in C^1(D^*)$, $\psi_i, \frac{\partial \psi_i}{\partial u}, \frac{\partial \psi_i}{\partial v} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$ limitate ($i=1,2$)
- $\det D\psi(u, v) \neq 0$, $\forall (u, v) \in D^*$, dove

$$D\psi(u, v) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \psi_1}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial \psi_2}{\partial v}(u, v) \end{bmatrix} \quad (\text{Matrice Jacobiana})$$

Denotiamo $dA^* = du dv$ e $dA = dx dy$

Si può provare che $dA = ||\det D\psi(u, v)|| dA^*$.

Teorema 5.3.2 (Cambiamento di variabili negli integrali doppi) [BDPG,14.19]

Siano $D, D^* \subseteq \mathbb{R}^2$ aperti limitati e misurabili, sia $\psi : D^* \rightarrow D$ un cambiamento di variabili e sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua e limitata.

Allora vale la formula

$$(FCV)_2 \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(\psi(u, v)) |\det D\psi(u, v)| du dv$$

Integrali tripli

Definizione 5.3.3 La mappa Ψ si dice cambiamento di variabile (in \mathbb{R}^3) Se

(i) Ψ è bigettiva

(ii) $\Psi_i \in C^1(D^*)$,

$$\Psi_i, \frac{\partial \Psi_i}{\partial u}, \frac{\partial \Psi_i}{\partial v}, \frac{\partial \Psi_i}{\partial w} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$$

limitate ($i = 1, 2, 3$)

(iii) $\det D\Psi(u, v, w) \neq 0$, dove

$$D\Psi(u, v, w) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \Psi_1}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial w} \\ \frac{\partial \Psi_2}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial w} \\ \frac{\partial \Psi_3}{\partial u} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial v} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial w} \end{bmatrix}$$

se $(u, v, w) \in D^*$

Teorema 5.3.3 (Cambiamento di variabili negli integrali tripli) *Siano $D^*, D \subset \mathbb{R}^3$ aperti limitati e misurabili, sia $\Psi : D^* \rightarrow D$ un cambiamento di variabili e sia $f \in C^0(D)$ e limitata. Allora*

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{D^*} f(\Psi(u, v, w)) |\det D\Psi(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

5.3.4 Cambiamento di coordinate cilindriche e sferiche

Coordinate ellittiche

Definizione 5.3.4 *Error 404, non le trovo!! Suppongo:*

Coordinate ellittiche:

$$\Psi \equiv \begin{cases} x = \rho \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \vartheta \end{cases}$$

$$0 \leq \vartheta \leq 2\pi, \rho \geq 0, |\det D\Psi(\rho, \vartheta)| = \rho^2$$

Coordinate sferiche

Definizione 5.3.5 *Coordinate sferiche:*

$$\Psi \equiv \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \vartheta \\ y = r \sin \varphi \sin \vartheta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$$0 \leq \vartheta \leq 2\pi, r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, |\det D\Psi(r, \vartheta, \varphi)| = r^2 \sin \varphi$$

5.3.5 Formule di riduzione per integrali tripli su un parallelepipedo

Teorema 5.3.4 (Formule di riduzione per integrali tripli rispetto a domini semplici)
[BDPG, 14.28] Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un insieme semplice rispetto all'asse z di tipo

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

e sia $f \in C^0(A)$. Allora

$$\iiint_A f = \iint_E \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

5.3.6 Definizione di insieme definito per fili e per strati

Definizione 5.3.6 *Dato un insieme $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$ si definisce:*

- *L'insieme $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]\}$ è uno strato.*
- *L'insieme $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [a_3, b_3]\}$ è un filo.*

5.3.7 Formula di integrazione per fili e per strati

Teorema 5.3.5 (Formule di riduzione su parallelepipedi) [BDPG,14.26]

Siano $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$, $f \in C^0(Q)$

(i) La funzione

$$[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \ni (x, y) \rightarrow \int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz$$

è integrabile su $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ e

$$(1) \iiint_Q f = \iint_{[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz \right)$$

(ii) La funzione

$$[a_1, b_1] \ni x \rightarrow \iint_{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]} f(x, y, z) dy dz$$

è integrabile su $[a_1, b_1]$ e

$$(2) \iiint_Q f = \int_{a_1}^{b_1} \left(\iint_{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]} f(x, y, z) dy dz \right)$$

La

(1) si chiama formula di riduzione per fili

(2) si chiama formula di riduzione per strati

5.4 Curve e forme differenziali

5.4.1 Definizione di curva in \mathbb{R}^n , supporto di una curva, estremi di una curva, equazione parametrica di una curva

Definizione 5.4.1 (i) Si chiama curva una mappa $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$ con I intervallo di \mathbb{R}

(ii) Se $I = [a, b]$, i punti $\gamma(a), \gamma(b)$ di \mathbb{R}^n si chiamano estremi della curva

(iii) Si chiama sostegno (o supporto) della curva γ , l'insieme $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^n$. Si chiama equazione parametrica di γ l'equazione $x = (x_1, \dots, x_n) = \gamma(t) \ t \in I$

5.4.2 Definizione di curva chiusa, semplice, regolare, orientazione (o verso di percorrenza) di una curva semplice

Definizione 5.4.2 (i) La curva γ si dice chiusa se $I = [a, b]$ e $\gamma(a) = \gamma(b)$

(ii) La curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice semplice se γ è iniettiva, o se γ è chiusa e $I = [a, b]$, allora $\gamma : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è iniettiva.

Definizione 5.4.3 Una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice regolare se γ è di classe C^1 e $\gamma'(t) \neq \underline{0}_{\mathbb{R}^n} \ \forall t \in I$

Definizione 5.4.4 Sia data una curva semplice $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Allora essa induce un'orientazione sul suo sostegno $\gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^n$. Più precisamente

Data $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva semplice, si dice che il punto $x_1 = \gamma(t_1)$ precede il punto $x_2 = \gamma(t_2)$ se $t_1 < t_2$. L'orientazione della curva viene detta anche verso della curva.

5.4.3 Definizione di versore tangente ad una curva regolare

Definizione 5.4.5 Data $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare, si chiama versore (o direzione) tangente a γ il campo vettore

$$\mathbf{T}_\gamma(t) := \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \quad t \in I$$