

Einführung

Fortgeschrittene mathematische Methoden in der Statistik

Vorlesung: Fabian Scheipl (fabian.scheipl@lmu.de)

Material: Thomas Nagler

LMU München

Organisatorisches

- **Personen:**

- Dr. Fabian Scheipl (VL)
- Jana Gauß (Ü)

- **Zeiten & Räume:**


VL	Do 10:15-12:00	Hgb. – A 214
Übung 1	Di 14:15-15:45	Prof.-Huber-Pl. 2 – W 201
Übung 2	Mi 12:15-13:45	Hgb. - M 114

- **Termine WS 26/27:** wöchentlich Do, **15.10.2026 – 4.2.2027** (Weihnachtspause: letzte VL 17.12.2026, weiter am 7.1.2027)

Motivation

Inhalt: Statistik früher & heute

Statistik früher



Statistik heute



Motivation

- In der Praxis ist Statistik / ML immer *computational*.
- In diesem Kurs lernen wir *mathematische Konzepte*, die bei der praktischen Lösung von Problemen helfen.
- Diese Konzepte werden benötigt, um *Computeralgorithmen* zu entwickeln, verstehen und analysieren.
 - ⇒ fortgeschrittene (numerische) Lineare Algebra
 - ⇒ fortgeschrittene Analysis

Warum so viel Mathe? Ein Beispiel

Aufgabe: Trainiere ein lineares Modell $y_i \approx \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_p x_{ip}$ mit $p = 10.000$ Features auf $n = 100.000$ Beobachtungen.

$\implies$ **Kleinste-Quadrate-Problem:**

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \left(\sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 \right) = \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \| \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} - \mathbf{y} \|_2^2$$

Naive Lösung (falls $\text{rang}(\mathbf{X}) = p$): $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$

Probleme in der Praxis:

1. **Kondition:** $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ kann sehr schlecht “konditioniert” sein $\implies$ numerische Instabilität, große Fehler
2. **Komplexität:** Matrixinversion kostet $O(p^3)$ Operationen $\implies$ für $p = 10.000$: ca. 10^{12} FLOPs!
3. **Speicher:** $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ ist $p \times p$ Matrix $\implies$ für $p = 10.000$: ca. 800 MB nur für diese Matrix

Bessere Lösungen: QR-Zerlegung, SVD, iterative Verfahren $\rightarrow$ dieser Kurs

Themen

- Kondition und Komplexität
 - Was sind gute Algorithmen?
- Numerische Lineare Algebra
 - Matrix- & Tensorrechnung
 - Berechne (KQ-)Lösungen für $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ etc.
- Fortgeschrittene Differenzialrechnung / Analysis
 - Höherdimensionale, verallgemeinerte Ableitungen
 - Wie kann man komplizierte Fkt. einfach approximieren?
- Numerische Optimierung
 - Wie finde ich Minima/Maxima von komplizierten Funktionen?
 - z.B. Training neuronaler Netze: Millionen Parameter, nicht-konvexe Verlustfunktionen → smarte Algorithmen nötig (SGD & Co.)

Fünf Beispiele

Beispiel 1: Kondition

Betrachte das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2.0001 \end{pmatrix}$$

Exakte Lösung: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Gestörtes Problem (z.B. durch Rundungsfehler): $Ax = \tilde{b}$ mit

$$\tilde{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2.0002 \end{pmatrix} \quad (\text{nur } 0.005\% \text{ Fehler!})$$

Lösung des gestörten Problems: $\tilde{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\implies$ **100% Fehler** in x_1 durch 0.005% Fehler in den Daten!

$\implies$ Das Problem ist (furchtbar) **schlecht konditioniert**.

Beispiel 2: Komplexität

Matrixmultiplikation $C = AB$ für $n \times n$ Matrizen:

Algorithmus	Rechenops. für $n = 1000$	Komplexität
Naive Methode	$\approx 10^9$ Ops	$O(n^3)$
Strassen	$\approx 6 \times 10^8$ Ops	$O(n^{2.807})$
Optimiert	$\approx 2 \times 10^8$ Ops	$O(n^{2.373})$

Für $n = 10.000$:

- Naiv: $\approx 10^{12}$ Ops
- Optimiert: $\approx 2 \times 10^{10}$ Ops

$\implies$ **Faktor 50 schneller** durch besseren Algorithmus (...potentiell)!

Beispiel 3: Höherdimensionale Ableitungen

Beispiel A1: Gradient Descent für neuronale Netze

Verlustfunktion: $L : \mathbb{R}^{p \times K} \rightarrow \mathbb{R}$ (Matrix-Argument $\mathbf{W}$!)

Zum Beispiel: **MSE**

$$L(\mathbf{W}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{XW} - \mathbf{Y}\|_F^2$$

mit $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times p}$, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{p \times K}$, $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N \times K}$

Frage: Wie berechnen wir $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}}$?

Naive Methode: Berechne $\frac{\partial L}{\partial W_{ij}}$ für alle i, j einzeln

$\implies p \times K$ Ableitungen!

Für $p = 1000$, $K = 10$: **10.000 Ableitungen!**

Bessere Methode: Matrix-Kalkül

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}} = \mathbf{X}^\top (\mathbf{XW} - \mathbf{Y})$$

Eine Zeile statt 10.000! Und: **effizient implementierbar**.

$\implies$ Ableitungen von Matrix/Tensor-Funktionen essentiell für Deep Learning, Optimierung, etc.

Beispiel 4: Funktionsapproximation: Taylor-Reihen

Ziel: Approximiere komplizierte Funktion $f(x)$ durch ein Polynom in der Nähe von x_0

Taylor-Approximation 2. Ordnung:


$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

Konkretes Beispiel: $f(x) = e^x$ um $x_0 = 0$

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = 1 \implies e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

Fehler für $x = 0.5$:

- Exakt: $e^{0.5} = 1.6487\dots$
- Approximation: $1 + 0.5 + 0.125 = 1.625$
- Relativer Fehler: $< 2\%$



Beispiel 5: Optimierung in Machine Learning

Typisches Problem: Training eines neuronalen Netzes

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} L(\theta), \quad L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f(\mathbf{x}_i; \theta), y_i)$$

Modell	Parameter d	Daten N
Logistische Regression (MNIST, 10 Klassen)	$\sim 8 \times 10^3$	6×10^4
ResNet-50	$\sim 2.5 \times 10^7$	$> 10^6$
GPT-3	$\sim 1.75 \times 10^{11}$	$\sim 3 \times 10^{11}$ Tokens

Herausforderungen:

1. **Nicht-konvex:** Viele lokale Minima / Sattelpunkte der Verlustfunktion
2. **Hochdimensional:** Naive Methoden scheitern
3. **Stochastisch:** Nur Zugriff auf Minibatches

$\implies$ Brauchen **smarte Algorithmen:** Stochastic Gradient Descent, Momentum, etc.

Vorkenntnisse & Selbsttest

Benötigte Vorkenntnisse

- Lineare Algebra (VL Lineare Algebra I):
 - v.a. Matrixrechnung, Eigenwerte und -vektoren
- Analysis (VL Analysis I):
 - v.a. Stetigkeit & Differenzierbarkeit, Ableitungen
- R-Programmierung (VL Einführung in R)

Empfehlung:

- Intuition für LA z.B. mit *3blue1brown* o.ä. aufbauen!
- Skript **aktiv** lesen & benutzen um Grundbegriffe zu wiederholen

(Minimaler) Selbsttest: Vorkenntnisse evtl. ausreichend?

Lineare Algebra - Sie sollten wissen:

1. Was ist der *Rang* einer Matrix? Wie berechne ich ihn?
2. Was bedeutet es, wenn eine Matrix $\mathbf{A}$ *invertierbar* ist?
3. Was sind *Eigenwerte/Eigenvektoren* einer Matrix? Wie finde ich sie?
4. Was ist die geometrische Bedeutung einer Matrix-Vektor-Multiplikation $\mathbf{A}\mathbf{x}$?
5. Wann bilden Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ eine *Basis* des $\mathbb{R}^n$? Was ist ihr *Span*?

(Minimaler) Selbsttest: Vorkenntnisse evtl. ausreichend?

Analysis - Sie sollten wissen:

1. Was bedeutet es, wenn eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *stetig* ist?
2. Was ist die *Ableitung* $f'(x_0)$ geometrisch?
3. Was ist ein lokales vs. globales Minimum?