

Tema 2 Expresiones Algebraicas

L6	Retomar L5, 2.8
----	-----------------

2. **Expresiones Algebraicas**

2.8 Fracciones Racionales. Operaciones y simplificación. Expresiones algebraicas. Operaciones (suma, resta, multiplicación, división) y simplificación

2.8 Fracciones Racionales. Operaciones y simplificación. Expresiones algebraicas.

Operaciones y simplificación

Sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos polinomios en una variable. $\frac{P(x)}{Q(x)}$ tal que $Q(x) \neq 0$ recibe el nombre de fracción racional. Los valores de x tal que $Q(x) = 0$ se denominan restricciones. (restricciones de la fracción racional).

Los valores permitidos conforman el dominio de la fracción racional

Se dice que una fracción racional está completamente simplificada o expresada en su forma más simple, si el numerador y el denominador de dicha fracción no tienen factores comunes. **Si no**

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b} \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ y } b \neq 0 \neq c \text{ Se simplifica el factor común } c$$

Simplifique al máximo la fracción racional: $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

$$\text{Solución: } \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = \frac{(x + 1)\cancel{(x - 1)}}{\cancel{x - 1}} = x + 1, \text{ con } x \neq 1$$

$$\text{Por lo que se tiene que: } \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, \text{ con } x \neq 1.$$

Simplifique al máximo la fracción racional:

$$\frac{bx^2 - b - x^2 + 1}{b^2x - x + b^2 - 1} \quad \frac{a^2 - m^2 + 2ab + b^2}{a^2 - m^2 + ab + mb} \quad \frac{2 \cdot 2^{3n} - 4 \cdot 4^n}{(2 \cdot 2^n)^3 - 8 \cdot 2^{2n+1}}$$

Tarea

$$\frac{x^2y^3 + x^2b^3 - a^2y^3 - a^2b^3}{xy + xb + ab + ay}$$

$$\left(\frac{16^{-2}a^{1/2}b^{-3}}{81^{-1}a^{-1/2}b^3} \right)^{-1/4}$$

Operaciones con fracciones racionales

Si $\frac{P(x)}{Q(x)}$ y $\frac{R(x)}{S(x)}$ son fracciones racionales, con $Q(x) \neq 0$ y $S(x) \neq 0$, entonces:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{R(x)}{S(x)} = \frac{P(x) \cdot R(x)}{Q(x) \cdot S(x)}$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \div \frac{R(x)}{S(x)} = \frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{S(x)}{R(x)} = \frac{P(x) \cdot S(x)}{Q(x) \cdot R(x)}, \text{ con } R(x) \neq 0$$

$$\begin{array}{l|l} \text{(3)} \quad \frac{a}{-b} = \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} & \text{(5)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \\ \text{(4)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b} & \text{(6)} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{\left(\frac{M}{b}\right) \cdot a + \left(\frac{M}{d}\right) \cdot c}{M} \\ \text{(7)} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \end{array} \right.$$

Uso del Teorema sobre exponentes negativos

$$\text{(1)} \quad \frac{a^{-m}}{b^{-n}} = \frac{b^n}{a^m}$$

$$\text{(2)} \quad \left(\frac{a}{b} \right)^{-n} = \left(\frac{b}{a} \right)^n$$

Realice las operaciones indicadas y simplifique al máximo

1.
$$\frac{y^3 + 4y^2 - 5y}{y^2 - 2y + 1} \div \frac{y^2 + y - 2}{y^4 + 8y} \cdot \frac{y - 1}{y^2 - 2y + 4}$$

2.
$$q = \left[\frac{y^3 + 4y^2 - 5y}{y^2 - 2y + 1} \div \frac{y^2 + y - 2}{y^4 + 8y} \right] \cdot \frac{y - 1}{y^2 - 2y + 4}$$

3.
$$q = \frac{x^3 + x^2y + xy^2 - 2x^2 - 2xy - 2y^2}{x^2 + x - 6} \div \frac{x - y}{(x + y)^{-1}} \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^3 - y^3}$$

4. Simplifique la expresión.

$$\frac{7}{x + 2} + \frac{3x}{(x + 2)^2} - \frac{5}{x}$$

Presentación realizada por Gilberto Vargas Mathey

Apuntes tomados de:

Expresiones algebraicas

Jeffrey Chavarría folleto de Matemática General Julio 2016

Prácticas y soluciones Matemática General Cristhian Páez

Práctica general del curso

Swokowski /, Cole, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 12ª Edición

Programa Geógebra para la elaboración de diagramas y dibujos varios

Apuntes no digitalizados para las lecciones del curso de matemática General
Profesor. Gilberto Vargas Mathey