Nistatina + Óxido de zinco Pharlab®, carinho especial para o bebê



Nistatina + óxido de zinco Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999. M.S. 1.4107.0078. Apresentações: Pomada dematológica. Embalagens contendo 1 ou 50 bisnagas com 60g de pomada. USO TÓPICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Indicações: Nistatina + óxido de zinco pomada tem como indicação principal o tratamento das assaduras infantis (dermatite das fraldas, dermatite amoniacal). Outras indicações são os intertrigos (mamário, perineal, interdigital, axilar ou outros) e as paroníquias por fungos do gênero Candida. Contraindicações: O produto é contraindicado em casos de hipersensibilidade à nistatina, ao óxido de zinco ou aos demais ingredientes do produto. Advertências e precauções: Em casos raros pode haver irritação da pele com o uso do produto. Uso pediátrico: Não há advertências ou recomendações especiais para crianças. Uso geriátrico: Não há advertências ou recomendações especiais para pessoas idosas. Gravidez, Categoria C. Interações medicamentosas: Não se conhece nenhum tipo de interação entre outros medicamentos ou alimentos e nistatina + óxido de zinco pomada. Posologia: Nistatina + óxido de zinco pomada deve ser aplicada depois do banho e a cada troca de fraldas, após lavagem e secagem cuidadosa da pele. Quando usada nas demais indicações (intertrigos e paroníquias), aplicar duas ou mais vezes ao dia nas áreas afetadas. Reações adversas: Em casos raros, pode haver irritação da pele com o uso do produto. Farm. Resp.: Domingos J. S. lannotti - CRF/MG-10645. Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. Rua São Francisco, 1300 - Américo Silva. CEP 35590-000 - Lagoa da Prata – MG. CNPJ 02.501.297/0001-02 - Indústria Brasileira.

NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO



www.pharlab.com.br
f facebook.com/pharlab
@ Pharlab

