

Sommatorie e progressioni geometriche



Indice

Sommatorie

Progressioni geometriche



Sommatorie



Introduzione: Sommatorie

- ▶ In questa sezione introduciamo il **simbolo di sommatoria** $\sum$, una notazione compatta per scrivere somme di molti termini
- ▶ Vedremo le sue **proprietà principali** (costanti, somma di sommatorie, scomposizione, traslazione e riflessione degli indici)
- ▶ Calcoleremo infine alcune **sommatorie importanti**: la somma dei primi n numeri naturali, dei primi n numeri dispari e dei primi n numeri pari

Il simbolo di sommatoria

Definizione 1: di sommatoria

Siano $a_1, a_2, \dots, a_n$, n numeri reali. La loro somma

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

che si legge: “sommatoria per k da 1 a n di a_k ”. Il simbolo k si dice indice di sommatoria.

- ▶ Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini a_k sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice k .

Esempio

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^n k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2$$

Indice muto

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce k con i, j o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

Esempio

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 \neq \sum_{k=1}^m k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n oppure dei primi m quadrati (se $n \neq m$ il risultato sarà diverso).

Principali proprietà delle sommatorie

Vediamo ora le principali proprietà delle sommatorie, che permettono di manipolare e semplificare le espressioni con il simbolo $\sum$.

Prodotto per una costante e termine costante

Osservazione 1

Dato $c \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{prodotto per una costante})$$

$$\sum_{k=1}^n c = c \cdot n \quad (\text{sommatoria con termine costante})$$

Dimostrazione

Prima proprietà. Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \cdots + c a_n}_{=\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c \sum_{k=1}^n a_k}$$

Seconda proprietà:

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{\text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = c n$$

$= \sum_{k=1}^n c$



Osservazione 2

Date due sommatorie $\sum_{k=1}^n a_k$ e $\sum_{k=1}^n b_k$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$$

Dimostrazione

Abbiamo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{=\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k} \\ &= \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{=\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)} \end{aligned}$$



Osservazione 3

Dati due numeri naturali $n, m \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \quad (\text{scomposizione})$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m} \quad (\text{traslazione di indici})$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} \quad (\text{riflessione di indici})$$

Dimostrazione

Le tre proprietà sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie.



Alcune sommatorie importanti

Usando le proprietà appena viste, calcoliamo ora in forma chiusa alcune sommatorie importanti.

Somma dei primi n numeri naturali

Osservazione 4: somma dei primi n numeri naturali (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostrazione

Usando la riflessione degli indici:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k + n - k + 1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$



Somma dei primi n numeri dispari

Osservazione 5: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$$

o equivalentemente

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1) = n^2$$

Dimostrazione (1/2)

Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (2k - 1) &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Per la seconda forma:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1) &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\&= 2 \sum_{k=1}^n (k - 1) + n = 2 \left(\sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) + n \\&= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2\end{aligned}$$



Somma dei primi n numeri pari

Osservazione 6: somma dei primi n numeri pari (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Dimostrazione

$$\sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k = 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = n(n+1)$$



Riepilogo

Sommatorie:

- ▶ $\sum_{k=1}^n a_k$ è una notazione compatta per $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$;
l'indice k è **muto**
- ▶ Proprietà: prodotto per una costante, termine costante, somma di sommatorie, scomposizione, traslazione e riflessione degli indici

Sommatorie importanti ($n \geq 1$):

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2, \quad \sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Progressioni geometriche



Introduzione: Progressioni geometriche

- ▶ In questa sezione introduciamo le **progressioni geometriche**: sequenze in cui ogni termine si ottiene dal precedente moltiplicandolo per una costante, la **ragione**
- ▶ Ricaveremo la formula per la **somma dei primi n termini** di una progressione geometrica
- ▶ Questa formula ritorna spesso nel corso (ad esempio nello studio delle serie geometriche)

Definizione 2: di progressione geometrica

*Una sequenza di numeri reali è in **progressione geometrica** se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.*

Termini della progressione geometrica

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, l'associata progressione geometrica è:

$$a, \quad a q, \quad a q^2, \quad a q^3, \quad a q^4, \quad \dots$$


Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per q . Il k -esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere $a q^{k-1}$ e abbiamo:

$a q^{1-1} = a q^0 = a$	primo termine, in posizione $k = 1$
$a q^{2-1} = a q^1 = a q$	secondo termine, in posizione $k = 2$
$a q^{3-1} = a q^2$	terzo termine, in posizione $k = 3$
$a q^{4-1} = a q^3$	quarto termine, in posizione $k = 4$
$\dots$	$\dots$

Esempio (1/2)

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}$$



Esempio (2/2)

- ▶ Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

1, 2, 4, 8

Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche

Vediamo ora come calcolare in forma chiusa la somma dei primi n termini di una progressione geometrica.



Somma dei primi n termini

Osservazione 7: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione (1/2)

Se $q \neq 1$, proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, si ha:

$$\begin{aligned}(q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} &= q \sum_{k=1}^n q^{k-1} - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \\&= \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \\&= \sum_{k=1}^{n-1} q^k + q^n - \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^k \right) = q^n - 1\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Se $q = 1$, abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n 1 = n$$



Estensione al caso $a \in \mathbb{R}$

- Dati $q \in \mathbb{R}_+$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dato che

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \sum_{k=1}^n q^{k-1}$$

Forma equivalente

► Chiaramente:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

e quindi abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esempio (1/2)

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \quad \text{e} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8 + 4 + 2 + 1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16} \cdot 2 = \frac{15}{8}$$

Esempio (2/2)

- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8 \quad \text{e} \quad 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 2^{k-1} = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 16 - 1 = 15$$

Progressioni geometriche:

- ▶ Primo termine a , ragione q : termini $a, aq, aq^2, \dots$; il k -esimo termine è aq^{k-1}

Somma dei primi n termini:

- ▶ Se $q \neq 1$:
$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \frac{q^n - 1}{q - 1} = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$$
- ▶ Se $q = 1$:
$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a n$$

Riepilogo finale

- ▶ Il simbolo $\sum$ permette di scrivere in modo compatto somme di molti termini; il suo indice è muto
- ▶ Le proprietà delle sommatorie (costanti, somma, scomposizione, traslazione, riflessione) permettono di calcolare somme in forma chiusa
- ▶ Sommatorie importanti:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2, \quad \sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

- ▶ In una progressione geometrica di ragione $q \neq 1$:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \frac{q^n - 1}{q - 1}$$