


DefinitionDefinitiondefstylemytheoremdef TheoremTheoremtheostylemythe-
oremtheo CorollaryCorollarytheostylemytheoremcor PropositionProposition-
theostylemytheoremprop ObservationObservationtheostylemytheorembobs Lem-
maLemmatheostylemytheoremlem

DefinizioneDefinizionedefstylemytheoremdef;taTeoremaTeorematheostylemytheoremtheo;taCorollari

Last update: September 26, 2026

Prolungamenti continui



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Per la seguente funzione stabilire se esistono prolungamenti continui agli estremi del dominio. Studiare poi la derivabilità di tali prolungamenti.

$$f : [0, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (\cos x)^{(\pi/2)-x}$$

Ponendo $y = \pi/2 - x$ abbiamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} e^{(\frac{\pi}{2}-x) \log \cos x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} e^{y \log \sin y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} e^{y \log(y+o(y))} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} e^{y \log(y(1+o(1)))} = \lim_{y \rightarrow 0^+} e^{y \log y + y \log(1+o(1))} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

Si ha un prolungamento continuo ponendo

$$f(\pi/2) = 1.$$

Esaminiamo il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{f(x) - f(\pi/2)}{x - \pi/2} &= \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{e^{(\frac{\pi}{2}-x) \log \cos x} - 1}{x - \pi/2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} \frac{(\frac{\pi}{2}-x) \log \cos x}{x - \pi/2} = \lim_{x \rightarrow \pi/2^-} -\log \cos x = +\infty \end{aligned}$$

usando l'equivalenza

$$e^t - 1 \sim t, \quad t \rightarrow 0$$

con

$$t = \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \log \cos x, \quad x \rightarrow \pi/2^-.$$

Ne segue che f si può prolungare con continuità in $x = \pi/2$ ma tale prolungamento non è derivabile in $x = \pi/2$ (tangente verticale).

Esercizio 2

Per la seguente funzione stabilire se esistono prolungamenti continui agli estremi del dominio. Studiare poi la derivabilità di tali prolungamenti.

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (\cos(\pi x/2))^{\log x}$$

Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\log x \log \cos(\pi x/2)} = e^0 = 1$$

in quanto

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \log x \log \cos(\pi x/2) &= \lim_{x \rightarrow 0} \log x \log \left(1 - \frac{\pi^2}{8} x^2 + o(x^2) \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\pi^2}{8} x^2 + o(x^2) \right) \log x = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\pi^2}{8} x^2 \log x = 0. \end{aligned}$$

Si ha un prolungamento continuo ponendo

$$f(0) = 1.$$

Esaminiamo il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\log x \log \cos(\pi x/2)} - 1}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log x \log \cos(\pi x/2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\pi^2}{8} x \log x = 0 \end{aligned}$$

usando le equivalenze

$$e^t - 1 \sim t, \quad t \rightarrow 0$$

con

$$t = \log x \log \cos(\pi x/2), \quad x \rightarrow 0$$

e

$$\log \cos(\pi x/2) \sim -\frac{\pi^2}{8} x^2, \quad x \rightarrow 0.$$

Ne segue che f si può prolungare con continuità in $x = 0$ e tale prolungamento è derivabile in $x = 0$ con

$$f'(0) = 0.$$

Esaminiamo ora il comportamento per $x \rightarrow 1$ ponendo $y = x - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\log x \log \cos(\pi x/2)} = \lim_{y \rightarrow 0} e^{\log(1+y) \log(-\sin(\pi y/2))} = e^0 = 1$$

in quanto

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \log(1+y) \log(-\sin(\pi y/2)) &= \lim_{y \rightarrow 0} y \log(-\pi y/2 + o(y)) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} y \log(-\pi y/2(1 + o(1))) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} y \log(-\pi y/2) + \lim_{y \rightarrow 0} y \log(1 + o(1)) = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Si ha un prolungamento continuo ponendo

$$f(1) = 1.$$

Esaminiamo il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\log x \log \cos(\pi x/2)} - 1}{x - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{\log(1+y) \log(-\sin(\pi y/2))} - 1}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y) \log(-\sin(\pi y/2))}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \log(-\sin(\pi y/2)) = -\infty \end{aligned}$$

usando le equivalenze

$$e^t - 1 \sim t, \quad t \rightarrow 0$$

con

$$t = \log(1+y) \log(-\sin(\pi y/2)), \quad y \rightarrow 0$$

e

$$\log(1+y) \sim y, \quad y \rightarrow 0.$$

Ne segue che f si può prolungare con continuità in $x = 1$ ma tale prolungamento non è derivabile in $x = 1$ (tangente verticale).

Esercizio 3

Per la seguente funzione stabilire se esistono prolungamenti continui agli estremi del dominio. Studiare poi la derivabilità di tali prolungamenti.

$$f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2}$$

Sviluppiamo la funzione $\sqrt{\cos x}$ all'ordine 3 con punto iniziale $x = 0$ utilizzando

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$$

e

$$\sqrt{1+y} = 1 + \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{16}y^3 + o(y^3)$$

con $y = -(1/2)x^2 + o(x^2)$:

$$\sqrt{\cos x} = 1 - \frac{1}{4}x^2 + o(x^3).$$

Ne segue

$$f(x) = \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2} = -\frac{1}{4} + o(x)$$

da cui f si può prolungare con continuità in $x = 0$ ponendo

$$f(0) = -\frac{1}{4}$$

e tale prolungamento risulta derivabile con

$$f'(0) = 0.$$

Infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{4} + o(x) = -\frac{1}{4}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4} + o(x) + \frac{1}{4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x} = 0.$$

Esercizio 4

Per la seguente funzione stabilire se esistono prolungamenti continui agli estremi del dominio. Studiare poi la derivabilità di tali prolungamenti.

$$f : (0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (1 - \cos x)^{\log(1+x)}$$

Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\log(1+x) \log(1-\cos x)} = e^0 = 1$$

in quanto

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \log(1+x) \log(1-\cos x) &= \lim_{x \rightarrow 0} x \log\left(\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \log\left(\frac{1}{2}x^2(1+o(1))\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \log\left(\frac{1}{2}x^2\right) + \lim_{x \rightarrow 0} x \log(1+o(1)) = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Si ha un prolungamento continuo ponendo

$$f(0) = 1.$$

Esaminiamo il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\log(1+x) \log(1-\cos x)} - 1}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) \log(1-\cos x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log(1-\cos x) = -\infty \end{aligned}$$

usando l'equivalenza

$$e^t - 1 \sim t, \quad t \rightarrow 0$$

con

$$t = \log(1+x) \log(1-\cos x), \quad x \rightarrow 0.$$

Ne segue che f si può prolungare con continuità in $x = 0$ ma tale prolungamento non è derivabile in $x = 0$ (tangente verticale).