

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione convessa

Esercizi 2 — Problemi di ottimizzazione

Esercizi svolti su problemi di ottimizzazione, ottimi locali e globali, problemi convessi e concavi.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-convessa/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-convessa

Anno accademico 2026–2027

Indice

5 Problemi di ottimizzazione **2**

6 Problemi di ottimizzazione convessi e concavi **46**

Capitolo 5

Problemi di ottimizzazione

Esercizio 5.1 — Problema di ottimizzazione ($E1$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:


$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto |x-1| \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 3 \,\} = [-1, 3].$$

Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ |x-1| \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 3 \right\}$$
$$\max \left\{ |x-1| \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 3 \right\}$$
2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Il grafico è formato da due segmenti, che si incontrano nel punto $(1, 0)$.



3. La regione ammissibile è l'intervallo $F = [-1, 3]$. La funzione obiettivo vale $f(x) = 1 - x$ per $x \leq 1$ e $f(x) = x - 1$ per $x \geq 1$: non è lineare, il suo grafico è formato da due segmenti.

   - Per la forma di minimo, poiché $f(x) = |x-1| \geq 0 = f(1)$ per ogni x ammissibile, e $|x - 1| = 0$ solo per $x = 1$, l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

   $$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (1) \quad \text{e} \quad z(P) = 0.$$

   - Per la forma di massimo, per ogni x ammissibile abbiamo $-2 \leq x - 1 \leq 2$ e quindi $f(x) = |x - 1| \leq 2$, con $|x - 1| = 2$ solo per $x = -1$ e $x = 3$. Il problema ha **due** soluzioni ottime e il valore ottimo è:

   $$\arg\max \{\, |x - 1| \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 3 \,\} = \{-1, 3\} \quad \text{e} \quad z(P) = 2.$$

Esercizio 5.2 — Problema di ottimizzazione ($E2$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto -x^2 + 4x + 1 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 5 \,\} = [0, 5].$$

Domande


1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:

$$\min \left\{ -x^2 + 4x + 1 \quad \text{soggetto a } 0 \le x \le 5 \right\}$$
$$\max \left\{ -x^2 + 4x + 1 \quad \text{soggetto a } 0 \le x \le 5 \right\}$$

2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura; la linea orizzontale della griglia ad altezza 0 è la retta $f(x) = 0$.



3. Completando il quadrato, la funzione obiettivo si può scrivere come

$$f(x) = -x^2 + 4x + 1 = 5 - (x^2 - 4x + 4) = 5 - (x-2)^2.$$

- Per la forma di minimo, per ogni x ammissibile abbiamo $-2 \le x-2 \le 3$ e quindi $(x-2)^2 \le 9$, con $(x-2)^2 = 9$ solo per $x = 5$ (l'altra soluzione $x = -1$ non è ammissibile). Quindi $f(x) = 5-(x-2)^2 \ge -4 = f(5)$ e l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (5) \quad \text{e} \quad z(P) = -4.$$

- Per la forma di massimo, poiché $(x-2)^2 \ge 0$, abbiamo $f(x) = 5-(x-2)^2 \le 5 = f(2)$ per ogni x ammissibile, con l'uguaglianza solo per $x = 2$. L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (2) \quad \text{e} \quad z(P) = 5.$$

Il valore nell'altro estremo della regione ammissibile, $f(0) = 1$, non è né il minimo né il massimo.

Esercizio 5.3 — Problema di ottimizzazione ($E3$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto |x-1| + |x+1| \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : -3 \le x \le 2 \,\} = [-3, 2].$$


Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ |x-1| + |x+1| \ \text{ soggetto a } \ -3 \le x \le 2 \right\}$$
$$\max \left\{ |x-1| + |x+1| \ \text{ soggetto a } \ -3 \le x \le 2 \right\}$$

2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Eliminando i valori assoluti su ciascun intervallo, la funzione obiettivo è
$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{se } x \le -1, \\ 2 & \text{se } -1 \le x \le 1, \\ 2x & \text{se } x \ge 1, \end{cases}$$
e il suo grafico è formato da tre segmenti.



3. La regione ammissibile è l'intervallo $F = [-3, 2]$.

   - Per la forma di minimo, per la disuguaglianza triangolare,

   $$f(x) = |1 - x| + |x + 1| \geq |(1 - x) + (x + 1)| = 2 \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

   Per $-1 \leq x \leq 1$ abbiamo $f(x) = (1 - x) + (x + 1) = 2$, mentre $f(x) = -2x > 2$ per $x < -1$ e $f(x) = 2x > 2$ per $x > 1$. Il problema ha **infinite** soluzioni ottime (il segmento blu) e il valore ottimo è:

   $$\arg\min \{\, |x - 1| + |x + 1| \;\text{ soggetto a }\; -3 \leq x \leq 2 \,\} = [-1, 1] \quad \text{e} \quad z(P) = 2.$$

   - Per la forma di massimo, confrontiamo i tre tratti: per $-3 \leq x \leq -1$ abbiamo $f(x) = -2x \leq 6$, con l'uguaglianza solo per $x = -3$; per $-1 \leq x \leq 1$ abbiamo $f(x) = 2$; per $1 \leq x \leq 2$ abbiamo $f(x) = 2x \leq 4$. L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

   $$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (-3) \quad \text{e} \quad z(P) = 6.$$

Esercizio 5.4 — Problema di ottimizzazione ($E4$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto x^2 - 4x + 5 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \,\} = [0, +\infty).$$

Domande


1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.

2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme, oppure spiegare perché non esistono.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ x^2 - 4x + 5 \quad \text{soggetto a } x \geq 0 \right\}$$
$$\max \left\{ x^2 - 4x + 5 \quad \text{soggetto a } x \geq 0 \right\}$$

2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. La regione ammissibile è una semiretta: il grafico prosegue verso l'alto a destra della figura.



3. Completando il quadrato, la funzione obiettivo si può scrivere come
$$f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1.$$
   - Per la forma di minimo, poiché $(x-2)^2 \geq 0$, abbiamo $f(x) \geq 1 = f(2)$ per ogni x ammissibile, con l'uguaglianza solo per $x = 2$. L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:
   $$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (2) \quad \text{e} \quad z(P) = 1.$$
   - Per la forma di massimo, la funzione obiettivo cresce indefinitamente: per ogni valore $M \geq 0$, il punto $x = M + 3$ è ammissibile e
   $$f(M+3) = (M+1)^2 + 1 > M.$$

Quindi nessuna soluzione ammissibile può essere ottima: il problema è **illimitato** e

$$z(P) = +\infty.$$

Esercizio 5.5 — Problema di ottimizzazione ($E5$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto x^2 + 1 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : x \geq 3,\ x^2 \leq 4 \,\}.$$

Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare sull'asse x l'insieme dei punti che soddisfano ciascun vincolo.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme, oppure spiegare perché non esistono.


Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:

$$\min \left\{ x^2 + 1 \ \text{ soggetto a } x \geq 3,\ x^2 \leq 4 \right\}$$

$$\max \left\{ x^2 + 1 \ \text{ soggetto a } x \geq 3,\ x^2 \leq 4 \right\}$$

2. Il vincolo $x^2 \leq 4$ è soddisfatto esattamente dai punti dell'intervallo $[-2, 2]$ (viola), poiché $x^2 \leq 4$ se e solo se $|x| \leq 2$. Il vincolo $x \geq 3$ è soddisfatto dai punti della semiretta $[3, +\infty)$ (arancione). I due insiemi non hanno punti in comune.



3. Ogni punto con $x \geq 3$ ha $x^2 \geq 9 > 4$, quindi viola il secondo vincolo: nessun punto soddisfa entrambi i vincoli e la regione ammissibile è vuota,

$$F = \{\, x \in \mathbb{R} : x \geq 3 \,\} \cap [-2, 2] = \emptyset.$$

Sia la forma di minimo sia la forma di massimo sono **inammissibili**: non hanno soluzioni ammissibili, quindi nemmeno soluzioni ottime, e $z(P)$ non è definito. La funzione obiettivo non ha alcun ruolo: lo stesso vale per ogni funzione obiettivo con questa regione ammissibile.

Esercizio 5.6 — Problema di ottimizzazione ($E6$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:


$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto x^2 - 2x + 2 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1 \,\} = [-1, 1).$$

Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme, oppure spiegare perché non esistono.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ x^2 - 2x + 2 \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x < 1 \right\}$$
$$\max \left\{ x^2 - 2x + 2 \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x < 1 \right\}$$
2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Il punto $x = 1$ non appartiene alla regione ammissibile (cerchi vuoti).



3. Completando il quadrato, la funzione obiettivo si può scrivere come

$$f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1.$$

- Per la forma di minimo, poiché $x \neq 1$ per ogni x ammissibile, abbiamo $f(x) = (x-1)^2 + 1 > 1$; d'altra parte, i valori di f si avvicinano a 1 quanto vogliamo: per esempio $f\left(1 - \frac{1}{k}\right) = 1 + \frac{1}{k^2}$ per ogni intero $k \geq 1$. L'estremo inferiore di f su F è 1, ma nessuna soluzione ammissibile è ottima: per ogni $x \in F$, il punto $\frac{x+1}{2}$ è ammissibile (si trova tra x e 1) e

$$f\left(\frac{x+1}{2}\right) = \left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{(x-1)^2}{4} + 1 < (x-1)^2 + 1 = f(x).$$

  Il problema ha un **estremo inferiore non raggiunto**: non esiste una soluzione ottima e $z(P)$ non è definito.

- Per la forma di massimo, per ogni x ammissibile abbiamo $-2 \leq x-1 < 0$ e quindi $(x-1)^2 \leq 4$, con l'uguaglianza solo per $x = -1$. Quindi $f(x) \leq 5 = f(-1)$ e l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (-1) \quad \text{e} \quad z(P) = 5.$$

Esercizio 5.7 — Problema di ottimizzazione ($E7$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto x^3 - 3x^2 - 9x + 5 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 5 \,\} = [-2, 5].$$


Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.
4. Dimostrare che $x = -2$ è un punto di minimo locale di f in F, ma non un punto di minimo (globale).

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ x^3 - 3x^2 - 9x + 5 \;\text{ soggetto a }\; -2 \leq x \leq 5 \right\}$$
$$\max \left\{ x^3 - 3x^2 - 9x + 5 \;\text{ soggetto a }\; -2 \leq x \leq 5 \right\}$$

2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Il punto di minimo locale che non è un punto di minimo globale è viola. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura.



3. Confrontiamo f con i valori ottimi candidati usando le seguenti fattorizzazioni, che si verificano sviluppando i prodotti:
$$f(x) + 22 = x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = (x-3)^2\,(x+3),$$
$$f(x) - 10 = x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = (x+1)^2\,(x-5).$$

- Per la forma di minimo, per ogni x ammissibile abbiamo $x+3 \geq 1 > 0$ e $(x-3)^2 \geq 0$, quindi $f(x)+22 \geq 0$, cioè $f(x) \geq -22 = f(3)$, con l'uguaglianza solo per $x=3$. L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (3) \quad \text{e} \quad z(P) = -22.$$

- Per la forma di massimo, per ogni x ammissibile abbiamo $x-5 \leq 0$ e $(x+1)^2 \geq 0$, quindi $f(x)-10 \leq 0$, cioè $f(x) \leq 10$, con l'uguaglianza solo per $x=-1$ e $x=5$. Il problema ha **due** soluzioni ottime e il valore ottimo è:

$$\arg\max \left\{ x^3 - 3x^2 - 9x + 5 \;\text{ soggetto a }\; -2 \leq x \leq 5 \right\} = \{-1, 5\}$$

e

$$z(P) = 10.$$

4. Abbiamo $f(-2) = -8 - 12 + 18 + 5 = 3$ e

$$f(x) - 3 = x^3 - 3x^2 - 9x + 2 = (x+2)\,(x^2 - 5x + 1).$$

Per l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((-2), 1\big)$ abbiamo $N\big((-2), 1\big) \cap [-2, 5] = [-2, -1)$. Per ogni $x \in [-2, -1)$ abbiamo $x+2 \geq 0$ e, poiché $x^2 \geq 1$ e $-5x > 5$, $x^2 - 5x + 1 > 7 > 0$. Quindi

$$f(-2) = 3 \;\leq\; f(x), \qquad \forall x \in N\big((-2), 1\big) \cap [-2, 5] = [-2, -1),$$

e $x = -2$ è un punto di minimo locale di f in F, con minimo locale 3. Non è un punto di minimo (globale), poiché $f(3) = -22 < 3 = f(-2)$: un metodo di ottimizzazione che guardasse solo i punti vicini a $x = -2$ non troverebbe la soluzione ottima della forma di minimo.

Esercizio 5.8 — Problema di ottimizzazione ($E8$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo di due variabili e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \;\; f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto (x_1 - x_2)^2$$

e

$$F = \{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 2, \;\; 0 \leq x_2 \leq 2 \,\} = [0, 2] \times [0, 2].$$

Domande


1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare la regione ammissibile e le curve di livello della funzione obiettivo di valore 0, 1 e 4.

3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.

Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:
$$\min \left\{ (x_1 - x_2)^2 \ \text{ soggetto a } 0 \le x_1 \le 2,\ 0 \le x_2 \le 2 \right\}$$
$$\max \left\{ (x_1 - x_2)^2 \ \text{ soggetto a } 0 \le x_1 \le 2,\ 0 \le x_2 \le 2 \right\}$$

2. La regione ammissibile è il quadrato rosso. Poiché $f(\boldsymbol{x}) = c$ se e solo se $x_1 - x_2 = \sqrt{c}$ oppure $x_1 - x_2 = -\sqrt{c}$, le curve di livello sono rette parallele alla retta $x_1 = x_2$: la curva di livello di valore 0 è la retta $x_1 = x_2$, quella di valore 1 è formata dalle due rette $x_1 - x_2 = \pm 1$ (tratteggiate) e quella di valore 4 è formata dalle due rette $x_1 - x_2 = \pm 2$, che toccano il quadrato solo nei vertici $(2, 0)$ e $(0, 2)$. Le soluzioni ottime sono blu.



3. La regione ammissibile è il quadrato $F = [0, 2] \times [0, 2]$.

   - Per la forma di minimo, $f(\boldsymbol{x}) = (x_1 - x_2)^2 \ge 0$ per ogni $\boldsymbol{x}$ ammissibile, con l'uguaglianza esattamente quando $x_1 = x_2$. Il problema ha **infinite** soluzioni ottime (la diagonale blu del quadrato) e il valore ottimo è:
$$\arg\min \left\{ (x_1 - x_2)^2 \ \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} : 0 \le t \le 2 \right\} \quad \text{e} \quad z(P) = 0.$$

- Per la forma di massimo, per ogni $\boldsymbol{x}$ ammissibile abbiamo $0 \leq x_1 \leq 2$ e $-2 \leq -x_2 \leq 0$, quindi $-2 \leq x_1 - x_2 \leq 2$ e $f(\boldsymbol{x}) \leq 4$. L'uguaglianza $x_1 - x_2 = 2$ vale solo per $x_1 = 2$ e $x_2 = 0$, e $x_1 - x_2 = -2$ solo per $x_1 = 0$ e $x_2 = 2$. Il problema ha **due** soluzioni ottime e il valore ottimo è:

$$\arg\max \left\{ (x_1 - x_2)^2 \ \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{e} \quad z(P) = 4.$$

Esercizio 5.9 — Problema di ottimizzazione ($E9$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo lineare e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto x - 1 \qquad \text{e} \qquad F = \{ x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 3 \} = [0, 3).$$

Domande

1. Scrivere i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo.
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Trovare tutte le soluzioni ottime e il valore ottimo per entrambe le forme.


Soluzione

1. I problemi di ottimizzazione associati, in forma di minimo e in forma di massimo, sono:

$$\min \left\{ x - 1 \ \text{ soggetto a } 0 \leq x < 3 \right\}$$

$$\max \left\{ x - 1 \ \text{ soggetto a } 0 \leq x < 3 \right\}$$

2. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso; la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e le soluzioni ottime sono indicate in blu. Il punto $x = 3$ non appartiene alla regione ammissibile: i cerchi vuoti indicano l'estremo escluso della regione ammissibile e del grafico.



3. La regione ammissibile è l'intervallo $F = [0, 3)$, che contiene 0 ma non 3, e la funzione lineare f è strettamente crescente.

   - Per la forma di minimo, poiché per ogni x ammissibile abbiamo $x \geq 0$ e quindi $f(x) = x - 1 \geq -1 = f(0)$, l'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

   $$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (0) \quad \text{e} \quad z(P) = -1.$$

   - Per la forma di massimo, per ogni x ammissibile abbiamo $x < 3$ e quindi $f(x) = x - 1 < 2$; inoltre, per ogni x ammissibile il punto $\frac{x+3}{2}$ è ammissibile e

   $$f\Big(\frac{x+3}{2}\Big) = \frac{x+1}{2} > x - 1 = f(x),$$

   quindi nessun punto ammissibile è ottimo, mentre $f(x)$ si avvicina a 2 quanto vogliamo quando x si avvicina a 3. Il problema ha un **estremo superiore non raggiunto**: $\sup\{\, f(x) : x \in F \,\} = 2$ non è raggiunto, non esiste una soluzione ottima e

   $$\arg\max \big\{\, x - 1 \;\; \text{soggetto a } 0 \leq x < 3 \,\big\} = \emptyset \quad \text{e} \quad z(P) \text{ non è definito.}$$

Esercizio 5.10 — Problema di ottimizzazione ($E10$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [-1, 4] \to \mathbb{R}, \;\; f : x \mapsto 2 + 9x - 6x^2 + x^3.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (3) è un punto di minimo locale di f in $[-1, 4]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (1) è un punto di massimo locale di f in $[-1, 4]$.
3. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[-1, 4]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x) \text{ soggetto a } -1 \leq x \leq 4 \,\}$ e $\max\{\, f(x) \text{ soggetto a } -1 \leq x \leq 4 \,\}$.
4. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Abbiamo $f(3) = 2 + 27 - 54 + 27 = 2$ e

$$f(x) - f(3) = x^3 - 6x^2 + 9x = x\,(x-3)^2.$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((3), \frac{1}{2}\big)$, per il quale $N\big((3), \frac{1}{2}\big) \cap [-1, 4] = \big(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\big)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x > 0$ e $(x-3)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(3) \geq 0$. Quindi,

$$f(3) = 2 \;\leq\; f(x), \qquad \forall x \in N\Big((3), \frac{1}{2}\Big) \cap [-1, 4] = \Big(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\Big),$$

e $x = 3$ è un punto di minimo locale di f in $[-1, 4]$, con minimo locale 2.

2. Abbiamo $f(1) = 2 + 9 - 6 + 1 = 6$ e

$$f(x) - f(1) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = (x-4)\,(x-1)^2.$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((1), \frac{1}{2}\big)$, per il quale $N\big((1), \frac{1}{2}\big) \cap [-1, 4] = \big(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\big)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x - 4 < 0$ e $(x-1)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(1) \leq 0$. Quindi,

$$f(1) = 6 \;\geq\; f(x), \qquad \forall x \in N\Big((1), \frac{1}{2}\Big) \cap [-1, 4] = \Big(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\Big),$$

e $x = 1$ è un punto di massimo locale di f in $[-1, 4]$, con massimo locale 6.

3. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.

- **Minimo.** Abbiamo $f(-1) = 2 - 9 - 6 - 1 = -14$ e

$$f(x)+14 = x^3 - 6x^2 + 9x + 16 = (x+1)\,(x^2 - 7x + 16) = (x+1)\left(\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}\right).$$


Per ogni $x \in [-1, 4]$ abbiamo $x + 1 \geq 0$, e il secondo fattore è positivo, quindi $f(x) \geq -14 = f(-1)$, con l'uguaglianza solo per $x = -1$. L'unico punto di minimo è $x = -1$ e il minimo è -14. Il punto di minimo locale $x = 3$ non è un punto di minimo (globale), poiché $f(-1) = -14 < 2 = f(3)$.

- **Massimo.** La fattorizzazione della seconda domanda vale per ogni x: per ogni $x \in [-1, 4]$ abbiamo $x - 4 \leq 0$, quindi $f(x) - 6 = (x-4)(x-1)^2 \leq 0$, con l'uguaglianza solo per $x = 1$ e $x = 4$. La funzione ha **due** punti di massimo e il massimo è 6:

$$\arg\max \{\, f(x) \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 4 \,\} = \{1, 4\}.$$

  Il punto di massimo locale $x = 1$ è anche un punto di massimo (globale).

4. Il grafico della funzione è rosso; il dominio è la parte rossa dell'asse x, i punti di minimo e di massimo (globale) sono blu e i punti di minimo o di massimo locale che non sono globali sono viola. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura.



Esercizio 5.11 — Problema di ottimizzazione ($E11$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [0, 4] \to \mathbb{R}, \ \ f : x \mapsto 5 + 54x - 2x^3.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (3) è un punto di massimo locale di f in $[0, 4]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (4) è un punto di minimo locale di f in $[0, 4]$.

3. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[0,4]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x) \text{ soggetto a } 0 \le x \le 4 \,\}$ e $\max\{\, f(x) \text{ soggetto a } 0 \le x \le 4 \,\}$.

4. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Abbiamo $f(3) = 5 + 162 - 54 = 113$ e

$$f(3) - f(x) = 2x^3 - 54x + 108 = 2\,(x-3)^2\,(x+6).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((3),1\big)$, per il quale $N\big((3),1\big) \cap [0,4] = (2,4)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x + 6 > 0$ e $(x-3)^2 \ge 0$, per cui $f(3) - f(x) \ge 0$. Quindi,

$$f(3) = 113 \;\ge\; f(x), \qquad \forall x \in N\big((3),1\big) \cap [0,4] = (2,4),$$

e $x = 3$ è un punto di massimo locale di f in $[0,4]$, con massimo locale 113.

2. Abbiamo $f(4) = 5 + 216 - 128 = 93$ e

$$f(x) - f(4) = -2x^3 + 54x - 88 = -2\,(x-4)\,(x^2 + 4x - 11).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((4),\tfrac{1}{2}\big)$, per il quale $N\big((4),\tfrac{1}{2}\big) \cap [0,4] = \big(\tfrac{7}{2},4\big]$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x - 4 \le 0$ e, poiché $x > \tfrac{7}{2}$,

$$x^2 + 4x - 11 > \frac{49}{4} + 14 - 11 = \frac{61}{4} > 0,$$

quindi $f(x) - f(4) = -2\,(x-4)\,(x^2 + 4x - 11) \ge 0$. Quindi,

$$f(4) = 93 \;\le\; f(x), \qquad \forall x \in N\Big((4),\frac{1}{2}\Big) \cap [0,4] = \Big(\frac{7}{2},4\Big],$$

e $x = 4$ è un punto di minimo locale di f in $[0,4]$, con minimo locale 93.


3. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.

- **Massimo.** La fattorizzazione della prima domanda vale per ogni x: per ogni $x \in [0,4]$ abbiamo $x + 6 > 0$, quindi $f(3) - f(x) = 2(x-3)^2(x+6) \ge 0$, con l'uguaglianza solo per $x = 3$. L'unico punto di massimo è $x = 3$ e il massimo è 113: il punto di massimo locale è anche un punto di massimo (globale).
- **Minimo.** Abbiamo $f(0) = 5$ e

$$f(x) - 5 = 54x - 2x^3 = 2x\,(27 - x^2).$$

Per ogni $x \in [0,4]$ abbiamo $x \ge 0$ e $x^2 \le 16 < 27$, quindi $f(x) \ge 5 = f(0)$, con l'uguaglianza solo per $x = 0$. L'unico punto di minimo è $x = 0$ e il minimo è 5. Il punto di minimo locale $x = 4$ non è un punto di minimo (globale), poiché $f(0) = 5 < 93 = f(4)$.

4. Il grafico della funzione è rosso; il dominio è la parte rossa dell'asse x, i punti di minimo e di massimo (globale) sono blu e i punti di minimo o di massimo locale che non sono globali sono viola.



Esercizio 5.12 — Problema di ottimizzazione ($E12$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [-2, 3] \to \mathbb{R}, \;\; f : x \mapsto 1 - 12x - 3x^2 + 2x^3.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (-1) è un punto di massimo locale di f in $[-2, 3]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (2) è un punto di minimo locale di f in $[-2, 3]$.
3. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[-2, 3]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x)$ soggetto a $-2 \leq x \leq 3 \,\}$ e $\max\{\, f(x)$ soggetto a $-2 \leq x \leq 3 \,\}$.
4. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Abbiamo $f(-1) = 1 + 12 - 3 - 2 = 8$ e

$$f(x) - f(-1) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 7 = (x+1)^2(2x-7).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((-1),1\big)$, per il quale $N\big((-1),1\big) \cap [-2,3] = (-2,0)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $2x - 7 < 0$ e $(x+1)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(-1) \leq 0$. Quindi,

$$f(-1) = 8 \ \geq \ f(x), \qquad \forall x \in N\big((-1),1\big) \cap [-2,3] = (-2,0),$$

e $x = -1$ è un punto di massimo locale di f in $[-2,3]$, con massimo locale 8.

2. Abbiamo $f(2) = 1 - 24 - 12 + 16 = -19$ e

$$f(x) - f(2) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20 = (x-2)^2(2x+5).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((2),1\big)$, per il quale $N\big((2),1\big) \cap [-2,3] = (1,3)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $2x + 5 > 0$ e $(x-2)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(2) \geq 0$. Quindi,

$$f(2) = -19 \ \leq \ f(x), \qquad \forall x \in N\big((2),1\big) \cap [-2,3] = (1,3),$$


e $x = 2$ è un punto di minimo locale di f in $[-2,3]$, con minimo locale -19.

3. Le due fattorizzazioni valgono per ogni x, e ogni $x \in [-2,3]$ soddisfa $2x - 7 \leq -1 < 0$ e $2x + 5 \geq 1 > 0$. Allora, per ogni $x \in [-2,3]$,

$$f(x) - 8 = (x+1)^2(2x-7) \leq 0 \qquad \text{e} \qquad f(x) + 19 = (x-2)^2(2x+5) \geq 0,$$

con l'uguaglianza, rispettivamente, solo per $x = -1$ e solo per $x = 2$. L'unico punto di massimo è $x = -1$, con massimo 8, e l'unico punto di minimo è $x = 2$, con minimo -19: entrambi i punti delle prime due domande sono ottimi globali.

4. Il grafico della funzione è rosso; il dominio è la parte rossa dell'asse x, i punti di minimo e di massimo (globale) sono blu e i punti di minimo o di massimo locale che non sono globali sono viola. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura. Negli estremi abbiamo $f(-2) = -3$ e $f(3) = -8$.



Esercizio 5.13 — Problema di ottimizzazione ($E13$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [-2, 3] \to \mathbb{R}, \;\; f : x \mapsto 3 - 2x^2 + x^4.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (-1) è un punto di minimo locale di f in $[-2, 3]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (0) è un punto di massimo locale di f in $[-2, 3]$.
3. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (1) è un punto di minimo locale di f in $[-2, 3]$.
4. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[-2, 3]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x) \text{ soggetto a } -2 \leq x \leq 3 \,\}$ e $\max\{\, f(x) \text{ soggetto a } -2 \leq x \leq 3 \,\}$.
5. Disegnare il grafico della funzione nell'intervallo $[-2, 2]$.

Soluzione

1. Abbiamo $f(-1) = 3 - 2 + 1 = 2$ e

$$f(x) - f(-1) = x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 \geq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

In particolare, per l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((-1),\frac{1}{2}\big)$ abbiamo

$$f(-1)=2 \;\leq\; f(x), \qquad \forall x\in N\Big((-1),\frac{1}{2}\Big)\cap[-2,3]=\Big(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\Big),$$

e $x=-1$ è un punto di minimo locale di f in $[-2,3]$, con minimo locale 2.

2. Abbiamo $f(0)=3$ e

$$f(x)-f(0)=x^4-2x^2=x^2\,(x^2-2).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((0),\frac{1}{2}\big)$, per il quale $N\big((0),\frac{1}{2}\big)\cap[-2,3]=\big(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\big)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x^2<\frac{1}{4}<2$, per cui $f(x)-f(0)\leq 0$. Quindi,

$$f(0)=3 \;\geq\; f(x), \qquad \forall x\in N\Big((0),\frac{1}{2}\Big)\cap[-2,3]=\Big(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\Big),$$

e $x=0$ è un punto di massimo locale di f in $[-2,3]$, con massimo locale 3.

3. Abbiamo $f(1)=2$ e, come nella prima domanda, $f(x)-f(1)=(x^2-1)^2\geq 0$ per ogni $x\in\mathbb{R}$. In particolare,


$$f(1)=2 \;\leq\; f(x), \qquad \forall x\in N\Big((1),\frac{1}{2}\Big)\cap[-2,3]=\Big(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\Big),$$

e $x=1$ è un punto di minimo locale di f in $[-2,3]$, con minimo locale 2.

4. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.

   - **Minimo.** Per ogni $x\in[-2,3]$ abbiamo $f(x)-2=(x^2-1)^2\geq 0$, con l'uguaglianza solo per $x=-1$ e $x=1$. La funzione ha **due** punti di minimo e il minimo è 2:
   $$\arg\min\big\{\, f(x) \;\text{ soggetto a }\; -2\leq x\leq 3\,\big\}=\{-1,\,1\}.$$
   - **Massimo.** Abbiamo $f(3)=3-18+81=66$ e
   $$66-f(x)=63+2x^2-x^4=(9-x^2)\,(x^2+7).$$
   Per ogni $x\in[-2,3]$ abbiamo $x^2\leq 9$, quindi $f(x)\leq 66=f(3)$, con l'uguaglianza solo per $x=3$ (il valore $x=-3$ non appartiene al dominio). L'unico punto di massimo è $x=3$ e il massimo è 66. Il punto di massimo locale $x=0$ non è un punto di massimo (globale), poiché $f(0)=3<66=f(3)$.

5. Il grafico della funzione nell'intervallo $[-2,2]$ è rosso e l'intervallo $[-2,2]$, che è una parte del dominio, è la parte rossa dell'asse x; i punti di minimo (globale) sono blu e il punto di massimo locale che non è globale è viola. Il punto di massimo $x=3$, con $f(3)=66$, è fuori dalla figura.



Esercizio 5.14 — Problema di ottimizzazione ($E14$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [0,5] \to \mathbb{R}, \;\; f : x \mapsto x^3 - 9x^2 + 24x - 10.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (2) è un punto di massimo locale di f in $[0,5]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (4) è un punto di minimo locale di f in $[0,5]$.
3. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[0,5]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x)$ soggetto a $0 \leq x \leq 5 \,\}$ e $\max\{\, f(x)$ soggetto a $0 \leq x \leq 5 \,\}$.
4. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Abbiamo $f(2) = 8 - 36 + 48 - 10 = 10$ e

$$f(x) - f(2) = x^3 - 9x^2 + 24x - 20 = (x-2)^2\,(x-5).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((2),1\big)$, per il quale $N\big((2),1\big) \cap [0,5] = (1,3)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x - 5 < 0$ e $(x-2)^2 \geq 0$, per cui

$f(x) - f(2) \leq 0$. Quindi,

$$f(2) = 10 \ \geq \ f(x), \qquad \forall x \in N\big((2), 1\big) \cap [0, 5] = (1, 3),$$

e $x = 2$ è un punto di massimo locale di f in $[0, 5]$, con massimo locale 10.

2. Abbiamo $f(4) = 64 - 144 + 96 - 10 = 6$ e

$$f(x) - f(4) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16 = (x - 4)^2 (x - 1).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((4), 1\big)$, per il quale $N\big((4), 1\big) \cap [0, 5] = (3, 5)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $x - 1 > 0$ e $(x - 4)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(4) \geq 0$. Quindi,

$$f(4) = 6 \ \leq \ f(x), \qquad \forall x \in N\big((4), 1\big) \cap [0, 5] = (3, 5),$$

e $x = 4$ è un punto di minimo locale di f in $[0, 5]$, con minimo locale 6.

3. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.

   - **Massimo.** La fattorizzazione della prima domanda vale per ogni x: per ogni $x \in [0, 5]$ abbiamo $x - 5 \leq 0$, quindi $f(x) - 10 = (x - 2)^2(x - 5) \leq 0$, con l'uguaglianza solo per $x = 2$ e $x = 5$. La funzione ha **due** punti di massimo e il massimo è 10:


     $$\arg\max \big\{ f(x) \ \text{ soggetto a } 0 \leq x \leq 5 \big\} = \{2, 5\}.$$

     Il punto di massimo locale $x = 2$ è anche un punto di massimo (globale).
   - **Minimo.** Abbiamo $f(0) = -10$ e

     $$f(x) + 10 = x^3 - 9x^2 + 24x = x\,(x^2 - 9x + 24) = x\left(\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}\right).$$

     Per ogni $x \in [0, 5]$ abbiamo $x \geq 0$, e il secondo fattore è positivo, quindi $f(x) \geq -10 = f(0)$, con l'uguaglianza solo per $x = 0$. L'unico punto di minimo è $x = 0$ e il minimo è -10. Il punto di minimo locale $x = 4$ non è un punto di minimo (globale), poiché $f(0) = -10 < 6 = f(4)$.

4. Il grafico della funzione è rosso; il dominio è la parte rossa dell'asse x, i punti di minimo e di massimo (globale) sono blu e i punti di minimo o di massimo locale che non sono globali sono viola. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura.



Esercizio 5.15 — Problema di ottimizzazione ($E15$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : [-1, 3] \to \mathbb{R}, \;\; f : x \mapsto 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5.$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (-1) è un punto di massimo locale di f in $[-1, 3]$.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto (2) è un punto di minimo locale di f in $[-1, 3]$.
3. Trovare tutti i punti di minimo e di massimo (globale) di f in $[-1, 3]$, cioè le soluzioni ottime dei problemi di ottimizzazione $\min\{\, f(x) \text{ soggetto a } -1 \leq x \leq 3 \,\}$ e $\max\{\, f(x) \text{ soggetto a } -1 \leq x \leq 3 \,\}$.
4. Disegnare il grafico della funzione.

Soluzione

1. Abbiamo $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 5 = 12$ e

$$f(x) - f(-1) = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 7 = (x+1)^2 (2x - 7).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((-1), \frac{1}{2}\big) = \big(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\big)$. Il punto $x = -1$ è l'estremo sinistro del dominio, quindi si considerano solo i punti alla sua destra: $N\big((-1), \frac{1}{2}\big) \cap [-1, 3] = \big[-1, -\frac{1}{2}\big)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo

$2x - 7 < 0$ e $(x+1)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(-1) \leq 0$. Quindi,

$$f(-1) = 12 \;\geq\; f(x), \qquad \forall x \in N\Big((-1), \frac{1}{2}\Big) \cap [-1, 3] = \Big[-1, -\frac{1}{2}\Big),$$

e $x = -1$ è un punto di massimo locale di f in $[-1, 3]$, con massimo locale 12.

2. Abbiamo $f(2) = 16 - 12 - 24 + 5 = -15$ e

$$f(x) - f(2) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20 = (x-2)^2 (2x+5).$$

Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\big((2), \frac{1}{2}\big)$, per il quale $N\big((2), \frac{1}{2}\big) \cap [-1, 3] = \big(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\big)$. Per ogni x in questo intervallo abbiamo $2x + 5 > 0$ e $(x-2)^2 \geq 0$, per cui $f(x) - f(2) \geq 0$. Quindi,

$$f(2) = -15 \;\leq\; f(x), \qquad \forall x \in N\Big((2), \frac{1}{2}\Big) \cap [-1, 3] = \Big(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\Big),$$


e $x = 2$ è un punto di minimo locale di f in $[-1, 3]$, con minimo locale -15.

3. Le due fattorizzazioni valgono per ogni x, e ogni $x \in [-1, 3]$ soddisfa $2x - 7 \leq -1 < 0$ e $2x + 5 \geq 3 > 0$. Allora, per ogni $x \in [-1, 3]$,

$$f(x) - 12 = (x+1)^2 (2x-7) \leq 0 \qquad \text{e} \qquad f(x) + 15 = (x-2)^2 (2x+5) \geq 0,$$

con l'uguaglianza, rispettivamente, solo per $x = -1$ e solo per $x = 2$. L'unico punto di massimo è $x = -1$, con massimo 12, e l'unico punto di minimo è $x = 2$, con minimo -15: entrambi i punti delle prime due domande sono ottimi globali.

4. Il grafico della funzione è rosso; il dominio è la parte rossa dell'asse x, i punti di minimo e di massimo (globale) sono blu e i punti di minimo o di massimo locale che non sono globali sono viola. Poiché f assume valori negativi, l'asse x è disegnato in basso nella figura. Nell'estremo destro abbiamo $f(3) = -4$.



Esercizio 5.16 — Problema di ottimizzazione ($E16$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 + x_2, \qquad \text{con} \qquad D = [-2, 2] \times [-2, 2].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di minimo di f in D.
2. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di massimo di f in D.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$ abbiamo $x_1 \geq -2$ e $x_2 \geq -2$. Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 + x_2 \geq -2 + (-2) = -4 = f\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}\right),$$

con l'uguaglianza solo per $x_1 = x_2 = -2$. Di conseguenza,

$$f\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}\right) \leq f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D,$$


e $\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di minimo di f in D, con minimo -4.

2. Per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$ abbiamo $x_1 \leq 2$ e $x_2 \leq 2$. Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 + x_2 \leq 2 + 2 = 4 = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right),$$

con l'uguaglianza solo per $x_1 = x_2 = 2$, e $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di massimo di f in D, con massimo 4.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti al punto di minimo e al punto di massimo sono blu, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.17 — Problema di ottimizzazione ($E17$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + 1, \qquad \text{con} \qquad D = [-4, 4] \times [-4, 4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è anche l'unico punto di minimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di massimo di f in D.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = 1$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, 1\right)$: per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ in esso,

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 \geq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) \leq f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}, 1\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D, con minimo locale 1.

2. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.


   - **Minimo.** La disuguaglianza $f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) = (x_1-2)^2 + (x_2-2)^2 \geq 0$ vale per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$, non solo nell'intorno, con l'uguaglianza solo per $x_1 = x_2 = 2$. Il punto $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ è l'unico punto di minimo di f in D e il minimo è 1.

   - **Massimo.** Per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$ abbiamo $-6 \leq x_1 - 2 \leq 2$ e $-6 \leq x_2 - 2 \leq 2$, quindi $(x_1-2)^2 \leq 36$ e $(x_2-2)^2 \leq 36$, con l'uguaglianza, rispettivamente, solo per $x_1 = -4$ e solo per $x_2 = -4$. Quindi,

   $$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) \leq 36 + 36 + 1 = 73 = f\left(\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}\right),$$

   e $\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$ è l'unico punto di massimo di f in D, con massimo 73.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti al punto di minimo e al punto di massimo sono blu, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.18 — Problema di ottimizzazione ($E18$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 + 2 - \frac{1}{10}(x_1^4 + x_2^4), \qquad \text{con} \qquad D = [-4, 4] \times [-4, 4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di minimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 2$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 2\right)$: per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ in esso abbiamo $x_1^2 \le x_1^2 + x_2^2 < 4$ e $x_2^2 < 4$, da cui

$$1 - \frac{x_1^2}{10} > 1 - \frac{4}{10} = \frac{3}{5} > 0 \qquad \text{e} \qquad 1 - \frac{x_2^2}{10} > \frac{3}{5} > 0,$$

e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = x_1^2\left(1 - \frac{x_1^2}{10}\right) + x_2^2\left(1 - \frac{x_2^2}{10}\right) \ge 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \le f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 2\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D, con minimo locale 2.

2. Scriviamo f come somma di due funzioni di una variabile:

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = 2 + g(x_1) + g(x_2), \qquad \text{con} \qquad g(t) = t^2 - \frac{t^4}{10}.$$

Abbiamo $g(4) = 16 - \frac{256}{10} = -\frac{48}{5}$ e

$$g(t) + \frac{48}{5} = \frac{-t^4 + 10t^2 + 96}{10} = \frac{(16 - t^2)\,(t^2 + 6)}{10}.$$

Per ogni $t \in [-4, 4]$ abbiamo $t^2 \leq 16$, quindi $g(t) \geq -\frac{48}{5}$, con l'uguaglianza solo per $t = -4$ e $t = 4$. Quindi, per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$,


$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) \geq 2 - \frac{48}{5} - \frac{48}{5} = -\frac{86}{5},$$

con l'uguaglianza solo quando sia x_1 sia x_2 valgono -4 oppure 4. La funzione ha **quattro** punti di minimo, i vertici di D, e il minimo è $-\frac{86}{5}$:

$$\arg\min \left\{ f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Il punto di minimo locale $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale), poiché $-\frac{86}{5} < 2$.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai quattro punti di minimo sono blu e il punto corrispondente al punto di minimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.19 — Problema di ottimizzazione ($E19$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2} x_1^2 x_2^2, \qquad \text{con} \qquad D = [-3, 3] \times [-3, 3].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di minimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = 0$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, 1\right)$: per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ in esso abbiamo $x_2^2 \le x_1^2 + x_2^2 < 1$, da cui $1 - \dfrac{x_2^2}{2} > \dfrac{1}{2}$, e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = x_1^2\left(1 - \frac{x_2^2}{2}\right) + x_2^2 \ge \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 \ge 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) \;\le\; f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, 1\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D, con minimo locale 0.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}\right) = 9 + 9 - \frac{81}{2} = -\frac{45}{2} < 0$, quindi $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale). Per trovare i punti di minimo, scriviamo

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = 2 - \frac{1}{2}\,u\,v, \qquad \text{con} \qquad u = x_1^2 - 2 \quad \text{e} \quad v = x_2^2 - 2.$$


Per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$ abbiamo $0 \le x_1^2 \le 9$ e $0 \le x_2^2 \le 9$, quindi $-2 \le u \le 7$ e $-2 \le v \le 7$. Allora:

- se $u \ge 0$ e $v \ge 0$, abbiamo $u\,v \le 7 \cdot 7 = 49$, con l'uguaglianza solo per $u = v = 7$;
- se u e v hanno segni opposti, abbiamo $u\,v \le 0$;
- se $u < 0$ e $v < 0$, abbiamo $u\,v = |u|\,|v| \le 2 \cdot 2 = 4$.

In tutti i casi $u\,v \le 49$, quindi $f(\boldsymbol{x}) \ge 2 - \frac{49}{2} = -\frac{45}{2}$, con l'uguaglianza solo per $x_1^2 = x_2^2 = 9$. La funzione ha **quattro** punti di minimo, i vertici di D, e il minimo è $-\frac{45}{2}$:

$$\arg\min\left\{\, f(\boldsymbol{x}) \;\text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\right\} = \left\{\begin{pmatrix}-3\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}\right\}.$$

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai quattro punti di minimo sono blu e il punto corrispondente al punto di minimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.20 — Problema di ottimizzazione ($E20$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 - x_1^3, \qquad \text{con} \qquad D = [-2, 4] \times [-2, 4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di minimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right)$:

per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ in esso abbiamo $|x_1| < \frac{1}{2}$, da cui $1 - x_1 > \frac{1}{2}$, e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = x_1^2(1 - x_1) + x_2^2 \geq \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 \geq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \leq f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right) \cap D,$$


e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D, con minimo locale 0.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 16 - 64 = -48 < 0$, quindi $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale). Inoltre,

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) + 48 = \left(48 + x_1^2 - x_1^3\right) + x_2^2 = (4 - x_1)\left(x_1^2 + 3x_1 + 12\right) + x_2^2,$$

dove $x_1^2 + 3x_1 + 12 = \left(x_1 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{39}{4} > 0$. Per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$ abbiamo $4 - x_1 \geq 0$, quindi $f(\boldsymbol{x}) \geq -48$, con l'uguaglianza solo per $x_1 = 4$ e $x_2 = 0$. Il punto $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ è l'unico punto di minimo di f in D e il minimo è -48.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; il punto del grafico corrispondente al punto di minimo è blu e il punto corrispondente al punto di minimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.21 — Problema di ottimizzazione ($E21$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 + 1 - x_1 x_2^2, \qquad \text{con} \qquad D = [-1, 5] \times [-3, 3].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di minimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 1$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right)$: per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ in esso abbiamo $|x_1| < \frac{1}{2}$, da cui $1 - x_1 > \frac{1}{2}$, e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 + x_2^2\,(1 - x_1) \geq x_1^2 + \frac{1}{2} x_2^2 \geq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \leq f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di minimo locale di f in D, con minimo locale 1.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 25 + 9 + 1 - 45 = -10 < 1$, quindi $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di minimo (globale). Per trovare i punti di minimo, verifichiamo sviluppando i prodotti che

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) + \frac{41}{4} = \left(x_1 - \frac{9}{2}\right)^2 + (x_1 - 1)\,(9 - x_2^2).$$

Per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$ abbiamo $0 \leq 9 - x_2^2 \leq 9$, e:


- se $x_1 \geq 1$, entrambi i termini sono non negativi, quindi $f(\boldsymbol{x}) + \frac{41}{4} \geq 0$, con l'uguaglianza solo per $x_1 = \frac{9}{2}$ e $x_2^2 = 9$;
- se $x_1 < 1$, abbiamo $x_1 - 1 < 0$ e quindi $(x_1 - 1)(9 - x_2^2) \geq 9\,(x_1 - 1)$, per cui

$$f(\boldsymbol{x}) + \frac{41}{4} \geq \left(x_1 - \frac{9}{2}\right)^2 + 9\,(x_1 - 1) = x_1^2 + \frac{45}{4} > 0.$$

La funzione ha **due** punti di minimo e il minimo è $-\frac{41}{4}$:

$$\arg\min \left\{ f(\boldsymbol{x}) \;\text{ soggetto a }\; \boldsymbol{x} \in D \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai due punti di minimo sono blu e il punto corrispondente al punto di minimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.22 — Problema di ottimizzazione ($E22$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\; f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto -(x_1 - 2)^2 - (x_2 - 2)^2 + 5, \qquad \text{con} \qquad D = [-4, 4] \times [-4, 4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D.

2. Dimostrare che $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ è anche l'unico punto di massimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di minimo di f in D.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) = 5$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}, 1\right)$: per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ in esso,

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) = -\left((x_1-2)^2 + (x_2-2)^2\right) \leq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) \geq f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}, 1\right) \cap D,$$


e $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D, con massimo locale 5.

2. Studiamo separatamente il minimo e il massimo.
   - **Massimo.** La disuguaglianza $f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) = -\left((x_1-2)^2+(x_2-2)^2\right) \leq 0$ vale per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$, non solo nell'intorno, con l'uguaglianza solo per $x_1 = x_2 = 2$. Il punto $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ è l'unico punto di massimo di f in D e il massimo è 5.
   - **Minimo.** Per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$ abbiamo $-6 \leq x_1 - 2 \leq 2$ e $-6 \leq x_2 - 2 \leq 2$, quindi $(x_1-2)^2 \leq 36$ e $(x_2-2)^2 \leq 36$, con l'uguaglianza, rispettivamente, solo per $x_1 = -4$ e solo per $x_2 = -4$. Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) \geq -36 - 36 + 5 = -67 = f\left(\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}\right),$$

     e $\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$ è l'unico punto di minimo di f in D, con minimo -67.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti al punto di massimo e al punto di minimo sono blu, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.23 — Problema di ottimizzazione ($E23$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \mapsto -x_1^2 - x_2^2 + 2 + \frac{1}{10}(x_1^4 + x_2^4), \qquad \text{con} \qquad D = [-4,4] \times [-4,4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di massimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = 2$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, 1\right)$: per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ in esso abbiamo $|x_1| < 1$ e $|x_2| < 1$, da cui $x_1^4 \le x_1^2$ e $x_2^4 \le x_2^2$, e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) \le 2 - (x_1^2 + x_2^2) + \frac{1}{10}(x_1^2 + x_2^2) = 2 - \frac{9}{10}(x_1^2 + x_2^2) \le 2 = f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right).$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) \geq f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, 1\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D, con massimo locale 2.

2. Scriviamo f come somma di due funzioni di una variabile:

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = 2 - g(x_1) - g(x_2), \qquad \text{con} \qquad g(t) = t^2 - \frac{t^4}{10}.$$

Abbiamo $g(4) = 16 - \frac{256}{10} = -\frac{48}{5}$ e

$$g(t) + \frac{48}{5} = \frac{-t^4 + 10t^2 + 96}{10} = \frac{(16 - t^2)\,(t^2 + 6)}{10}.$$

Per ogni $t \in [-4, 4]$ abbiamo $t^2 \leq 16$, quindi $g(t) \geq -\frac{48}{5}$, con l'uguaglianza solo per $t = -4$ e $t = 4$. Quindi, per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$,


$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) \leq 2 + \frac{48}{5} + \frac{48}{5} = \frac{106}{5},$$

con l'uguaglianza solo quando sia x_1 sia x_2 valgono -4 oppure 4. La funzione ha **quattro** punti di massimo, i vertici di D, e il massimo è $\frac{106}{5}$:

$$\arg\max \left\{ f(\boldsymbol{x}) \;\text{ soggetto a }\; \boldsymbol{x} \in D \right\} = \left\{ \begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix} \right\}.$$

Il punto di massimo locale $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale), poiché $2 < \frac{106}{5}$.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai quattro punti di massimo sono blu e il punto corrispondente al punto di massimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.24 — Problema di ottimizzazione ($E24$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto -x_1^2 - x_2^2 + \frac{1}{2}x_1^2 x_2^2, \qquad \text{con} \qquad D = [-4, 4] \times [-4, 4].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di massimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 1\right)$: per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ in esso abbiamo $x_2^2 \le x_1^2 + x_2^2 < 1$, da cui $1 - \frac{x_2^2}{2} > \frac{1}{2}$, e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = -x_2^2 - x_1^2\left(1 - \frac{x_2^2}{2}\right) \le -x_2^2 - \frac{1}{2}x_1^2 \le 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \ge f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 1\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D, con massimo locale 0.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = -16 - 16 + 128 = 96 > 0$, quindi $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale). Per trovare i punti di massimo, scriviamo

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}\,u\,v - 2, \qquad \text{con} \qquad u = x_1^2 - 2 \quad \text{e} \quad v = x_2^2 - 2.$$


Per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$ abbiamo $0 \le x_1^2 \le 16$ e $0 \le x_2^2 \le 16$, quindi $-2 \le u \le 14$ e $-2 \le v \le 14$. Allora:

- se $u \geq 0$ e $v \geq 0$, abbiamo $u\,v \leq 14 \cdot 14 = 196$, con l'uguaglianza solo per $u = v = 14$;
- se u e v hanno segni opposti, abbiamo $u\,v \leq 0$;
- se $u < 0$ e $v < 0$, abbiamo $u\,v = |u|\,|v| \leq 2 \cdot 2 = 4$.

In tutti i casi $u\,v \leq 196$, quindi $f(\boldsymbol{x}) \leq 98 - 2 = 96$, con l'uguaglianza solo per $x_1^2 = x_2^2 = 16$. La funzione ha **quattro** punti di massimo, i vertici di D, e il massimo è 96:

$$\arg\max \left\{ f(\boldsymbol{x}) \;\text{ soggetto a }\; \boldsymbol{x} \in D \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai quattro punti di massimo sono blu e il punto corrispondente al punto di massimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.25 — Problema di ottimizzazione ($E25$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\;\; f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto -x_1^2 - x_2^2 + x_1^3, \qquad \text{con} \qquad D = [-3, 3] \times [-3, 3].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D.

2. Dimostrare che $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di massimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = 0$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right)$: per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ in esso abbiamo $|x_1| < \frac{1}{2}$, da cui

$$x_1^3 = x_1 \cdot x_1^2 \leq |x_1|\, x_1^2 \leq \frac{1}{2}\, x_1^2,$$

e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = -x_1^2 - x_2^2 + x_1^3 \leq -x_1^2 - x_2^2 + \frac{1}{2}x_1^2 = -\frac{1}{2}x_1^2 - x_2^2 \leq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) \;\geq\; f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D, con massimo locale 0.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}\right) = -9 + 27 = 18 > 0$, quindi $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale). Inoltre, per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D$ abbiamo $-x_2^2 \leq 0$ e


$$18 - \left(x_1^3 - x_1^2\right) = (3 - x_1)\left(x_1^2 + 2x_1 + 6\right) = (3 - x_1)\left((x_1 + 1)^2 + 5\right) \geq 0,$$

poiché $x_1 \leq 3$. Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right) = \left(x_1^3 - x_1^2\right) - x_2^2 \leq 18,$$

con l'uguaglianza solo per $x_1 = 3$ e $x_2 = 0$. Il punto $\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ è l'unico punto di massimo di f in D e il massimo è 18.

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; il punto del grafico corrispondente al punto di massimo è blu e il punto corrispondente al punto di massimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.



Esercizio 5.26 — Problema di ottimizzazione ($E26$)

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : D \to \mathbb{R},\ f : \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \mapsto -x_1^2 - x_2^2 - 1 + x_1 x_2^2, \qquad \text{con} \qquad D = [-3,3] \times [-3,3].$$

Domande

1. Dimostrare, usando la definizione, che il punto $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D.
2. Dimostrare che $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale) di f in D, e trovare tutti i punti di massimo di f in D, cioè le soluzioni ottime del problema di ottimizzazione $\max\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in D \,\}$.
3. Disegnare il grafico della funzione nel dominio D.

Soluzione

1. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) = -1$. Usiamo l'intorno sferico di raggio δ dato da $N\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right)$: per ogni $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ in esso abbiamo $|x_1| < \frac{1}{2}$, da cui

$$x_1 x_2^2 \le |x_1|\, x_2^2 \le \frac{1}{2}\, x_2^2,$$

e quindi

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = -x_1^2 - x_2^2 + x_1 x_2^2 \leq -x_1^2 - x_2^2 + \frac{1}{2}x_2^2 = -x_1^2 - \frac{1}{2}x_2^2 \leq 0.$$

Quindi,

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \geq f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right), \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\right) \cap D,$$

e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di massimo locale di f in D, con massimo locale -1.

2. Abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = -9 - 9 - 1 + 27 = 8 > -1$, quindi $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ non è un punto di massimo (globale). Per trovare i punti di massimo, scriviamo

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = -x_1^2 - 1 + (x_1 - 1)\, x_2^2,$$


e osserviamo che $0 \leq x_2^2 \leq 9$ per ogni $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in D$:

- se $x_1 \leq 1$, abbiamo $(x_1 - 1)\, x_2^2 \leq 0$, quindi $f(\boldsymbol{x}) \leq -x_1^2 - 1 \leq -1 < 8$;
- se $x_1 > 1$, abbiamo $(x_1 - 1)\, x_2^2 \leq 9\,(x_1 - 1)$, con l'uguaglianza solo per $x_2^2 = 9$, quindi
$$f(\boldsymbol{x}) \leq -x_1^2 + 9x_1 - 10 = 8 - (x_1 - 3)(x_1 - 6) \leq 8,$$
poiché $x_1 \leq 3$ implica $(x_1 - 3)(x_1 - 6) \geq 0$, con l'uguaglianza solo per $x_1 = 3$.

La funzione ha **due** punti di massimo e il massimo è 8:

$$\arg\max \left\{ f(\boldsymbol{x}) \;\text{ soggetto a }\; \boldsymbol{x} \in D \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

3. Il grafico della funzione è la superficie sopra il dominio D, che è il rettangolo rosso disegnato sul piano di base; i punti del grafico corrispondenti ai due punti di massimo sono blu e il punto corrispondente al punto di massimo locale che non è globale è viola, con un segmento tratteggiato che li collega al piano di base.


$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right)$
8
−1
−46
−3
0
3
x_1
3
0
−3
x_2

Capitolo 6

Problemi di ottimizzazione convessi e concavi

Negli esercizi di questo capitolo la convessità e la concavità delle funzioni obiettivo si dimostrano solo con le definizioni del capitolo «Funzioni convesse e concave», usando la disuguaglianza

$$\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2, \qquad \forall a, b \in \mathbb{R},\ \forall \lambda \in [0,1]$$

dello stesso capitolo. Le regioni ammissibili sono descritte da vincoli $g_i(\boldsymbol{x}) \leq 0$: quando ogni funzione g_i è convessa, la regione ammissibile è un insieme convesso, per la proprietà degli insiemi definiti da funzioni convesse del capitolo «Funzioni convesse e concave».

Esercizio 6.1 — Problemi di ottimizzazione convessi e concavi ($E1$)

Consideriamo il seguente problema di ottimizzazione:

$$\min \left\{ (x-3)^2 + 1 \ \text{ soggetto a } \ x^2 - 4 \leq 0 \right\}$$

con funzione obiettivo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto (x-3)^2 + 1$ e regione ammissibile $F = \{\, x \in \mathbb{R} : x^2 - 4 \leq 0 \,\}$.

Domande

1. Dimostrare che la funzione $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g : x \mapsto x^2 - 4$ è convessa nel suo dominio, dedurre che la regione ammissibile è un insieme convesso e descriverla come un intervallo.
2. Dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio, e dedurre che il problema è un problema di minimizzazione convesso.
3. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
4. Dimostrare che il punto $x = 2$ è un punto di minimo locale, e dedurre la soluzione ottima e il valore ottimo del problema.

Soluzione

1. Per dimostrare che la funzione g è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} g\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \big(\lambda p + (1-\lambda)w\big)^2 - \lambda\, 4 - (1-\lambda)\, 4 \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\leq \lambda p^2 + (1-\lambda)w^2 - \lambda\, 4 - (1-\lambda)\, 4 \\ &\qquad \text{(poiché } \big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{)} \\ &= \lambda\,(p^2 - 4) + (1-\lambda)\,(w^2 - 4) \\ &= \lambda\, g(p) + (1-\lambda)\, g(w) \end{aligned}$$

   Quindi,

$$g\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda\, g(p) + (1-\lambda)\, g(w)$$

   Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione g è convessa nel suo dominio.

   La regione ammissibile $F = \{\, x \in \mathbb{R} : g(x) \leq 0 \,\}$ è definita da un vincolo con una funzione convessa, quindi è un insieme convesso. Poiché $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \leq 0$ se e solo se $-2 \leq x \leq 2$, la regione ammissibile è l'intervallo $F = [-2, 2]$.

2. Per dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:


$$\begin{aligned} f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \big(\lambda(p-3) + (1-\lambda)(w-3)\big)^2 + \lambda + (1-\lambda) \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\leq \lambda(p-3)^2 + (1-\lambda)(w-3)^2 + \lambda + (1-\lambda) \\ &\qquad \text{(poiché } \big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{)} \\ &= \lambda\big((p-3)^2 + 1\big) + (1-\lambda)\big((w-3)^2 + 1\big) \\ &= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \end{aligned}$$

   Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

   Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio, e in particolare sulla regione ammissibile convessa F: il problema è un problema di minimizzazione convesso.

3. Abbiamo $f(-2) = 26$, $f(0) = 10$, $f(1) = 5$ e $f(2) = 2$. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso, la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x e la soluzione ottima dell'ultima domanda è blu; la parte tratteggiata del grafico è fuori dalla regione ammissibile, e il suo punto più basso $x = 3$ non è ammissibile.



4. Nell'intorno $N\big((2), 1\big) = (1, 3)$, i punti ammissibili sono quelli di $N\big((2), 1\big) \cap F = (1, 2]$. Per ognuno di questi punti abbiamo $-2 < x - 3 \leq -1$, quindi $(x-3)^2 \geq 1$ e

$$f(x) = (x-3)^2 + 1 \geq 2 = f(2), \qquad \forall x \in N\big((2), 1\big) \cap F = (1, 2].$$

Il punto $x = 2$ è un punto di minimo locale. Poiché il problema è un problema di minimizzazione convesso, per la proposizione «minimi locali dei problemi di minimizzazione convessi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi», il punto $x = 2$ è anche un punto di minimo. La soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (2) \qquad \text{e} \qquad z(P) = f(2) = 2.$$

La soluzione ottima si trova sul bordo della regione ammissibile: il punto $x = 3$, in cui la funzione obiettivo raggiunge il suo valore più piccolo 1 su $\mathbb{R}$, non è ammissibile.

Esercizio 6.2 — Problemi di ottimizzazione convessi e concavi ($E2$)

Consideriamo il seguente problema di ottimizzazione:

$$\min \left\{ (x_1-2)^2 + (x_2-2)^2 \;\text{ soggetto a }\; x_1 + x_2 \le 2,\; x_1 \ge 0,\; x_2 \ge 0 \right\}$$

con funzione obiettivo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ f : \boldsymbol{x} \mapsto (x_1-2)^2 + (x_2-2)^2$ e regione ammissibile F.

Domande

1. Dimostrare che la regione ammissibile è un insieme convesso.
2. Dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio, e dedurre che il problema è un problema di minimizzazione convesso.
3. Descrivere gli insiemi di livello della funzione obiettivo per $k = 2$ e $k = 8$, e disegnarli insieme alla regione ammissibile.
4. Dimostrare che $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è l'unica soluzione ottima e calcolare il valore ottimo.
5. Il problema ha un punto di minimo locale diverso da $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$?

Soluzione

1. La regione ammissibile è l'insieme dei punti che soddisfano i tre vincoli

   $$g_1(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2 - 2 \le 0, \qquad g_2(\boldsymbol{x}) = -x_1 \le 0, \qquad g_3(\boldsymbol{x}) = -x_2 \le 0.$$

   Ogni funzione g_i è lineare, ed è convessa, poiché la definizione vale con l'uguaglianza: per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

   $$g_1\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \lambda\,(p_1 + p_2 - 2) + (1-\lambda)\,(w_1 + w_2 - 2) = \lambda\, g_1(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, g_1(\boldsymbol{w}),$$

   e allo stesso modo per g_2 e g_3. La regione ammissibile è definita da vincoli con funzioni convesse, quindi è un insieme convesso: è il triangolo con vertici $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, intersezione di tre semipiani.

2. Per dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

   $$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = {} & \big(\lambda(p_1-2) + (1-\lambda)(w_1-2)\big)^2 \\ & + \big(\lambda(p_2-2) + (1-\lambda)(w_2-2)\big)^2 \\ & \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \end{aligned}$$

$$\leq \lambda(p_1-2)^2+(1-\lambda)(w_1-2)^2+\lambda(p_2-2)^2+(1-\lambda)(w_2-2)^2$$

(poiché $\big(\lambda a+(1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2+(1-\lambda)b^2$, due volte)

$$= \lambda\big((p_1-2)^2+(p_2-2)^2\big)+(1-\lambda)\big((w_1-2)^2+(w_2-2)^2\big)$$


$$= \lambda f(\boldsymbol{p})+(1-\lambda)f(\boldsymbol{w})$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p}+(1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p})+(1-\lambda)f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio, e in particolare sulla regione ammissibile convessa F: il problema è un problema di minimizzazione convesso.

3. L'insieme di livello per k è l'insieme dei punti con $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2=k$, cioè la circonferenza di centro $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ e raggio $\sqrt{k}$. Per $k=2$, il raggio è $\sqrt{2}$ e la circonferenza passa per $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, poiché $1+1=2$; per $k=8$, il raggio è $2\sqrt{2}$ e la circonferenza passa per $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$, poiché $4+4=8$. Nella figura, la regione ammissibile è rossa, l'insieme di livello $k=2$ è blu, l'insieme di livello $k=8$ è arancione e la soluzione ottima della domanda successiva è blu: la circonferenza $k=2$ tocca la regione ammissibile solo in questo punto.



4. Per ogni punto ammissibile $\boldsymbol{x}$, poniamo $a = x_1 - 2$ e $b = x_2 - 2$. Poiché $x_1 + x_2 \leq 2$, abbiamo $a+b = x_1+x_2-4 \leq -2$, e quindi $(a+b)^2 \geq 4$. Inoltre, $2\,(a^2+b^2)-(a+b)^2 = (a-b)^2 \geq 0$. Quindi:

$$f(\boldsymbol{x}) = a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} \geq \frac{4}{2} = 2 = f\left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right), \qquad \forall \boldsymbol{x} \in F,$$

e il punto $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ è ammissibile, poiché $1+1=2$. L'uguaglianza vale solo se $a = b$ e $a + b = -2$, cioè $a = b = -1$ e $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad z(P) = 2.$$

5. No. Il problema è un problema di minimizzazione convesso: per la proposizione «minimi locali dei problemi di minimizzazione convessi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi», ogni punto di minimo locale è un punto di minimo, cioè una soluzione ottima, e la soluzione ottima è unica.

Esercizio 6.3 — Problemi di ottimizzazione convessi e concavi ($E3$)

Consideriamo la seguente funzione obiettivo e la seguente regione ammissibile:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f : x \mapsto 3 - (x-1)^2 \qquad \text{e} \qquad F = \{\, x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 4 \,\} = [-1, 4],$$

e i problemi di ottimizzazione associati in forma di minimo e in forma di massimo:

$$\min \left\{ 3 - (x-1)^2 \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 4 \right\}$$

e

$$\max \left\{ 3 - (x-1)^2 \ \text{ soggetto a } \ -1 \leq x \leq 4 \right\}$$

Domande

1. Dimostrare che la funzione obiettivo è concava nel suo dominio e che non è convessa su F, usando i punti $p = -1$, $w = 3$ e lo scalare $\lambda = \frac{1}{2}$. Il problema di minimo è un problema di minimizzazione convesso?
2. Disegnare il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile.
3. Dimostrare che $x = -1$ è un punto di minimo locale, ma non un punto di minimo. Trovare la soluzione ottima e il valore ottimo del problema di minimo.

4. Spiegare perché la domanda precedente non contraddice la proposizione «minimi locali dei problemi di minimizzazione convessi».

5. Dimostrare che $x = 1$ è un punto di massimo locale, e dedurre la soluzione ottima e il valore ottimo del problema di massimo.

Soluzione

1. Per dimostrare che la funzione è concava nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \lambda\, 3 + (1-\lambda)\, 3 - \big(\lambda(p-1) + (1-\lambda)(w-1)\big)^2 \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\geq \lambda\, 3 + (1-\lambda)\, 3 - \lambda(p-1)^2 - (1-\lambda)(w-1)^2 \\ &\qquad \text{(poiché } \big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2, \\ &\qquad\quad \text{e il fattore } -1 \text{ inverte la disuguaglianza)} \\ &= \lambda\big(3 - (p-1)^2\big) + (1-\lambda)\big(3 - (w-1)^2\big) \\ &= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \end{aligned}$$

   Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \geq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$


   Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio.

   Con $p = -1$, $w = 3$ e $\lambda = \frac{1}{2}$, entrambi i punti appartengono a F, $\lambda p + (1-\lambda)w = 1$ e

$$f(1) = 3 \;>\; -1 = \frac{1}{2} f(-1) + \frac{1}{2} f(3) = \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot (-1) :$$

   la disuguaglianza della definizione di funzione convessa non vale, e la funzione obiettivo non è convessa su F. Il problema di minimo **non** è un problema di minimizzazione convesso, anche se la sua regione ammissibile è convessa.

2. Abbiamo $f(-1) = -1$, $f(1) = 3$, $f(3) = -1$ e $f(4) = -6$. Il grafico della funzione obiettivo sulla regione ammissibile è rosso e la regione ammissibile è la parte rossa dell'asse x; le soluzioni ottime dei due problemi sono blu e il punto di minimo locale che non è un punto di minimo è viola.



3. Nell'intorno $N\big((-1),1\big) = (-2,0)$, i punti ammissibili sono quelli di $N\big((-1),1\big) \cap F = [-1,0)$. Per ognuno di questi punti abbiamo $-2 \leq x-1 < -1$, quindi $(x-1)^2 \leq 4$ e

$$f(x) = 3-(x-1)^2 \geq -1 = f(-1), \qquad \forall x \in N\big((-1),1\big) \cap F = [-1,0).$$

Il punto $x = -1$ è un punto di minimo locale. Non è un punto di minimo, poiché $4 \in F$ e $f(4) = -6 < -1 = f(-1)$.

Per ogni $x \in F$ abbiamo $-2 \leq x-1 \leq 3$, quindi $(x-1)^2 \leq 9$ e $f(x) = 3-(x-1)^2 \geq -6 = f(4)$, con l'uguaglianza solo se $x-1=3$, cioè $x=4$ (il valore $x-1=-3$ non è ammissibile). L'unica soluzione ottima e il valore ottimo del problema di minimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (4) \qquad \text{e} \qquad z(P) = -6.$$

4. La proposizione «minimi locali dei problemi di minimizzazione convessi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi» richiede una funzione obiettivo convessa sulla regione ammissibile. Per la prima domanda, la funzione obiettivo non è convessa su F: il problema di minimo non è un problema di minimizzazione convesso, e uno dei suoi punti di minimo locale non è un punto di minimo. Un metodo che esplora solo i punti vicini a $x = -1$ si ferma al minimo locale -1, mentre il valore ottimo è -6.

5. Nell'intorno $N\big((1),1\big) = (0,2)$, tutti i punti sono ammissibili e

$$f(x) = 3-(x-1)^2 \leq 3 = f(1), \qquad \forall x \in N\big((1),1\big) \cap F = (0,2).$$

Il punto $x = 1$ è un punto di massimo locale. Per la prima domanda, la funzione obiettivo è concava sulla regione ammissibile convessa F, e il problema di massimo è un problema di massimizzazione concavo. Per il corollario «massimi locali dei problemi di massimizzazione concavi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi», il punto $x = 1$ è anche un punto di massimo, e la soluzione ottima e il valore ottimo del problema di massimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = (1) \qquad \text{e} \qquad z(P) = 3.$$

Esercizio 6.4 — Problemi di ottimizzazione convessi e concavi (*E4*)

Consideriamo il seguente problema di ottimizzazione:

$$\max \left\{ 4\,x_1 + 2\,x_2 - x_1^2 - x_2^2 \;\text{ soggetto a }\; x_1 + 2\,x_2 \leq 2,\; x_1 \geq 0,\; x_2 \geq 0 \right\}$$

con funzione obiettivo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ f : \boldsymbol{x} \mapsto 4\,x_1 + 2\,x_2 - x_1^2 - x_2^2$ e regione ammissibile F.

Domande

1. Completare i quadrati per scrivere la funzione obiettivo come $f(\boldsymbol{x}) = c - (x_1 - \alpha_1)^2 - (x_2 - \alpha_2)^2$, con $c, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.
2. Dimostrare che la regione ammissibile è un insieme convesso e che la funzione obiettivo è concava nel suo dominio. Di che tipo di problema si tratta?
3. Descrivere gli insiemi di livello della funzione obiettivo per $k = 2$ e $k = \frac{21}{5}$, e disegnarli insieme alla regione ammissibile.
4. Dimostrare che $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}$ è l'unica soluzione ottima e calcolare il valore ottimo.
5. Il problema ha un punto di massimo locale diverso da $\begin{pmatrix} 8/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}$?

Soluzione

1. Poiché $x_1^2 - 4\,x_1 = (x_1 - 2)^2 - 4$ e $x_2^2 - 2\,x_2 = (x_2 - 1)^2 - 1$, abbiamo:
$$f(\boldsymbol{x}) = -\left(x_1^2 - 4\,x_1\right) - \left(x_2^2 - 2\,x_2\right) = 5 - (x_1 - 2)^2 - (x_2 - 1)^2,$$
cioè $c = 5$, $\alpha_1 = 2$ e $\alpha_2 = 1$. La funzione obiettivo vale al più 5, e vale 5 solo in $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, che non è ammissibile, poiché $2 + 2 \cdot 1 = 4 > 2$.

2. La regione ammissibile è l'insieme dei punti che soddisfano i tre vincoli
$$g_1(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2\,x_2 - 2 \leq 0, \qquad g_2(\boldsymbol{x}) = -x_1 \leq 0, \qquad g_3(\boldsymbol{x}) = -x_2 \leq 0.$$

Ogni funzione g_i è lineare, ed è convessa, poiché la definizione vale con l'uguaglianza: per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

$$g_1\big(\lambda\boldsymbol{p}+(1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \lambda\,(p_1+2\,p_2-2)+(1-\lambda)\,(w_1+2\,w_2-2) = \lambda\,g_1(\boldsymbol{p})+(1-\lambda)\,g_1(\boldsymbol{w}),$$

e allo stesso modo per g_2 e g_3. La regione ammissibile è definita da vincoli con funzioni convesse, quindi è un insieme convesso: è il triangolo con vertici $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

Per dimostrare che la funzione obiettivo è concava nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:


$$\begin{aligned}
f\big(\lambda\boldsymbol{p}+(1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \lambda\,5 + (1-\lambda)\,5 - \big(\lambda(p_1-2)+(1-\lambda)(w_1-2)\big)^2 \\
&\quad - \big(\lambda(p_2-1)+(1-\lambda)(w_2-1)\big)^2 \\
&\quad \text{(poiché } \lambda+(1-\lambda)=1\text{)} \\
&\geq \lambda\,5 + (1-\lambda)\,5 - \lambda(p_1-2)^2 - (1-\lambda)(w_1-2)^2 \\
&\quad - \lambda(p_2-1)^2 - (1-\lambda)(w_2-1)^2 \\
&\quad \text{(poiché } \big(\lambda a+(1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2+(1-\lambda)b^2\text{, due volte,} \\
&\quad \text{e il fattore } -1 \text{ inverte la disuguaglianza)} \\
&= \lambda\big(5-(p_1-2)^2-(p_2-1)^2\big) \\
&\quad + (1-\lambda)\big(5-(w_1-2)^2-(w_2-1)^2\big) \\
&= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p}+(1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \geq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio, e in particolare sulla regione ammissibile convessa F: il problema è un **problema di massimizzazione concavo**.

3. L'insieme di livello per $k<5$ è l'insieme dei punti con $(x_1-2)^2+(x_2-1)^2 = 5-k$, cioè la circonferenza di centro $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ e raggio $\sqrt{5-k}$. Per $k=2$, il raggio è $\sqrt{3}$; per $k=\frac{21}{5}$, il raggio è $\sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ e la circonferenza passa per $\begin{pmatrix}8/5\\1/5\end{pmatrix}$, poiché $\left(\frac{2}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{4}{5}$. Nella figura, la regione ammissibile è rossa, l'insieme di livello $k=2$ è arancione, l'insieme di livello $k=\frac{21}{5}$ è blu e la soluzione ottima della domanda successiva è blu: la circonferenza $k=\frac{21}{5}$ tocca la regione ammissibile solo in questo punto, sul lato $x_1+2\,x_2=2$.



4. Per ogni punto ammissibile $\boldsymbol{x}$, poniamo $a = x_1 - 2$ e $b = x_2 - 1$, così che $f(\boldsymbol{x}) = 5 - (a^2 + b^2)$. Poiché $x_1 + 2\,x_2 \leq 2$, abbiamo $a + 2\,b = x_1 + 2\,x_2 - 4 \leq -2$, e quindi $(a + 2\,b)^2 \geq 4$. Inoltre, $5\,(a^2 + b^2) - (a + 2\,b)^2 = 4\,a^2 - 4\,ab + b^2 = (2\,a - b)^2 \geq 0$. Quindi:

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a + 2\,b)^2}{5} \geq \frac{4}{5} \qquad \text{e} \qquad f(\boldsymbol{x}) = 5 - (a^2 + b^2) \leq 5 - \frac{4}{5} = \frac{21}{5}, \qquad \forall \boldsymbol{x} \in F.$$

L'uguaglianza vale solo se $b = 2\,a$ e $a + 2\,b = -2$, cioè $5\,a = -2$, $a = -\frac{2}{5}$, $b = -\frac{4}{5}$ e $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}$. Questo punto è ammissibile, poiché $\frac{8}{5} + \frac{2}{5} = 2$, $\frac{8}{5} \geq 0$ e $\frac{1}{5} \geq 0$, e

$$f\left(\begin{pmatrix} 8/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}\right) = \frac{32}{5} + \frac{2}{5} - \frac{64}{25} - \frac{1}{25} = \frac{34}{5} - \frac{13}{5} = \frac{21}{5}.$$

L'unica soluzione ottima e il valore ottimo sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P) = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 1/5 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad z(P) = \frac{21}{5}.$$

5. No. Il problema è un problema di massimizzazione concavo: per il corollario «massimi locali dei problemi di massimizzazione concavi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi», ogni punto di massimo locale è un punto di massimo, cioè una soluzione ottima, e la soluzione ottima è unica.

Esercizio 6.5 — Problemi di ottimizzazione convessi e concavi ($E5$)

Consideriamo la funzione obiettivo

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ f : \boldsymbol{x} \mapsto (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 3)^2$$

e i due problemi di ottimizzazione:

$$(P_1) \quad \min \left\{ f(\boldsymbol{x}) \ \text{ soggetto a } \ x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0 \right\}$$

e

$$(P_2) \quad \min \left\{ f(\boldsymbol{x}) \ \text{ soggetto a } \ x_1^2 + x_2^2 - 2 \geq 0 \right\}$$

con regioni ammissibili F_1 e F_2, rispettivamente.

Domande

1. Dimostrare che la funzione $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ g : \boldsymbol{x} \mapsto x_1^2 + x_2^2 - 2$ è convessa nel suo dominio, e dedurre che F_1 è un insieme convesso.
2. Dimostrare che F_2 non è un insieme convesso, usando i punti $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ e lo scalare $\lambda = \frac{1}{2}$.
3. Dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio. Quale dei due problemi è un problema di minimizzazione convesso?
4. Descrivere gli insiemi di livello della funzione obiettivo per $k = 8$ e $k = 18$, e disegnarli insieme alla regione ammissibile F_1.
5. Dimostrare che $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è l'unica soluzione ottima di (P_1) e calcolare il valore ottimo.

Soluzione

1. Per dimostrare che la funzione g è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} g\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big(\lambda p_1 + (1-\lambda) w_1\big)^2 + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda) w_2\big)^2 - \lambda\, 2 - (1-\lambda)\, 2 \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\leq \lambda p_1^2 + (1-\lambda) w_1^2 + \lambda p_2^2 + (1-\lambda) w_2^2 - \lambda\, 2 - (1-\lambda)\, 2 \\ &\qquad \text{(poiché } \big(\lambda a + (1-\lambda) b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda) b^2\text{,} \\ &\qquad \text{due volte)} \end{aligned}$$

$$= \lambda\big(p_1^2 + p_2^2 - 2\big) + (1-\lambda)\big(w_1^2 + w_2^2 - 2\big)$$

$$= \lambda\, g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, g(\boldsymbol{w})$$

Quindi,

$$g\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda\, g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, g(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione g è convessa nel suo dominio. La regione ammissibile $F_1 = \{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : g(\boldsymbol{x}) \leq 0 \,\}$ è definita da un vincolo con una funzione convessa, quindi è un insieme convesso: è il disco di centro l'origine e raggio $\sqrt{2}$.

2. I due punti appartengono a F_2, poiché $2^2 + 0^2 - 2 = 2 \geq 0$ e $(-2)^2 + 0^2 - 2 = 2 \geq 0$. Con $\lambda = \frac{1}{2}$, la loro combinazione convessa è

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \qquad \text{con} \qquad 0^2 + 0^2 - 2 = -2 < 0,$$

e non appartiene a F_2. L'insieme F_2 (i punti fuori dal disco aperto di raggio $\sqrt{2}$) non è convesso.

3. Per dimostrare che la funzione obiettivo è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:


$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big(\lambda(p_1-3) + (1-\lambda)(w_1-3)\big)^2 \\ &\quad + \big(\lambda(p_2-3) + (1-\lambda)(w_2-3)\big)^2 \\ &\quad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\leq \lambda(p_1-3)^2 + (1-\lambda)(w_1-3)^2 + \lambda(p_2-3)^2 + (1-\lambda)(w_2-3)^2 \\ &\quad \text{(poiché } \big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2\text{,} \\ &\quad \text{due volte)} \\ &= \lambda\big((p_1-3)^2 + (p_2-3)^2\big) + (1-\lambda)\big((w_1-3)^2 + (w_2-3)^2\big) \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. Il problema (P_1) è un problema di minimizzazione convesso, poiché la sua regione ammissibile è convessa e la funzione obiettivo è convessa su di essa. Il problema (P_2) non è un problema di ottimizzazione convesso, poiché la sua regione ammissibile non è convessa: la definizione richiede una regione ammissibile convessa, qualunque sia la funzione obiettivo.

4. L'insieme di livello per k è l'insieme dei punti con $(x_1-3)^2+(x_2-3)^2=k$, cioè la circonferenza di centro $\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$ e raggio $\sqrt{k}$. Per $k=8$, il raggio è $2\sqrt{2}$ e la circonferenza passa per $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, poiché $4+4=8$; per $k=18$, il raggio è $3\sqrt{2}$ e la circonferenza passa per $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$, poiché $9+9=18$. Nella figura, la regione ammissibile F_1 è rossa, l'insieme di livello $k=8$ è blu, l'insieme di livello $k=18$ è arancione e la soluzione ottima della domanda successiva è blu: la circonferenza $k=8$ tocca il disco F_1 solo in questo punto.



5. Scriviamo la funzione obiettivo come

$$f(\boldsymbol{x})=x_1^2-6\,x_1+9+x_2^2-6\,x_2+9=q-6\,s+18,\qquad \text{con}\qquad q=x_1^2+x_2^2,\quad s=x_1+x_2.$$

Poiché $2\,q-s^2=(x_1-x_2)^2\geq 0$, abbiamo $q\geq\frac{s^2}{2}$. Per ogni $\boldsymbol{x}\in F_1$ abbiamo $q\leq 2$, quindi $s^2\leq 2\,q\leq 4$ e $s\leq 2$. Quindi:

$$f(\boldsymbol{x})=q-6\,s+18\geq\frac{s^2}{2}-6\,s+18=\frac{(s-6)^2}{2}$$
$$\geq\frac{(2-6)^2}{2}=8=f\left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right),\qquad\forall\boldsymbol{x}\in F_1,$$

dove l'ultima disuguaglianza vale poiché $6-s\geq 4>0$. Il punto $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ è ammissibile, poiché $1+1-2=0$. L'uguaglianza vale solo se $x_1=x_2$ e $s=2$, cioè $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

L'unica soluzione ottima e il valore ottimo di (P_1) sono:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(P_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad z(P_1) = 8.$$

Per la proposizione «minimi locali dei problemi di minimizzazione convessi» del capitolo «Problemi di ottimizzazione convessi e concavi», (P_1) non ha altri punti di minimo locale.