

Ansiedade

Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients



Universidade de São Paulo

RIBEIRÃO PRETO

EN Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients

Editado por Prof. Dr. Aderbal Aguiar, PhD
(IEP/Remederi e Labioex/UFSC) aderbal.aguiar@ufsc.br



Remederi
Cannabis Medicinal

Ansiedade

Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients

Introdução

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é uma das condições de ansiedade mais comuns que prejudicam a vida social. O canabidiol (CBD), um importante composto não-psicomimético da planta cannabis sativa, mostrou efeitos ansiolíticos tanto em seres humanos quanto em animais. Este estudo preliminar teve como objetivo comparar os efeitos de um **teste de simulação de oratória em público (TSFP)** em pacientes saudáveis e pacientes com TAS que receberam uma única dose de CBD ou placebo.

Métodos

Um total de 24 pacientes com TAS nunca tratados foram alocados para receber CBD (600 mg; n = 12) ou placebo (n = 12) em um desenho randomizado duplo-cego 1 hora e meia antes do teste. O mesmo número de controles saudáveis (n = 12) realizou o TSFP sem receber qualquer medicação. Cada voluntário participou de apenas uma sessão experimental em um procedimento duplo-cego. As avaliações subjetivas na Escala de Humor Visual Analógico (VAMS) e na escala de Autoafirmação Negativa (SSPS-N) e medidas fisiológicas (pressão arterial, frequência cardíaca e condutância da pele) foram medidas em seis momentos diferentes durante o TSFP.

Resultados

1. O pré-tratamento com CBD reduziu significativamente a ansiedade, o comprometimento cognitivo e o desconforto em seu desempenho de fala, e diminuiu significativamente o alerta em sua fala antecipatória.
2. O grupo placebo apresentou níveis mais altos de ansiedade, comprometimento cognitivo, desconforto e alerta quando comparado com o grupo controle, conforme avaliado pela VAMS.
3. As pontuações do SSPS-N evidenciaram aumentos significativos durante o teste do grupo placebo que foi quase abolido no grupo CBD.



- O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é uma das condições de ansiedade mais comuns que prejudicam a vida social.
- O canabidiol (CBD), um importante composto não-psicomimético da planta cannabis sativa, mostrou efeitos ansiolíticos tanto em humanos quanto em animais.
- O pré-tratamento com CBD reduziu significativamente a ansiedade, o comprometimento cognitivo e o desconforto em seu desempenho de fala.
- O aumento da ansiedade induzido pelo TSFP em sujeitos com TAS foi reduzido com o uso de CBD, resultando em uma resposta semelhante à dos controles saudáveis.

Conclusão

O aumento da ansiedade induzido pelo TSFP em sujeitos com TAS foi reduzido com o uso de CBD, resultando em uma resposta semelhante à dos controles saudáveis. Portanto, o CBD pode ser uma opção viável para o tratamento de pacientes com TAS.

Fonte

Bergamaschi MM, Queiroz RH, Chagas MH, de Oliveira DC, De Martinis BS, Kapczinski F, Quevedo J, Roesler R, Schröder N, Nardi AE, Martín-Santos R, Hallak JE, Zuardi AW, Crippa JA. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. *Neuropsychopharmacology*. 2011 May;36(6):1219-26.