



ESPORTE

Efeitos do Canabidiol e Canabigerol na Recuperação Muscular Pós-Exercício: Um Ensaio Clínico Randomizado

EN Effects of Cannabidiol and Cannabigerol on Post-Exercise Muscle Recovery: A Randomized Clinical Trial

NSU Florida

Editado por:

Prof. Dr. Aderbal Aguiar

PhD (IEP/Remederi e Labioex/UFSC)

aderbal@remederi.com



Escaneie o
QR Code e
Conheça o
Instituto



Instituto
de Ensino
e Pesquisa

ESPORTE

Efeitos do Canabidiol e Canabigerol na Recuperação Muscular Pós-Exercício: Um Ensaio Clínico Randomizado

INTRODUÇÃO

O artigo “A randomized, double-blind, placebo-controlled, repeated-dose pilot study of the safety, tolerability, and preliminary effects of a cannabidiol (CBD)- and canabigerol (CBG)-based beverage powder to support recovery from delayed onset muscle soreness (DOMS)” de Peters e colaboradores discute o crescente interesse no uso de canabinoides, como o CBD (canabidiol) e o CBG (canabigerol), especialmente entre atletas, devido à sua potencial capacidade de promover recuperação e aliviar dores musculares. Destaca-se que o CBD age em múltiplos mecanismos, incluindo efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, enquanto o CBG é menos estudado, mas sugere-se que possua propriedades semelhantes.

- Um estudo clínico revelou que a combinação de CBD, CBG e outros compostos reduziu significativamente a dor muscular em atletas após exercícios intensos.
- A formulação testada, contendo canabinoides e aminoácidos, demonstrou melhorar a recuperação muscular e a funcionalidade diária em indivíduos fisicamente ativos.
- Com a administração de 70 mg de CBD e 100 mg de CBG diariamente, observou-se uma redução média de -1,33 na intensidade da dor pós-exercício.
- Estes resultados sugerem um potencial terapêutico importante dos fitocannabinoides na gestão da dor muscular e na recuperação pós-exercício.

MÉTODOS

O estudo foi um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, envolvendo 40 indivíduos treinados em exercícios. A formulação ativa continha 35 mg de CBD, 50 mg de CBG, 25 mg de BCP (beta-cariofileno), 3,8 g de BCAAs (aminoácidos de cadeia ramificada) e 420 mg de citrato de magnésio. Os participantes consumiram a formulação duas vezes ao dia, durante 1 semana, resultando em uma dose diária de 70 mg de CBD, 100 mg de CBG, 50 mg de BCP, 7,6 g de BCAAs e 840 mg de citrato de magnésio.

RESULTADOS CLÍNICOS

Após 72 horas da indução de dor muscular de início tardio (DOMS), observou-se uma redução significativa na média de dor e desconforto no grupo que consumiu a formulação ativa, com uma diferença média de -1,33 no escore de dor, indicando um potencial importância clínica. Além disso, houve uma redução significativa na interferência da dor nas atividades diárias e físicas na DOMS de 48 horas.

CONCLUSÃO

A formulação testada mostrou-se segura e bem tolerada, sugerindo benefícios no alívio da dor muscular pós-exercício e na melhoria da recuperação funcional. Estes resultados indicam que a combinação de CBD, CBG e outros componentes pode ser benéfica na gestão de dor muscular em indivíduos fisicamente ativos.

FONTE:

Peters EN, Yardley H, Harrison A, Eglit GML, Antonio J, Turcotte C, Bonn-Miller MO. A randomized, double-blind, placebo-controlled, repeated-dose pilot study of the safety, tolerability, and preliminary effects of a cannabidiol (CBD)- and cannabigerol (CBG)-based beverage powder to support recovery from delayed onset muscle soreness (DOMS). J Int Soc Sports Nutr. 2023 Dec;20(1):2280113. doi: 10.1080/15502783.2023.2280113