

Insieme produttivo

ESERCIZIO 3.1. Dimostrare che l'insieme $REC = \{ i \mid W_i \text{ ricorsivo} \}$ è un insieme produttivo.

$$REC = \{ x \mid W_x \text{ ricorsivo} \}$$

Dimostro che REC è produttivo riducendolo funzionalmente a $\overline{K} \leq REC \equiv K \leq \overline{REC}$

$$- x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin REC \quad (W_{g(x)} \text{ non ricorsivo}) \rightarrow K$$

$$- x \notin K \Leftrightarrow g(x) \in REC \quad (W_{g(x)} \text{ ricorsivo}) \quad \begin{matrix} \rightarrow \emptyset \\ \rightarrow \mathbb{N} \end{matrix} \text{ Banale}$$

Definiamo la funzione parziale ricorsiva psi:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \wedge y \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \quad ? \equiv \begin{cases} \varphi_y(y) & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

```
input(x,y)
stopx = false
stopy = false
costruisci phi_x
costruisci phi_y
while !stopx {
  esegui next step di phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    stopx = true
  }
}
while !stopy {
  esegui next step di phi_y(y)
  if phi_y(y) ha terminato {
    stopy = true
  }
}
return 1
```

Siccome psi è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$- x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \psi(x, y) \downarrow \Leftrightarrow y \in K$$

$$\stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \psi(x, y) \downarrow \Leftrightarrow \varphi_y(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(y) \Leftrightarrow \varphi_y(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = K$$

$$\stackrel{\text{def } REC}{\Rightarrow} g(x) \notin REC$$

$$\begin{aligned}
- x \notin K &\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \uparrow \\
&\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \rho_{g(x)}(y) \uparrow \\
&\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset \\
&\stackrel{\text{def REC}}{\Rightarrow} x \in \text{REC}
\end{aligned}$$

Quindi REC è produttivo.

ESERCIZIO 3.2. Sia $A = \{ x \mid \varphi_x(x) = 0 \}$, dimostrare che il suo complementare è un insieme produttivo.

$$\bar{A} = \{ x \mid \varphi_x(x) \neq 0 \}$$

Bisogna dimostrare che $\bar{K} \leq \bar{A} \equiv K \leq A$ quindi se:

- $x \in K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow$ Ha terminato con 0
- $x \notin K \Rightarrow g(x) \in \bar{A} \rightarrow$ Non ha terminato con 0

$$\Psi(x, y) = \begin{cases} 0 & x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è parziale ricorsiva, di seguito fornisco lo pseudocodice:

```

input(x,y)
costruisci phi_x
while true {
  esegui next step phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    return 0
  }
}

```

Siccome psi è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \Psi(x, y) = \rho_{g(x)}(y)$$

Per riduzione funzionale:

$$\begin{aligned}
- x \in K &\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \downarrow = 0 \\
&\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \rho_{g(x)}(y) \downarrow = 0 \\
&\Rightarrow g(x) \in A \equiv g(x) \notin \bar{A}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- x \notin K &\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \uparrow \\
&\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \rho_{g(x)}(y) \uparrow \\
&\Rightarrow g(x) \notin A \equiv g(x) \in \bar{A}
\end{aligned}$$

Quindi il complemento di A è produttivo

ESERCIZIO 3.4. Sia $A = \{ x \mid W_x = \emptyset \}$, dimostrare che tale insieme è produttivo.

Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna ridurlo funzionalmente al complemento di K

$$\bar{K} \leq A \equiv K \leq \bar{A}$$

Quindi se:

$$- x \in K \Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow W_x \neq \emptyset \rightarrow \mathbb{N}$$

$$- x \notin K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow W_x = \emptyset$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è parziale ricorsiva, di seguito fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x
while true {
  esegui next step phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}
```

Siccome ψ è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$- x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N}$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$- x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi A è produttivo

ESERCIZIO 3.5. Sia $A = \{ x \mid W_x \neq \mathbb{N} \}$, dimostrare tale insieme è produttivo.

Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna ridurlo funzionalmente al complemento di K

$$\overline{K} \leq A \equiv K \leq \overline{A}$$

Quindi se:

$$- x \in K \Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow W_x = \mathbb{N}$$

$$- x \notin K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow W_x \neq \mathbb{N} \rightarrow \emptyset$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è parziale ricorsiva, di seguito fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x
while true {
  esegui next step phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}
```

Siccome ψ è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$- x \in K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N}$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$- x \notin K \stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi A è produttivo

ESERCIZIO 3.6. Dimostrare che l'insieme $A = \{ x \mid |W_x| < \omega \}$ è un insieme produttivo.

Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna ridurlo funzionalmente al complemento di K

$$\overline{K} \leq A \equiv K \leq \overline{A}$$

Quindi se:

- $x \in K \Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow |W_x| = \omega$ termina su tutti gli input
- $x \notin K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow |W_x| < \omega$ termina su un insieme finito di input

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è parziale ricorsiva, di seguito fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x
while true {
  esegui next step phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}
```

Siccome ψ è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

- $x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow$

$$\stackrel{\text{def } \varphi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N} \Rightarrow |W_{g(x)}| = \omega$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$
- $x \notin K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset \Rightarrow |W_{g(x)}| < \omega$$

$$\stackrel{\text{def } g(x)}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi A è produttivo

ESERCIZIO 3.7. Sia $B = \{ i \mid \exists y. \varphi_i(y) \downarrow \wedge \varphi_y(i) \downarrow \wedge \varphi_i(y) = \varphi_y(i) \}$
 dimostrare che il suo complementare è un insieme produttivo.

$$\overline{B} = \{ i \mid \forall y. \varphi_i(y) \uparrow \vee \varphi_y(i) \uparrow \vee \varphi_i(y) \neq \varphi_y(i) \}$$

Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna ridurlo funzionalmente al complemento di K

$$\overline{K} \leq \overline{B} \cong K \leq B$$

Quindi se:

$$- x \in K \Rightarrow g(x) \in B \rightarrow \exists y. \varphi_i(y) \downarrow = \varphi_y(i) \downarrow$$

$$- x \notin K \Rightarrow g(x) \notin B$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione è parziale ricorsiva, di seguito fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x
while true {
    esegui next step phi_x(x)
    if phi_x(x) ha terminato {
        return 1
    }
}
```

Siccome ψ è parziale ricorsiva, allora si può applicare smn

$$\xRightarrow{smn} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

$$- x \in K \xRightarrow{\text{def } K} \varphi_x(x) \downarrow$$

$$\xRightarrow{\text{def } \psi} \forall y. \psi(x, y) \downarrow$$

$$\xRightarrow{smn} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\xRightarrow{y=g(x)} \varphi_{g(x)}(g(x)) \downarrow \quad (\exists y. \varphi_i(y) \downarrow = \varphi_y(i) \downarrow \wedge i = y)$$

$$\xRightarrow{\text{def } B} g(x) \in B$$

$$- x \notin K \xRightarrow{\text{def } \psi} \forall y. \psi(x, y) \uparrow$$

$$\xRightarrow{smn} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow \exists i. \varphi_{g(x)}(i) \downarrow$$

$$\xRightarrow{\text{def } B} g(x) \notin B$$

Quindi il complemento di B è produttivo

ESERCIZIO 3.9. Sia $A = \{ x \mid |\text{RANGE}(\varphi_x)| < \omega \}$, dimostrare che è un insieme produttivo.

Questo insieme è intuitivamente produttivo perchè la quantità di output della funzione calcolata da x deve essere finita. Questo non è possibile da calcolare perchè bisognerebbe controllare ogni possibile input per avere l'insieme degli output. Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna creare una funzione parziale ricorsiva ψ su cui si può applicare il teorema smn e mostrare la riduzione funzionale dell'insieme A all'insieme complemento di K : $\bar{K} \leq A \equiv K \leq \bar{A}$ dove il complemento di A è il seguente:

$$\bar{A} = \{ x \mid |\text{range}(\varphi_x)| = \omega \}$$

Si vuole arrivare a mostrare che se:

$$- x \in K \Rightarrow \varphi(x) \notin A \rightarrow |\text{range}(\varphi_x)| \text{ è infinito}$$

$$- x \notin K \Rightarrow \varphi(x) \in A \rightarrow |\text{range}(\varphi_x)| \text{ è finito}$$

La funzione parziale ricorsiva ψ è la seguente:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x; // Esiste una procedura algoritmica che la costruisce

while true {
    // Esegue un singolo passo della macchina x
    esegui il prossimo passo di phi_x(x)
    // Se la macchina termina allora x è in K e ritorna y
    // Se non termina il loop continua e se non termina mai diverge
    is phi_x(x) ha terminato {
        return y
    }
}
```

Siccome la funzione ψ è parziale ricorsiva, si può applicare smn:

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

Ora dimostro per riduzione funzionale che A è produttivo:

$$- x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \downarrow \wedge \psi(x, y) = y$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \wedge \varphi_{g(x)}(y) = y$$

$$\stackrel{\text{def range}}{\Rightarrow} \forall y. \text{range}(\varphi_{g(x)}) = \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |\text{range}(\varphi_{g(x)})| = \mathbb{N} = \omega$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$- x \notin K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \uparrow$$

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def range}}{\Rightarrow} \text{range}(\varphi_{g(x)}) = \emptyset$$

$$\Rightarrow |\text{range}(\varphi_{g(x)})| = 0 < w$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ cioè A si riduce al complemento di K e quindi A è produttivo.

ESERCIZIO 3.10. Dimostrare che il seguente insieme è produttivo

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid |W_x| \leq 5\}$$

Questo insieme è intuitivamente produttivo perchè per calcolare l'insieme di tutti i programmi che terminano con meno di 5 input (compreso) bisognerebbe controllare tutti i possibili programmi e questa cosa non è calcolabile. Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna creare una funzione parziale ricorsiva ψ su cui si può applicare il teorema smn e mostrare la riduzione funzionale dell'insieme A all'insieme complemento di K : $\bar{K} \leq A \cong K \leq \bar{A}$ dove il complemento di A è il seguente:

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{N} \mid |W_x| > 5\}$$

Si vuole arrivare a mostrare che se:

$$- x \in K \Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow |W_{g(x)}| > 5 \rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$$

$$- x \notin K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow |W_{g(x)}| \leq 5 \rightarrow W_{g(x)} = \emptyset$$

La funzione parziale ricorsiva ψ è la seguente:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x; // Esiste una procedura algoritmica che la costruisce

while true {
  // Esegue un singolo passo della macchina x
  esegui il prossimo passo di phi_x(x)
  // Se la macchina termina allora x è in K
  // Se non termina il loop continua e se non termina mai diverge
  is phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}
```

Siccome la funzione ψ è parziale ricorsiva, si può applicare smn:

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

Ora dimostro per riduzione funzionale che A è produttivo:

$$- x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } \psi}{\Rightarrow} \forall y. \psi(x, y) \downarrow$$

$$\stackrel{smn}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow |W_{g(x)}| = w > 5$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$- x \notin K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } \varphi}{\Rightarrow} \forall y. \varphi(x, y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset$$

$$\Rightarrow |W_{g(x)}| = 0 \leq 5$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ cioè A si riduce al complemento di K e quindi A è produttivo.

ESERCIZIO 3.11. Dimostrare che il seguente insieme è produttivo

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid W_x \subseteq \{4\}^{\mathbb{N}}\}$$

Questo insieme è intuitivamente produttivo perchè bisognerebbe trovare tutti i possibili programmi che hanno come dominio un sottoinsieme di tutte le possibili potenze di 4. I programmi da trovare sono infiniti, quindi l'insieme non è calcolabile e di conseguenza è produttivo. Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna creare una funzione parziale ricorsiva ψ su cui si può applicare il teorema smn e mostrare la riduzione funzionale dell'insieme A all'insieme complemento di K : $\bar{K} \leq A \equiv K \leq \bar{A}$ dove il complemento di A è il seguente:

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{N} \mid W_x \not\subseteq \{4\}^{\mathbb{N}}\}$$

Si vuole arrivare a mostrare che se:

$$- x \in K \Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow W_{g(x)} \not\subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \rightarrow W_{g(x)} = \mathbb{N}$$

$$- x \notin K \Rightarrow g(x) \in A \rightarrow W_{g(x)} \subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \rightarrow W_{g(x)} = \emptyset \quad (\text{L'insieme vuoto è sottoinsieme di tutti gli insiemi})$$

La funzione parziale ricorsiva ψ è la seguente:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva fornisco lo pseudocodice:

```
input(x,y)
costruisci phi_x; // Esiste una procedura algoritmica che la costruisce

while true {
  // Esegue un singolo passo della macchina x
  esegui il prossimo passo di phi_x(x)
  // Se la macchina termina allora x è in K
  // Se non termina il loop continua e se non termina mai diverge
  is phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}
```

Siccome la funzione ψ è parziale ricorsiva, si può applicare smn:

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva. } \psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

Ora dimostro per riduzione funzionale che A è produttivo:

$$\begin{aligned}
- x \in K &\stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow \\
&\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \downarrow \\
&\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \\
&\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N} \not\subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \\
&\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- x \notin K &\stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow \\
&\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \uparrow \\
&\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\
&\stackrel{\text{def } W_{g(x)}}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \emptyset \subseteq \{4\}^{\mathbb{N}} \\
&\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A
\end{aligned}$$

Quindi $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ cioè A si riduce al complemento di K e quindi A è produttivo.

ESERCIZIO 3.12. Sia $A = \{ x \mid W_x = \{ y \mid y \text{ primo} \} \}$, dimostrare che è un insieme produttivo.

Questo insieme è intuitivamente produttivo perchè bisogna controllare che il dominio di x sia composto da tutti i numeri primi e quindi non è calcolabile. Per dimostrare che l'insieme è produttivo bisogna creare una funzione parziale ricorsiva ψ su cui si può applicare il teorema smn e mostrare la riduzione funzionale dell'insieme A all'insieme complemento di K : $\bar{K} \leq A \cong K \neq \bar{A}$ dove il complemento di A è il seguente:

$$\bar{A} = \{ x \mid W_x \neq \{ y \mid y \text{ primo} \} \} = \{ x \mid W_x = \{ y \mid y \text{ non primo} \} \}$$

Si vuole arrivare a mostrare che se:

$$\begin{aligned}
- x \in K &\Rightarrow g(x) \notin A \rightarrow W_x \text{ contiene almeno un numero primo} \\
- x \notin K &\Rightarrow g(x) \in A \rightarrow W_x \text{ contiene solo numeri primi}
\end{aligned}$$

La funzione parziale ricorsiva ψ è la seguente:

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & x \in K \vee y \text{ primo} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva fornisco lo pseudocodice:

```

input(x,y)
// Se y è primo la condizione è vera quindi si può ritornare 1
if y primo {
  return 1
}

// Se y non è primo si controlla se x è in K
costruisci phi_x // Esiste una procedura algoritmica che la costruisce
while true {
  esegui il prossimo passo di phi_x(x)
  if phi_x(x) ha terminato {
    return 1
  }
}

```

Siccome la funzione ψ è parziale ricorsiva, si può applicare smn:

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \exists g \text{ totale ricorsiva, } \Psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$$

Ora dimostro per riduzione funzionale che A è produttivo:

$$- x \in K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\Rightarrow \exists y. y \text{ non primo} . \varphi_{g(x)}(y) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

$$- x \notin K \stackrel{\text{def } K}{\Rightarrow} \varphi_x(x) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(x, y) \downarrow \Leftrightarrow y \text{ primo}$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_{g(x)}(y) \downarrow \Leftrightarrow y \text{ primo}$$

$$\stackrel{\text{def } W_g(x)}{\Rightarrow} W_{g(x)} = \{y \mid y \text{ primo}\}$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

Quindi $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ cioè A si riduce al complemento di K e quindi A è produttivo.