

# Esercizi su risposta libera e impulsiva

1. Dato il seguente sistema a tempo continuo (LTI)

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} - 5 \frac{dv(t)}{dt} - 6v(t) = \frac{du(t)}{dt} + 5u(t), \quad t \in \mathbb{R}_+,$$

e le seguenti condizioni iniziali:

$$v(0^-) = 3 \quad \frac{dv(0^-)}{dt} = 1.$$

(a) si calcoli la risposta libera nel tempo,

(b) si calcoli la risposta impulsiva nel tempo.

## a) Risposta libera

Equazione del sistema

$$v''(t) - 5v'(t) - 6v(t) = u'(t) + 5u(t), \quad t \in \mathbb{R}_+$$

Condizioni iniziali:

$$\begin{cases} v(0^-) = 3 \\ v'(0^-) = 1 \end{cases}$$

Equazione omogenea del polinomio caratteristico

$$p(s) = s^2 - 5s - 6s = 0$$

Soluzioni

$$s_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{2} = \frac{5 \pm 7}{2} = \begin{cases} \frac{12}{2} = 6 \\ -\frac{2}{2} = -1 \end{cases}$$

$$\lambda_1 = -1 \quad r = 2 \text{ (numero di soluzioni)}$$

$$\lambda_2 = 6 \quad \mu_{1,2} = 1 \text{ (moltiplicità)}$$

Risposta libera generica

$$\begin{aligned} v_L(t) &= \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} c_{i,l} \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \frac{t^l}{l!} \\ &= c_1 \cdot e^{-t} \cdot \frac{t^0}{0!} + c_2 \cdot e^{6t} \cdot \frac{t^0}{0!} \\ &= c_1 \cdot e^{-t} + c_2 \cdot e^{6t} \end{aligned}$$

Derivata della risposta libera

$$v(t) = c_1 \cdot e^{-t} + c_2 \cdot e^{6t}$$

$$\begin{aligned} v'(t) &= c_1 \cdot e^{-t} \cdot (-1) + c_2 \cdot e^{6t} \cdot 6 \\ &= -c_1 \cdot e^{-t} + 6c_2 \cdot e^{6t} \end{aligned}$$

Calcolo dei coefficienti  $c_1$  e  $c_2$

$$\begin{cases} v(0^-) = c_1 \cdot e^{0^-} + c_2 \cdot e^{6 \cdot 0^-} \\ v'(0^-) = -c_1 \cdot e^{0^-} + 6c_2 \cdot e^{6 \cdot 0^-} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(0^-) = c_1 + c_2 \\ v'(0^-) = -c_1 + 6c_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(0^-) = 3 \\ v'(0^-) = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ -c_1 + 6c_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_1 = 3 - c_2 \\ -3 + c_2 + 6c_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_1 = \frac{17}{7} \\ c_2 = \frac{4}{7} \end{cases}$$

Risposta libera specifica

$$v_c(t) = \frac{17}{7} e^{-t} + \frac{4}{7} e^{6t}$$

b) Risposta impulsiva

Equazione del sistema

$$v''(t) - 5v'(t) - 6v(t) = u'(t) + 5u(t), \quad t \in \mathbb{R}_+$$

Equazione omogenea del polinomio caratteristico

$$p(s) = s^2 - 5s - 6s = 0$$

Soluzioni

$$\lambda_1 = -1 \quad r=2 \text{ (numero di soluzioni)}$$

$$\lambda_2 = 6 \quad \mu_{1,2} = 1 \text{ (moltiplicità)}$$

Risposta impulsiva generica

$$h(t) = d_0 \cdot \delta(t) + \left( \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} d_{i,l} \cdot e^{\lambda_i t} \cdot \frac{t^l}{l!} \right) \cdot \delta_{-1}(t) \quad d_0 = 0 \text{ perché il sistema non è proprio}$$

$$= \left( d_1 \cdot e^{-t} \cdot \frac{t^0}{0!} + d_2 \cdot e^{6t} \cdot \frac{t^0}{0!} \right) \cdot \delta_{-1}(t)$$

$$= (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t)$$

Riscrivo l'equazione del sistema ponendo  $v(t) = h(t)$  e  $u(t) = \delta(t)$

$$v''(t) - 5v'(t) - 6v(t) = u'(t) + 5u(t)$$

↓

$$h''(t) - 5h'(t) - 6h(t) = \delta'(t) + 5\delta(t)$$

Calcolo delle derivate di  $h(t)$

$$h(t) = (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t)$$

$$h'(t) = (-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t) + (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t)$$

$$h''(t) = (d_1 \cdot e^{-t} + 36d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t) + (-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t) +$$

$$(-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t) + (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_1(t)$$

Sostituisco nell'equazione del sistema

$$h''(t) - 5h'(t) - 6h(t) = \delta'(t) + 5\delta(t)$$

$$\begin{aligned} & \downarrow h'' \\ & \left[ (d_1 \cdot e^{-t} + 36d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t) + (-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t) + \right. \\ & \quad \left. (-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t) + (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_1(t) \right] \\ & - 5 \left[ (-d_1 \cdot e^{-t} + 6d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t) + (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta(t) \right] \\ & - 6 \left[ (d_1 \cdot e^{-t} + d_2 \cdot e^{6t}) \cdot \delta_{-1}(t) \right] = \delta'(t) + 5\delta(t) \end{aligned}$$

Valuto le funzioni in  $t = 0^-$

$$\begin{aligned} & \left[ (d_1 \cdot e^{-0} + 36 d_2 e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0) + (-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 e^{60}) \cdot \delta(0) + \right. \\ & \quad \left. (-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta(0) + (d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta_1(0) \right] \\ & - 5 \left[ (-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0) + (d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta(0) \right] \\ & - 6 \left[ (d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0) \right] = \delta'(0) + 5 \delta(0) \end{aligned}$$

tolgo il gradino perché in  $t=0$  fa 0  $\frac{d}{dt}$

$$\begin{aligned} & \left[ \cancel{(d_1 \cdot e^{-0} + 36 d_2 e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0)} + \cancel{(-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 e^{60}) \cdot \delta(0)} + \right. \\ & \quad \left. \cancel{(-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta(0)} + \cancel{(d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta_1(0)} \right] \\ & - 5 \left[ \cancel{(-d_1 \cdot e^{-0} + 6 d_2 e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0)} + \cancel{(d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta(0)} \right] \\ & - 6 \left[ \cancel{(d_1 \cdot e^{-0} + d_2 \cdot e^{60}) \cdot \delta_{-1}(0)} \right] = \delta'(0) + 5 \delta(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left[ (-d_1 + 6 d_2) \cdot \delta(0) + (-d_1 + 6 d_2) \cdot \delta(0) + (d_1 + d_2) \cdot \delta_1(0) \right] \\ & - 5 \left[ (d_1 + d_2) \cdot \delta(0) \right] = \delta'(0) + 5 \delta(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-d_1 + 6 d_2) 2 \delta(0) + (d_1 + d_2) \cdot \delta_1(0) \\ & - 5(d_1 + d_2) \cdot \delta(0) = \delta'(0) + 5 \delta(0) \end{aligned}$$

Sposto tutto a sinistra

$$\begin{aligned} & \underline{(-d_1 + 6 d_2) 2 \delta(0)} + \underline{(d_1 + d_2) \cdot \delta_1(0)} \\ & \underline{-5(d_1 + d_2) \cdot \delta(0)} - \underline{\delta_1(0)} - \underline{5 \delta(0)} = 0 \end{aligned}$$

Raccoglio per  $\delta(0)$ ,  $\delta_1(0)$ , ...,  $\delta_n(0)$  che sono linearmente indipendenti

$$\underline{(2(-d_1 + 6 d_2) - 5(d_1 + d_2) - 5) \delta(0)} + \underline{(d_1 + d_2 - 1) \cdot \delta_1(0)} = 0$$

$$(-2d_1 + 12d_2 - 5d_1 - 5d_2 - 5) \delta(0^-) + (d_1 + d_2 - 1) \delta_1(0^-) = 0$$

$$(-7d_1 + 7d_2 - 5) \delta(0^-) + (d_1 + d_2 - 1) \delta_1(0^-) = 0$$

Risolve il sistema

$$\begin{cases} (-7d_1 + 7d_2 - 5) \delta(0^-) = 0 \\ (d_1 + d_2 - 1) \delta_1(0^-) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -7d_1 + 7d_2 = 5 \\ d_1 + d_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7d_2 - 7 + 7d_2 = 5 \\ d_1 = -d_2 + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d_2 = \frac{12}{14} = \frac{6}{7} \\ d_1 = -\frac{6}{7} + \frac{7}{7} = \frac{1}{7} \end{cases}$$

Risposta impulsiva specifica

$$h(t) = \frac{1}{7} \cdot e^{-t} + \frac{6}{7} \cdot e^{6t} \cdot \delta_{-1}(t)$$