

Gabarito 2ª Lista - MAT 137 - Introdução à Álgebra Linear

$$1. (a) \begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix}; \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 7 & 7 \\ 8 & 9 & 5 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -16 \\ -66 \end{bmatrix};$$

$$(c) \begin{bmatrix} 8 & 12 & -4 \\ 6 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -36 \\ 11 \\ 16 \end{bmatrix}; \quad (d) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & -6 & 1 & 3 \\ 8 & 16 & -3 & -4 \\ 20 & 10 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 13 \\ -20 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

$$2. (a) \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}; \det \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = -5 + 6 = 1 \neq 0, \text{ logo } A \text{ é invertível.}$$

$$\text{Logo, } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} 8 & 12 & -4 \\ 6 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -36 \\ 11 \\ 16 \end{bmatrix}; \det \begin{bmatrix} 8 & 12 & -4 \\ 6 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} = 64 \neq 0, \text{ logo } A \text{ é invertível.}$$

$$\text{Logo, } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} -36 \\ 11 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{23}{64} & \frac{19}{16} & -\frac{13}{8} \\ \frac{11}{32} & -\frac{7}{8} & \frac{5}{4} \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -36 \\ 11 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(c)  $\det A = 0$ , logo não é possível utilizar o método da matriz inversa para resolver o sistema.

$$3. (a) A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \text{ logo } \det A = 10 + 9 = 19 \neq 0 \text{ portanto utilizar a regra de Cramer.}$$

$$\text{Então, } D = \det A = 19, D_1 = \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 38 \text{ e } D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -19.$$

$$\text{Logo, } x = \frac{D_1}{D} = \frac{38}{19} = 2 \text{ e } y = \frac{D_2}{D} = -\frac{19}{19} = -1, \text{ e a solução do sistema é } S = \{(2, -1)\}.$$

(b)  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ , logo  $\det A = 22 \neq 0$  portanto podemos utilizar a regra de Cramer.

Então,  $D = \det A = 22$ ,  $D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 8 & 5 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 66$ ,  $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = -22$  e  $D_3 =$

$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & -2 & -13 \end{vmatrix} = 44$ .

Logo,  $x = \frac{D_1}{D} = \frac{66}{22} = 3$ ,  $y = \frac{D_2}{D} = -\frac{22}{22} = -1$  e  $z = \frac{D_3}{D} = \frac{44}{22} = 2$ , e a solução do sistema é  $S = \{(3, -1, 2)\}$ .

4. (a) (i)  $k \neq -3$  e  $k \neq 2$ ; (ii)  $k = 2$ ; (iii)  $k = -3$ .

(b) (i)  $k \neq 1$  e  $k \neq -2$ ; (ii)  $k = 1$ ; (iii)  $k = -2$ .

(c) (i) para nenhum  $k \in \mathbb{R}$ ; (ii)  $k \neq 4$ ; (iii)  $k = 4$ .

(d) (i)  $k \neq 3$ ; (ii)  $k = 3$ ; (iii) para nenhum  $k \in \mathbb{R}$ .

5. (a)  $k = 1$  (b)  $k = 2$ .

6. (a)  $a \neq \frac{2}{5}$  e  $b \in \mathbb{R}$ ; (b)  $a = \frac{2}{5}$  e  $b = 0$ ; (c)  $a = \frac{2}{5}$  e  $b \neq 0$ .

7. (a)  $k = -6$  (b)  $k = 13$ .

8.  $S = \{\lambda \in \mathbb{R}; \lambda \neq 0, \lambda \neq -1, \text{ e } \lambda \neq 1\}$ .

9. (a)  $\det A = -1 \neq 0$  logo, existe  $A^{-1}$  e  $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\text{Sol}_1 = \{(-1, -5, 4)\}$ ;  $\text{Sol}_2 = \{(-1, -5, -3)\}$ ;  $\text{Sol}_3 = \{(2, -8, 4)\}$ .

10. (a)  $-5a + 2b + c = 0$ ; (b)  $2a - b + c = 0$ ; ; (c) para quaisquer  $a, b$  e  $c$  em  $\mathbb{R}$ ;

(d)  $a \in \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}$ ; (e)  $-a + b + 2c = 0$ ; ; (f)  $y + z = 0$  e  $x + 2y - t = 0$ .

11. (a) Se  $ad - bc \neq 0$ , então a matriz dos coeficientes do sistema é invertível, logo terá uma única

solução dada por  $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{de - bf}{ad - bc} \\ \frac{af - ce}{ad - bc} \end{bmatrix}$ .

12. (a)  $\begin{cases} 2(1) + 3(-1) - (-1) = 0 \\ 1 - 4(-1) + 5(-1) = 0 \end{cases}$
- (b)  $\begin{cases} 2(-2) + 3(2) - (2) = 0 \\ -2 - 4(2) + 5(2) = 0 \end{cases}$
- (c)  $x = -1, y = 1$  e  $z = 1$ , logo  $\begin{cases} 2(-1) + 3(1) - (1) = 0 \\ -1 - 4(1) + 5(1) = 0 \end{cases}$
- (d)  $3x = -3, 3y = 3$  e  $3z = 3$ , logo  $\begin{cases} 2(-3) + 3(3) - (3) = 0 \\ -3 - 4(3) + 5(3) = 0 \end{cases}$
- (e) Porque em um sistema homogêneo se  $(x_1, y_1, z_1)$  e  $(x_2, y_2, z_2)$  são soluções então,

$$k_1(x_1, y_1, z_1) + k_2(x_2, y_2, z_2)$$

também é solução para todo  $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ .

13. (a)  $\text{Sol} = \{(0, 0, 0)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (b)  $\text{Sol} = \{(2, 1, 2)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (c) sistema incompatível, não tem solução;
- (d)  $\text{Sol} = \left\{ \left( -1 - 4z, \frac{1}{3} + 2z, z \right); z \in \mathbb{R} \right\}$ ; o sistema é compatível indeterminado;
- (e)  $\text{Sol} = \{(0, -w, -w, 0, w); w \in \mathbb{R}\}$ ; o sistema é compatível indeterminado;
- (f)  $\text{Sol} = \{(12 + 26z, -14 - 33z, z, 3 + 10z); z \in \mathbb{R}\}$ ; o sistema é compatível indeterminado;
- (g)  $\text{Sol} = \left\{ \left( \frac{7}{16}, -\frac{1}{16}, \frac{17}{8} \right) \right\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (h) sistema incompatível, não tem solução;
- (i)  $\text{Sol} = \{(0, 0, 0)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (j) sistema incompatível, não tem solução;
- (k)  $\text{Sol} = \left\{ \left( \frac{4}{3}, -\frac{2}{2}, 2, -\frac{8}{3} \right) \right\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (l) sistema incompatível, não tem solução;
- (m)  $\text{Sol} = \{(2, -1, -2)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (n)  $\text{Sol} = \{(-4, 2, 10)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (o)  $\text{Sol} = \{(5, 1)\}$ ; o sistema é compatível determinado;
- (p)  $\text{Sol} = \{(-20, y, -32 + 4y); y \in \mathbb{R}\}$  o sistema é compatível indeterminado;
- (q) sistema incompatível, não tem solução;
- (r)  $\text{Sol} = \{(1, 2, 2 - 2)\}$  o sistema é compatível determinado;
- (s)  $\text{Sol} = \{(3 - 4y + 5z, y, z, 7 - 9y + 13zy); y, z \in \mathbb{R}\}$  o sistema é compatível indeterminado;
- (t)  $\text{Sol} = \left\{ \left( -\frac{209}{33}t, -\frac{53}{11}t, -\frac{79}{33}t, t \right); t \in \mathbb{R} \right\}$  o sistema é compatível indeterminado;

- (*u*) sistema incompatível, não tem solução;
- (*v*)  $\text{Sol} = \{(-z + 2t, 1 + 2z, t); z, t \in \mathbb{R}\}$ ; o sistema é compatível indeterminado;
- (*x*)  $\text{Sol} = \{(1 - 3y - w, y, 2 + w, 3 + 2w, w); y, w \in \mathbb{R}\}$ ; o sistema é compatível indeterminado.
14. (*a*)  $k = -6$ ;      (*b*)  $k = \frac{16}{7}$ ;      (*c*)  $k = -1$ .
15. (*a*) (*V*);   (*b*) (*F*);   (*c*) (*V*);   (*d*) (*V*);   (*e*) (*V*);   (*f*) (*V*);   (*g*) (*F*);   (*h*) (*V*);   (*i*) (*V*);  
       (*j*) (*F*);   (*k*) (*V*);   (*l*) (*F*);   (*m*) (*V*);   (*n*) (*V*).
16. Devem processadas  $20t$  de cada tipo de combustível.
17.  $1,5T$  de plástico normal e  $2,5T$  de plástico especial.
18. Devem ser utilizadas  $3,2g$  de *A*,  $4,2g$  de *B* e  $2g$  de *C*.
19. Este exercício não é coerente do ponto de vista prático, uma vez que a quantidade de ração do tipo B é negativa. Modele o problema e a solução será:
- Abril: 85 de A, -45 de B e 30 de C.
- Maio: 76 de A, -40 de B e 30 de C.
- Junho: 72 de A, -38 de B e 26 de C.
- 20.
21.  $x = 5$ ,  $y = 3$  e  $z = 2$ .
22. Poderão ser fabricadas 60 unidade de *A* e 80 unidades de *B*.
23. Serão necessários  $1.600Kg$  do minério de tipo *I* e  $600Kg$  do minério de tipo *II*.
24. O jogador *A* tinha  $R\$39,00$ , o jogador *B* tinha  $R\$21,00$  e o jogador *C* tinha  $R\$12,00$ .
25. Foram vendidos  $700Kg$  do produto *A*,  $200Kg$  do produto *B* e  $100Kg$  do produto *C*.
26. Em dezembro foram produzidos 1 unidade da ração 1, 2 unidades da ração 2 e 4 unidades da ração 3.
- Já em janeiro foram produzidos 2 unidades da ração 1, 3 unidades da ração 2 e 1 unidade da ração 3.