



1. (**Équivalence des normes matricielles**) On rappelle que la norme  $p$  d'un vecteur  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ ,  $1 \leq p < \infty$ , est définie par

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

On rappelle que  $\frac{1}{n}\|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_\infty \leq n\|\mathbf{x}\|_1$ , et  $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq \sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_2$ ,  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . En général, on dit que deux normes  $\|\cdot\|_p$  et  $\|\cdot\|_q$  sur  $\mathbb{R}^n$  sont *équivalentes* s'il y a deux constantes  $0 < c_1 \leq c_2$  telles que  $c_1\|\mathbf{x}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_q \leq c_2\|\mathbf{x}\|_p$ ,  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . On peut montrer que toutes les normes vectorielles sur  $\mathbb{R}^n$  sont équivalentes. En particulier, le résultat suivant (admis) montre que toutes les normes  $p$  sur  $\mathbb{R}^n$  sont équivalentes :

$$\|\mathbf{x}\|_p \leq \lambda_{pq}(n)\|\mathbf{x}\|_q, \quad \text{avec} \quad \lambda_{pq}(n) := \begin{cases} 1, & p \geq q, \\ n^{(\frac{1}{p} - \frac{1}{q})}, & p < q. \end{cases} \quad (1)$$

Soit  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . En cours, on a défini la *norme d'opérateur* :

$$\|A\|_p := \max_{\|\mathbf{x}\|_p=1} \|A\mathbf{x}\|_p = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p}. \quad (2)$$

- (a) Montrer que toutes les normes d'opérateur sont équivalentes, c.-à-d., pour deux normes  $\|\cdot\|_p$  et  $\|\cdot\|_q$  il existe deux constantes  $0 < C_1 \leq C_2$  telles que  $C_1\|A\|_p \leq \|A\|_q \leq C_2\|A\|_p$ ,  $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ .

*Indication : utiliser (1) et (2).*

- (b) Montrer que la norme de Frobenius de  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , définie par  $\|A\|_F := \sqrt{\text{Tr}(A^\top A)}$ , n'est pas une norme d'opérateur. On rappelle que la *trace* d'une matrice carrée  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$  est définie comme  $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii}$ .

*Indication : considérer un opérateur pour lequel la norme d'opérateur est triviale.*

- (c) Malgré le fait que la norme de Frobenius ne soit pas une norme d'opérateur, elle est toutefois équivalente aux autres normes matricielles. En particulier, montrer explicitement que

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{r} \|A\|_2,$$

où  $r \leq n$  est le nombre de valeurs propre de  $(A^\top A)$  différentes de zéro.

*Indication : voir série 6, exercice 1, et utiliser la propriété cyclique de la trace  $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB) = \text{Tr}(BCA)$ .*

2. ★ (**Condition de problèmes différentiables**) En cours, on a vu la Définition 3.1 et le Théorème 3.5 pour la condition relative d'un problème. On donne ici la définition de *condition absolue*.

**Définition 1** (*Condition absolue*).

Soient  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  et  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  différentiable. Alors, la condition absolue  $\kappa_{\text{abs}}$  de  $f$  en  $\mathbf{x}$  est

$$\kappa_{\text{abs}} = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\|}{\varepsilon} : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon \right\} = \|f'(\mathbf{x})\|.$$

- (a) Considérer le problème suivant : obtenir les quantités scalaires  $f_1(x_1, x_2) = 1 - x_1 - \sin(x_1 + x_2)$  et  $f_2(x_1, x_2) = 2 + x_2 + \cos(x_1 - x_2)$  à partir du vecteur  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ . Calculer la condition absolue en norme  $\|\cdot\|_\infty$  pour ce problème. Est-ce qu'il est bien conditionné au sens absolu ?
- (b) Considérer le problème suivant : calculer  $f(\mathbf{x}) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$  à partir du vecteur  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ . Calculer la condition absolue et relative en norme  $\|\cdot\|_1$  pour ce problème. Est-ce qu'il est bien conditionné au sens absolu ? Et au sens relatif ?