











## ANAFILAXIA TRATAMENTO

<b>1</b>	Aprenda a reconhecer os sintomas e tenha um plano de tratamento por escrito, que deve ser treinado regularmente	
<b>2</b>	Se possível remova o agente causal e verifique se é mesmo uma reação anafilática	
<b>3</b>		Como o paciente deitado, avalie a respiração, o pulso, o estado de consciência e a presença de erupções no corpo
<b>4</b>		<b>O passo 4, 5 e 6 devem ser realizados o mais rápido possível e de forma simultânea</b>
<b>5</b>		<b>CHAME POR AJUDA:</b> SAMU (192) ou outro serviço de emergência disponível
<b>6</b>		<b>APLIQUE ADRENALINA®</b> intramuscular, no meio da coxa nas doses recomendadas no plano de ação. Repetir a dose a cada 15 a 30 minutos se necessário (máximo 3 doses). A maioria dos pacientes responde a 1 ou 2 doses
<b>7</b>		<b>Mantenha o paciente deitado de costas</b> ou em posição confortável, quando houver dificuldade respiratória ou vômitos. <b>Mantenha as pernas elevadas.</b> <u>Parada cardíaca pode ocorrer em questão de segundos caso o paciente se levante subitamente</u>
<b>8</b>		Quando possível ofereça oxigênio suplementar por máscara a 6 a 8 litros p/minuto
<b>9</b>		<b>Pode ser necessário pegar uma veia para administração de soro fisiológico.</b> Quando necessário e se for possível, administrar solução salina a 0,9% o mais rápido possível. (1 a 2 litros nos primeiros 30 minutos)
<b>10</b>		<b>A qualquer momento pode ser necessário realizar massagem cardíaca.</b>
		<b>Se possível ...</b>
		A cada 15-30 minutos avaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca, e a respiração

Adaptado de Simons et al. Journal of Allergy &amp; Clinical Immunology Março 2011