



TUBERCULOSE PONTUAÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO

ACHADOS CLÍNICOS

Febre, tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese >2 semanas	+15
Sintomas por menos de 2 semanas	0
Infecção respiratória c/ melhora após tratamento	-10

ACHADOS RADIOLÓGICOS

Adenomegalia hilar ou padrão miliar e/ou	
Condensação/infiltrado que persiste por > 2 semanas e/ou	
Condensação/infiltrado por > 2 semanas, sem melhora c/ ATB e/ou	+15
Condensação/ infiltrado com < 2 semanas de duração	+ 5
Radiografia normal	- 5

CONTATO COM ADULTO COM TBC

Próximo; nos últimos 2 anos	+10
Ocasional ou negativo	0

PPD

≥ 10 mm em vacinados com BCG há menos de 2 anos ou	
≥ 5 mm em não vacinados ou vacinados com BCG há mais 2 de anos	+15
< 5 mm	0

ESTADO NUTRICIONAL

Desnutrido grave	+ 5
Eutrófico ou com desnutrição leve	0

TOTAL : _____

ESCORE ≤ 25



DIAGNÓSTICO POUCO PROVÁVEL

ESCORE ENTRE 30 a 35



DIAGNÓSTICO POSSÍVEL

ESCORE ≥ 40



DIAGNÓSTICO MUITO PROVÁVEL