



EN CULTIVOS DE MANÍ Y SOJA

MÁS KILOS SIEMPRE

**FORMAX III** Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares, compuesto por 3 principios activos. De esta manera, se logra tener una herramienta para el manejo de resistencias, con un producto de amplio espectro de control.

**ACCIÓN:** Preventivo, antiesporulante, curativo, erradicante, sistémico.

**MODO DE ACCIÓN:** Se combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. El tercer componente, Boscalid, es una carboxamida, de acción sistémica local y que se transloca translaminarmente.



Testigo sin aplicar



1100 cc/ha FORMAX III




1100 cc/ha FORMAX III

**DOSIS:** 1,1 L/ha + 0,5 L/ha de ZINAX (EMAG).

**ENFERMEDADES:** Viruela tardía (*Cercosporidium personatum*), Viruela temprana (*Cercospora arachidicola*).

**RECOMENDACIONES DE USO:** Iniciar las aplicaciones a la aparición de las primeras manchas/síntomas. Realizar hasta 2 (dos) aplicaciones de **Formax III** en el ciclo del cultivo, con un intervalo de 21 a 25 días entre aplicaciones. Bajo condiciones predisponentes /alta presión de la enfermedad, se deberían acortar los intervalos entre aplicaciones a 21 días. Se recomienda entre aplicaciones de Carboxamidas, 1 aplicación de un fungicida Multisitio para evitar el desarrollo de resistencia.



Testigo sin aplicar



350 cc/ha AZOXY PRO



750 cc/ha FORMAX III

**DOSIS:** 0,75 L/ha + 0,5 L/ha de ZINAX (EMAG).

**ENFERMEDADES:** Mancha marrón (*Septoria glycines*), Mancha púrpura de la semilla o Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii*).

**RECOMENDACIONES DE USO:** Aplicar ante la presencia de los primeros síntomas de las enfermedades o de manera preventiva desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% de llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades y los mayores aumentos de los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.

**ORDEN DE MEZCLA:** WG → WP → SG → SP → SC → OD → EC → SL

**Formulación:** Suspensión Concentrada (SC). **Clasificación toxicológica:** Clase II. **Presentación:** 5 L Bidón apilable.

## Tecnologías para producir más y mejor.

Consultá con el Distribuidor  
de la **RED AGROFINA**  
más cercano a Tu zona

**AGROFINA**  
INTELIGENCIA PRODUCTIVA