DR. ANDRÉS HUMPHREYS · GINECÓLOGO

Indicaciones postquirúrgicas: LEEP

Cuidados después de la cirugía

Evolución normal del postoperatorio

- Flujo y secreciones: a los pocos días es normal un flujo grisáceo o negruzco, habitualmente abundante y, ocasionalmente, con olor fuerte. Puede persistir 2 o 3 semanas.
- Pasta médica: durante la cirugía aplicamos una pasta marrón sobre la herida para protegerla. La eliminás entre los 5 y 10 días posteriores. Es normal que expulses un tapón o restos del mismo color y con olor similar al óxido.
- Molestias: son esperables dolores similares a los menstruales. Sugerimos ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante los primeros 2 a 4 días.

Cuidados

- Evitar esfuerzos importantes.
- Evitar relaciones sexuales por 1 mes.
- Evitar baños de inmersión/pileta por 1 mes.
- Próximo control: aproximadamente 15 días después de la cirugía, para evaluar cómo estás y conversar sobre los resultados de la biopsia.

Señal de alerta médica: concurrí a la Guardia de Ginecología del Hospital Británico

- Hemorragia fuerte (mayor a la de una menstruación normal).
- Fiebre igual o mayor a 38 °C.

El hospital cuenta con personal de nuestro equipo las 24 horas, quienes se comunicarán con el doctor de inmediato. Las demás secreciones y molestias varían en cada mujer y forman parte del proceso normal de cicatrización.