

Protocolos

Corporais

celulite e estrias

Celulite, estrias e
gordura localizada
**com evidência e
alertas**

Com **ficha de
perimetria** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



Três queixas, três avaliações

Celulite, estrias e gordura localizada aparecem juntas na mesma cliente, mas têm causa, escala e tratamento diferentes. Classifique cada uma antes de montar o protocolo.

Celulite: dois jeitos validados de graduar

Atinge de **80% a 98% das mulheres** depois da puberdade. A escala de **Nürnberg-Müller** é a mais usada nos estudos:

Grau	O que você vê
0	Pele lisa, inclusive no teste de preensão (pinçar a pele)
I	Pele lisa deitada e em pé; o aspecto de "colchão" só aparece ao pinçar
II	Lisa deitada; as ondulações aparecem com a cliente em pé
III	Ondulações visíveis deitada e em pé

A **escala fotonumérica de Hexsel (CSS)**, validada em 2009 com fotos padronizadas, soma 5 itens de 0 a 3: número de depressões, profundidade, aspecto das elevações, flacidez e o grau de Nürnberg-Müller. Total de **1 a 5 = leve**, **6 a 10 = moderada**, **11 a 15 = grave**. É a melhor escolha para comparar antes e depois.

Estrias: a cor muda a conduta

R

Rubras (recentes)

Elevadas, avermelhadas a arroxeadas, às vezes com coceira. Na biópsia, derme com edema e inflamação. Em vários estudos, respondem melhor que as albas.

A

Albas (antigas)

Planas, claras, com superfície finamente enrugada e epiderme fina. Costumam ser permanentes: o objetivo é melhorar textura e cor, não apagar.

Investigue a causa: gestação, estirão da puberdade, ganho ou perda rápida de peso, musculação, uso de corticoide tópico ou sistêmico. Estrias sem causa aparente pedem avaliação médica: podem acompanhar excesso de cortisol (síndrome de Cushing).

Gordura localizada não é obesidade

Meça antes de prometer. Pelo Ministério da Saúde, IMC de 30 kg/m² ou mais é obesidade, e cintura acima de **80 cm na mulher** ou **94 cm no homem** indica risco aumentado de doença. Nesses casos, a tecnologia corporal não substitui acompanhamento clínico e nutricional. Os estudos de contorno corporal incluíram, na maioria, pessoas com IMC normal ou sobrepeso.

O que funciona, segundo as revisões

Resumo das revisões sistemáticas mais recentes. A coluna "nível" é a leitura da ITH sobre a qualidade dos estudos, não um selo oficial.

Opção	O que os estudos mostram	Nível
Massagem, drenagem e vibração celulite	Estudos pequenos ou sem grupo controle. Num estudo de 24 semanas com massagem vibratória, a celulite voltou ao valor inicial logo após parar o uso.	Baixo
Radiofrequência celulite e contorno	Revisão de 24 ensaios (2025): redução média de 2,09 cm na circunferência da coxa. Outra revisão (2024) achou só 2 de 32 estudos com boa metodologia entre os recursos eletrofísicos.	Baixo a moderado
Ondas de choque celulite	Na mesma revisão de 2025, foi o resultado mais consistente: queda média de 2,07 pontos no escore de celulite em 4 estudos.	Moderado
Ultrassom focado gordura localizada	Efeito estatisticamente significativo em estudos de contorno corporal, quase todos com IMC normal ou sobrepeso (revisão de 2016).	Baixo
Criolipólise gordura localizada	Meta-análise de 30 estudos e 3.158 pessoas (2025): cintura abdominal 3,56 cm menor e prega suprailíaca 5,2 mm menor em 12 semanas. Satisfação de 80,4%.	Moderado
Carboxiterapia celulite e gordura	Revisão narrativa de 32 artigos (2026): lipólise leve na área tratada, com pedido de mais pesquisa. Um ensaio de 2025 com 30 pacientes reduziu a espessura subcutânea no lado tratado.	Baixo
Microagulhamento estrias	Meta-análise de 11 estudos (2024): melhora clínica, com resultado parecido ao do laser. Nenhuma técnica isolada resolve: são várias sessões e, muitas vezes, combinação de recursos.	Moderado

Criolipólise: efeitos e contraindicações

Dormência (49,5%), vermelhidão (44,5%) e edema (30,5%) são comuns e passageiros. A hiperplasia adiposa paradoxal, em que a gordura cresce no local, apareceu em **0,22%** (1 em 455), mais do que os fabricantes relatam. Não aplique com crioglobulinemia, urticária ao frio ou hemoglobinúria paroxística ao frio, nem sobre varizes graves, dermatite ou lesões.

Como ler essa tabela

Os resultados são médias de grupos, medidos em centímetros ou pontos de escala, quase sempre em até 3 meses. Use o mesmo método de medida antes e depois e combine a expectativa com a cliente por escrito. O equipamento precisa ter registro na Anvisa e ser usado conforme o manual.

"Enzimas", hidrolipo e quem pode aplicar

Evidência fraca e alertas oficiais. A Anvisa proibiu a fosfatidilcolina injetável (sem registro no país) depois de infecções e paniculites, e em 2003 recomendou banir a intradermoterapia para fins estéticos. O ácido desoxicólico tem registro, mas a bula restringe a indicação à **gordura submental** em adultos e a aplicação a **médico**. Em 12/2023, a FDA alertou para cicatrizes permanentes, infecções graves, deformidades e nódulos dolorosos com "injeções que dissolvem gordura" não aprovadas.

1

"Enzimas" e intradermoterapia

Não existe cosmético injetável: pela Anvisa (2023), o que entra na pele por agulha precisa de registro como medicamento ou produto para a saúde. Em 2022, a agência proibiu um produto de "intradermoterapia pressurizada" para glúteos. Os estudos são pequenos e o risco principal é infecção por falha de técnica estéril.

2

Hidrolipoclasia

Injeção de soro, com ou sem lipolíticos, seguida de ultrassom. O CRM-PR (Parecer 2.173/2010) não achou publicações que a sustentem e cita infecções por micobactéria após o procedimento. O CREFITO-2 (RJ) a reconhece como recurso do fisioterapeuta. O estudo de tecido que encontramos foi feito em porcos.

"Lipo sem corte" é nome de anúncio

Nenhuma norma define esse procedimento. Lipoaspiração é cirurgia, com regras do CFM (Res. 1.711/2003) e sem finalidade de emagrecer. Em anúncios, o termo aparece para criolipólise, radiofrequência, ultrassom, "enzimas" e hidrolipoclasia. Diga à cliente qual técnica é, o que a evidência mostra e o resultado médio esperado.

Profissão	Injetáveis corporais: situação em outubro de 2026
Enfermagem Cofen 529/2016, 626/2020, 715/2023	Exige pós em estética com 100h práticas e registro no Coren. A Justiça Federal (TRF1, mantido em 07/2026) anulou parte da 529: estão vedados microagulhamento, laser, criolipólise, intradermoterapia e peelings. Carboxiterapia segue na lista da Res. 626/2020.
Fisioterapia COFFITO, Acórdãos 293/2012 e 636/2023	Carboxiterapia é recurso da dermatofuncional. Intradermoterapia exige curso de 30h aprovado e apostilamento no Crefito. Em 02/2026, a JF de Santo Ângelo (RS) proibiu uma fisioterapeuta de aplicá-la (decisão individual, cabe recurso).
Biomedicina CFBM 241/2014	A resolução que incluía intradermoterapia e carboxiterapia foi anulada a pedido do CFM; o TRF1 manteve a anulação em 03/2026 (cabe recurso).
Farmácia CFF 573/2013, 616/2015, 645/2017	A 573 está suspensa (STF, 06/2024). O CFF sustenta que a 616 e a 645 seguem válidas e recorre.
Esteticistas Lei 13.643/2018	Cosméticos, técnicas e equipamentos registrados na Anvisa. A lei exclui a estética médica e não prevê injetáveis.

A Lei do Ato Médico (12.842/2013) reserva ao médico o procedimento invasivo estético, mas os incisos que definiam invasão da pele e do subcutâneo foram vetados: daí as disputas.



Avalie, meça e registre

- 1 Anamnese e triagem.** Gestação, medicamentos (corticoide), doenças ligadas ao frio antes da criolipólise, infecção ou lesão na área. Encaminhe ao médico o que fugir da estética.
- 2 Medidas com técnica fixa.** Peso, altura, IMC e cintura no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, em pé, ao fim da expiração (norma do SISVAN). Para coxa, abdome e quadril, anote o marco usado e repita sempre o mesmo.
- 3 Fotos padronizadas e escala.** Mesma luz, distância e postura, em pé e deitada, para pontuar Nürnberger-Müller e Hexsel. A bioimpedância aparece nos estudos como medida complementar, nunca como única.

CÁLCULO RESOLVIDO

M., 36 anos, celulite nas coxas, flancos e estrias albas pós-gestação (caso fictício)

IMC: $64,0 \text{ kg} \div (1,64 \text{ m})^2 = 23,8 \text{ kg/m}^2$ (eutrófica) · cintura 78,0 cm (abaixo de 80 cm)

Hexsel: depressões 2 + profundidade 1 + elevações 2 + flacidez 1 + Nürnberger-Müller II = 2 → **8 pontos, moderada**

Estrias albas: objetivo é textura e cor, com microagulhamento por profissional habilitado no conselho

Reavaliação em 12 semanas: cintura 78,0 → 75,5 cm = **-2,5 cm (-3,2%)**

Leitura: é queixa de contorno, não de obesidade. Protocolo sem injetável de "enzima", com resultado medido pela mesma técnica e foto do início.

FERRAMENTA PARA PREENCHER

Ficha de avaliação corporal

Medida	Marco anatômico	Data 1	Data 2	Data 3
Peso · altura · IMC	Balança e estadiômetro			
Cintura	Meio entre costela e crista ilíaca			
Abdome				
Quadril				
Coxa D · E	___ cm acima da patela			
Hexsel (CSS) · grau N-M	Foto em pé e deitada			
Estrias	Rubras / albas · local			

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram abertas em 04/10/2026. A coluna "nível" da Parte 2, a ficha e o caso fictício foram montados pela ITH a partir dessas fontes, sem citar marcas.

- 01 **Hexsel DM et al. A validated photonumeric cellulite severity scale. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2009**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19220646
- 02 **Mlosek RK, Malinowska S. Diagnostics, 2024 (graus de Nürnberger-Müller); revisão sobre ultrassom na celulite, J Clin Med, 2026 (prevalência)**
europepmc.org: PMC11393914 · MED/41682624
- 03 **Lokhande AJ, Mysore V. Striae Distensae Treatment Review and Update. Indian Dermatol Online J, 2019**
europepmc.org/article/PMC/PMC6615396
- 04 **Ministério da Saúde: Linha de Cuidado da Obesidade no Adulto e Norma Técnica do SISVAN (2011)**
linhasdecuidado.saude.gov.br · bvsm.saude.gov.br
- 05 **Lim SK et al. Aesthetic Plast Surg, 2025 e Longano C et al. Lasers Med Sci, 2024: revisões sistemáticas sobre celulite**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39547984 · /38695965
- 06 **Sadowski T et al. Int J Cosmet Sci, 2020 (massagem vibratória); Alizadeh Z et al. Int J Endocrinol Metab, 2016 (contorno corporal)**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32181499 · /28123436
- 07 **Criolipólise: Ravindran R, Obes Rev, 2025; Mah AE, Aesthet Surg J Open Forum, 2025; Ingargiola MJ, Plast Reconstr Surg, 2015**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40211915 · /41322038 · /26017594
- 08 **Carboxiterapia: Sherif R, Plast Reconstr Surg, 2026; Bagherani N, Arch Dermatol Res, 2025**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42154480 · /40459592
- 09 **Sun X et al. Microagulhamento para estrias: revisão sistemática e meta-análise. Aesthetic Plast Surg, 2024**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38509316
- 10 **Assumpção RTMD, Machado Filho CDS. Arq Med ABC, 2005 (fosfatidilcolina); Jayasinghe S et al. Obes Rev, 2013 (mesoterapia)**
portalnepas.org.br/amabc · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23800269
- 11 **Bula do ácido desoxicólico para o profissional de saúde (Reg. Anvisa 1.0147.0185)**
allergan-web-cdn-prod.azureedge.net (bula profissional)
- 12 **FDA: fat-dissolving injections that are not FDA approved can be harmful, 20/12/2023**
fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely
- 13 **Anvisa: alerta sobre produtos estéticos usados de forma injetável (Alerta GGMON 03/2023), 21/08/2023**
gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2023
- 14 **CRM-PR, Pareceres 2.079/2009 e 2.173/2010; Godoy FB et al. J Cutan Aesthet Surg, 2011 (hidrolipoclasia em suínos)**
sistemas.cfm.org.br/normas · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21976901
- 15 **Lei nº 12.842/2013 (Ato Médico) e Lei nº 13.643/2018 (esteticistas)**
planalto.gov.br/ccivil_03
- 16 **Coren-PR, guia Enfermagem Estética 2025 (Res. Cofen 529, 626 e 715); SBD, decisão do TRF1 sobre a Res. 529, 21/07/2026**
corenpr.gov.br · sbd.org.br
- 17 **TRF1, 7ª Turma: anulação da Res. CFBM 241/2014 (proc. 0067987-48.2015.4.01.3400), 17/03/2026**
trf1.jus.br/trf1/noticias
- 18 **COFFITO, Acórdão 636/2023; CREFITO-15 (Acórdão 293/2012); CREFITO-2, Acórdão 20/2020; JF Santo Ângelo/RS, 13/02/2026**
coffito.gov.br · crefito15.org.br · jurinews.com.br
- 19 **CFF: nota de esclarecimento sobre a atuação do farmacêutico na saúde estética, 21/06/2024**
site.cff.org.br

Ressalvas. Normas profissionais em estética estão em disputa judicial e mudam com frequência: confira a situação do seu conselho antes de cada técnica. Os resultados das revisões são médias de estudos pequenos e de curto prazo. Avaliação individual, prescrição médica quando exigida e o manual do equipamento registrado na Anvisa prevalecem.

• PARA IR ALÉM

Quer montar protocolo corporal com método e segurança?

Escolher a tecnologia certa depende de avaliar, medir e saber o que a sua norma permite. A Pós em Saúde Estética Avançada da ITH reúne facial, corporal e capilar, com várias vivências clínicas em pacientes modelo e mais de 30 técnicas.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ Várias vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

80–98%

das mulheres têm celulite depois da puberdade

–3,56 cm

na cintura, em média, 12 semanas após criolipólise

1 em 455

casos de hiperplasia adiposa paradoxal na meta-análise

Submental

única indicação em bula do ácido desoxicólico