

Transformaciones en imágenes

Araguás, Gastón Redolfi, Javier

10 de abril del 2019

Coordenadas homogeneas

Puntos y rectas

Un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ puede representarse por el vector \mathbf{x} formado por sus coordenadas

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [x, y]^T$$

Coordenadas homogeneas

Puntos y rectas

Un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ puede representarse por el vector \mathbf{x} formado por sus coordenadas

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [x, y]^T$$

Una recta en el plano $ax + by + c = 0$ puede representarse por el vector \mathbf{l} formado por las constantes que la definen

$$\mathbf{l} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = [a, b, c]^T$$

Coordenadas homogeneas

Puntos y rectas

Un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ puede representarse por el vector \mathbf{x} formado por sus coordenadas

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [x, y]^T$$

Una recta en el plano $ax + by + c = 0$ puede representarse por el vector \mathbf{l} formado por las constantes que la definen

$$\mathbf{l} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = [a, b, c]^T$$

Pero el vector $\mathbf{l} = [ka, kb, kc]^T$, con $k \neq 0$, representa la misma recta, de donde:

- Una recta tienen 2 DOF, dado por los cocientes de sus componentes $\{a : b : c\}$.
- Estos vectores equivalentes se conocen como vectores homogeneos.
- El conjunto de vectores homogeneos en \mathbb{R}^3 , menos el vector $[0, 0, 0]^T$, forman el espacio proyectivo \mathbb{P}^2 .

Coordenadas homogeneas

Puntos y rectas

Entonces ... un punto (x_1, y_1) pertenece a la recta l si $ax_1 + by_1 + c = 0$, o bien,

$$[x_1, y_1, 1][a, b, c]^T = 0$$

Coordenadas homogeneas

Puntos y rectas

Entonces ... un punto (x_1, y_1) pertenece a la recta l si $ax_1 + by_1 + c = 0$, o bien,

$$[x_1, y_1, 1][a, b, c]^T = 0$$

pero para el mismo punto se tiene que $kax_1 + kby_1 + kc = 0$, lo que puede escribirse como

$$[kx_1, ky_1, k][a, b, c]^T = 0$$

los vectores $[kx_1, ky_1, k]^T$ y $[x_1, y_1, 1]^T$ representan el mismo punto.

Coordenadas homogneas

Puntos y rectas

Entonces ... un punto (x_1, y_1) pertenece a la recta l si $ax_1 + by_1 + c = 0$, o bien,

$$[x_1, y_1, 1][a, b, c]^T = 0$$

pero para el mismo punto se tiene que $kax_1 + kby_1 + kc = 0$, lo que puede escribirse como

$$[kx_1, ky_1, k][a, b, c]^T = 0$$

los vectores $[kx_1, ky_1, k]^T$ y $[x_1, y_1, 1]^T$ representan el mismo punto.

Por lo que ... el vector $[x_1, y_1, 1]^T$ es la representación del punto (x_1, y_1) en coordenadas homogneas.

Punto en coordenadas homogneas

Un punto en el plano de coordenadas finitas $(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3})$, (con $x_3 \neq 0$), se representa en coordenadas homogneas por el vector $\mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$ dado por

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$$

Nota: Un punto también tiene dos DOF, dados por $\{x_1 : x_2 : x_3\}$

Coordenadas homogneas

Rectas y puntos

Por lo anterior ...

Punto en una recta

Sean el punto $\mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$ y la recta $\mathbf{l} \in \mathbb{P}^2$, entonces \mathbf{x} está en \mathbf{l} si

$$\mathbf{x}^T \mathbf{l} = \mathbf{l}^T \mathbf{x} = ax + by + c = 0$$

Coordenadas homogeneas

Rectas y puntos

Por lo anterior ...

Punto en una recta

Sean el punto $\mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$ y la recta $\mathbf{l} \in \mathbb{P}^2$, entonces \mathbf{x} está en \mathbf{l} si

$$\mathbf{x}^T \mathbf{l} = \mathbf{l}^T \mathbf{x} = ax + by + c = 0$$

Observación: El producto escalar entre \mathbf{x} y \mathbf{l} también es nulo, ya que

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{l} = ax + by + c = 0$$

por lo que los vectores homogeneos son perpendiculares.

Coordenadas homogneas

Rectas y puntos

Intersección de dos rectas

Sean l_1 y l_2 dos rectas en \mathbb{P}^2 . Definiendo $\mathbf{x} = l_1 \times l_2$, que es un vector perpendicular a ambas rectas, tal que el producto escalar

$$l_1 \cdot (l_1 \times l_2) = l_2 \cdot (l_1 \times l_2) = 0$$

es decir

$$l_1^T \mathbf{x} = l_2^T \mathbf{x} = 0$$

luego, si \mathbf{x} representa a un punto, este es el punto de intersección de l_1 y l_2 .

Coordenadas homogneas

Rectas y puntos

Recta por dos puntos

Sean \mathbf{x}_1 y \mathbf{x}_2 dos puntos en \mathbb{P}^2 . Definiendo $\mathbf{l} = \mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$ se tiene

$$\mathbf{l}^T \mathbf{x}_1 = \mathbf{l}^T \mathbf{x}_2 = 0$$

luego, el vector $\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$ representa a la recta \mathbf{l} que pasa por los puntos \mathbf{x}_1 y \mathbf{x}_2 .

Coordenadas homogneas

Rectas y puntos

Recta por dos puntos

Sean \mathbf{x}_1 y \mathbf{x}_2 dos puntos en \mathbb{P}^2 . Definiendo $\mathbf{l} = \mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$ se tiene

$$\mathbf{l}^T \mathbf{x}_1 = \mathbf{l}^T \mathbf{x}_2 = 0$$

luego, el vector $\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$ representa a la recta \mathbf{l} que pasa por los puntos \mathbf{x}_1 y \mathbf{x}_2 .

Dualidad

Debido a la representación dual de rectas y puntos, los enunciados tiene siempre su forma dual.

En este caso la recta que pasa por dos puntos es dual al anterior, que puede leerse como “el punto que pasa por dos rectas”.

Coordenadas homogeneas

Rectas paralelas - Punto en el infinito

Que pasa con las paralelas?

Intersección de rectas paralelas

Sean $\mathbf{l} = [a, b, c]^T$ y $\mathbf{l}' = [a, b, c']^T$ dos rectas paralelas en \mathbb{P}^2 , la intersección de las rectas \mathbf{l} y \mathbf{l}' será

$$\mathbf{x} = \mathbf{l} \times \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T$$

con \mathbf{x} un punto ideal o punto en el infinito.

Coordenadas homogneas

Rectas paralelas - Punto en el infinito

Que pasa con las paralelas?

Intersección de rectas paralelas

Sean $\mathbf{l} = [a, b, c]^T$ y $\mathbf{l}' = [a, b, c']^T$ dos rectas paralelas en \mathbb{P}^2 , la intersección de las rectas \mathbf{l} y \mathbf{l}' será

$$\mathbf{x} = \mathbf{l} \times \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T$$

con \mathbf{x} un punto ideal o punto en el infinito.

Punto en el infinito

Un punto en \mathbb{P}^2 de coordenadas

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, 0]^T$$

no representa ningún punto finito en el plano, se le llama punto ideal o punto en el infinito.

Coordenadas homogeneas

Recta en el infinito

Recta en el infinito

Todo punto ideal $\mathbf{x} = [x_1, x_2, 0]^T$ pertenece a la recta $\mathbf{l}_\infty = [0, 0, 1]^T$, ya que

$$\mathbf{x}^T \mathbf{l}_\infty = 0$$

\mathbf{l}_∞ se llama recta en el infinito.

Coordenadas homogneas

Recta en el infinito

Recta en el infinito

Todo punto ideal $\mathbf{x} = [x_1, x_2, 0]^T$ pertenece a la recta $\mathbf{l}_\infty = [0, 0, 1]^T$, ya que

$$\mathbf{x}^T \mathbf{l}_\infty = 0$$

\mathbf{l}_∞ se llama recta en el infinito.

Intersección con \mathbf{l}_∞

La intersección de las rectas paralelas \mathbf{l} y \mathbf{l}' con \mathbf{l}_∞ es en el punto ideal $\mathbf{x} = [b, -a, 0]^T$ (recordar que $\mathbf{l} \times \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T$)

$$[b, -a, 0]^T \mathbf{l} = [b, -a, 0]^T \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T \mathbf{l}_\infty = 0$$

Coordenadas homogneas

Recta en el infinito

Recta en el infinito

Todo punto ideal $\mathbf{x} = [x_1, x_2, 0]^T$ pertenece a la recta $\mathbf{l}_\infty = [0, 0, 1]^T$, ya que $\mathbf{x}^T \mathbf{l}_\infty = 0$

\mathbf{l}_∞ se llama recta en el infinito.

Intersección con \mathbf{l}_∞

La intersección de las rectas paralelas \mathbf{l} y \mathbf{l}' con \mathbf{l}_∞ es en el punto ideal $\mathbf{x} = [b, -a, 0]^T$ (recordar que $\mathbf{l} \times \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T$)

$$[b, -a, 0]^T \mathbf{l} = [b, -a, 0]^T \mathbf{l}' = [b, -a, 0]^T \mathbf{l}_\infty = 0$$

- Notar que el vector $[b, -a]^T \in \mathbb{R}^2$ representa la dirección de la recta $\mathbf{l} = [a, b, c]^T$. Por lo tanto

$$\mathbf{l}_\infty : \{\text{Conjunto de direcciones de rectas de } \mathbb{R}^2\}$$

Transformaciones proyectivas

Definición

Definición

Una proyectividad es un mapa invertible h de \mathbb{P}^2 en \mathbb{P}^2 que lleva un conjunto de puntos $\{x_1, \dots, x_n\}$ pertenecientes a una recta a otro conjunto $\{h(x_1), \dots, h(x_n)\}$ pertenecientes también a una recta.

es decir **mapea rectas en rectas**.

Transformaciones proyectivas

Definición

Definición

Una proyectividad es un mapa invertible h de \mathbb{P}^2 en \mathbb{P}^2 que lleva un conjunto de puntos $\{x_1, \dots, x_n\}$ pertenecientes a una recta a otro conjunto $\{h(x_1), \dots, h(x_n)\}$ pertenecientes también a una recta.

es decir **mapea rectas en rectas**.

- Proyectividad, transformación proyectiva, homografía, colinealidad, son sinónimos.
- Las homografías forman un grupo, ya que su inversa también es una homografía, como también la composición de homografías es otra homografía.

Transformaciones proyectivas

Definición

En términos algebraicos

Definición

Un mapa lineal $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía si y sólo si existe una matriz H 3×3 invertible tal que

$$h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$$

Prueba 1: Si $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía entonces existe una matriz H 3×3 invertible que cumple $h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$

Transformaciones proyectivas

Definición

En términos algebraicos

Definición

Un mapa lineal $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía si y sólo si existe una matriz H 3×3 invertible tal que

$$h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$$

Prueba 1: Si $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía entonces existe una matriz H 3×3 invertible que cumple $h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$

Se complica...

Transformaciones proyectivas

Definición

En términos algebraicos

Definición

Un mapa lineal $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía si y sólo si existe una matriz H 3×3 invertible tal que

$$h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$$

Prueba 1: Si $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía entonces existe una matriz H 3×3 invertible que cumple $h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$

Se complica...

Prueba 2: Si H 3×3 es una matriz invertible entonces es una homografía.

Transformaciones proyectivas

Definición

En términos algebraicos

Definición

Un mapa lineal $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía si y sólo si existe una matriz H 3×3 invertible tal que

$$h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$$

Prueba 1: Si $h : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ es una homografía entonces existe una matriz H 3×3 invertible que cumple $h(\mathbf{x}) = H\mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{P}^2$

Se complica...

Prueba 2: Si H 3×3 es una matriz invertible entonces es una homografía.

Sean $\mathbf{x}_i, i = 1, \dots, n$ puntos en l tal que $l^T \mathbf{x}_i = 0$. Sea H una matriz 3×3 invertible, se verifica que

$$l'^T H^{-1} H \mathbf{x}_i = (H^{-T} l)^T H \mathbf{x}_i = 0$$

todos los puntos $H \mathbf{x}_i$ pertenecen a la recta $l' = H^{-T} l$.

Transformaciones proyectivas

Puntos y Rectas

Transformación de puntos

Una homografía mapea el punto $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ mediante
$$\mathbf{x}' = H\mathbf{x}$$

- La proyección no cambia si se multiplica H por cualquier escalar distinto de cero.

Transformaciones proyectivas

Puntos y Rectas

Transformación de puntos

Una homografía mapea el punto $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ mediante
$$\mathbf{x}' = H\mathbf{x}$$

- La proyección no cambia si se multiplica H por cualquier escalar distinto de cero.
- Se dice que H está definida hasta un factor de escala. Por lo tanto H tiene 8 DOF.

Transformaciones proyectivas

Puntos y Rectas

Transformación de puntos

Una homografía mapea el punto $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ mediante
$$\mathbf{x}' = H\mathbf{x}$$

- La proyección no cambia si se multiplica H por cualquier escalar distinto de cero.
- Se dice que H está definida hasta un factor de escala. Por lo tanto H tiene 8 DOF.
- H es una matriz homogénea.

Transformaciones proyectivas

Puntos y Rectas

Transformación de puntos

Una homografía mapea el punto $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}'$ mediante

$$\mathbf{x}' = H\mathbf{x}$$

- La proyección no cambia si se multiplica H por cualquier escalar distinto de cero.
- Se dice que H está definida hasta un factor de escala. Por lo tanto H tiene 8 DOF.
- H es una matriz homogénea.

Transformación de rectas

De la prueba 2 dada en la definición de homografía

$$\begin{aligned} \mathbf{l}^T H^{-1} H \mathbf{x} &= (H^{-T} \mathbf{l})^T H \mathbf{x} = 0 \\ (\mathbf{l}')^T \mathbf{x}' &= 0 \end{aligned}$$

y la recta \mathbf{l} es mapeada a $\mathbf{l}' = H^{-T} \mathbf{l}$.

Jerarquía de transformaciones

Isometría

Isometría

Una isometría es una transformación que **preserva distancia** Euclidea.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \varepsilon \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

con $\varepsilon = \pm 1$.

Jerarquía de transformaciones

Isometría

Isometría

Una isometría es una transformación que **preserva distancia** Euclidea.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \varepsilon \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

con $\varepsilon = \pm 1$.

Si $\varepsilon = 1$, se llama transformación Euclidea, que además **preserva orientación**.

Jerarquía de transformaciones

Isometría

Isometría

Una isometría es una transformación que **preserva distancia** Euclidea.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \varepsilon \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

con $\varepsilon = \pm 1$.

Si $\varepsilon = 1$, se llama transformación Euclidea, que además **preserva orientación**.

Es lo que conocemos como **transformación del cuerpo rígido**.

Jerarquía de transformaciones

Isometría

Transformación Euclídea

$$\mathbf{x}' = H_E \mathbf{x} = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

con R una matriz de rotación de 2×2 ($RR^T = R^T R = I$), $\mathbf{0}^T = (0, 0)^T$ y \mathbf{t} un vector de traslación.

- H_E tiene 3 DOF, uno de la rotación y dos de la traslación.

Invariantes

Cantidades que se preservan en una transformación. Longitudes, ángulos, orientación y áreas son invariantes de H_E .

Jerarquía de transformaciones

Similaridad

Similaridad

Una similaridad es una isometría con escalado isotrópico.

$$\mathbf{x}' = H_S \mathbf{x} = \begin{bmatrix} sR & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

- H_S tiene 4 DOF, uno de la rotación, dos de la traslación y el escalado s .
- Esta transformación queda definida mediante un par de puntos correspondientes $\mathbf{x}' \leftrightarrow \mathbf{x}$.

Invariantes

Ángulos entre rectas, paralelismo, relación entre áreas son invariantes de H_S .

Jerarquía de transformaciones

Transformación afín

Transformación afín

Es una transformación no singular (invertible) seguida de una traslación.

Se puede escribir

$$\mathbf{x}' = H_A \mathbf{x} = \begin{bmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

con A una matriz no singular.

- H_A tiene 6 DOF y puede ser recuperada con 3 puntos correspondientes $\mathbf{x}' \leftrightarrow \mathbf{x}$.

Jerarquía de transformaciones

Transformación afín

Que hace A ?

Descomposición SVD

Puede verse mas claramente la acción de A a partir de su descomposición SVD

$$A = UDV = (UV)V^{-1}DV$$

$$A = R(\theta)R(-\varphi)DR(\varphi); \quad \text{con } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

λ_1 y λ_2 son los valores singulares de A .

Jerarquía de transformaciones

Transformación afín

Que hace A ?


Descomposición SVD

Puede verse mas claramente la acción de A a partir de su descomposición SVD

$$A = UDV = (UV)V^{-1}DV$$

$$A = R(\theta)R(-\varphi)DR(\varphi); \quad \text{con } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

λ_1 y λ_2 son los valores singulares de A .



- El escalado es no isotrópico pero actúa en direcciones ortogonales.
- Si $\det A > 0$, la transformación preserva dirección.

Jerarquía de transformaciones

Transformación afín

Invariantes

Paralelismo: Dos rectas paralelas intersectan a l_∞ en el punto $[x_1, x_2, 0]^T$, luego de la transformación

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = [x'_1, x'_2, 0]$$

Razón entre longitudes de segmentos paralelos: El escalado es común a rectas de igual dirección.

Razón entre áreas: Las áreas son todas escaladas una cantidad $\lambda_1 \lambda_2$.

Jerarquía de transformaciones

Transformación proyectiva

Transformación proyectiva

Es una transformación general invertible de forma

$$\mathbf{x}' = H_P \mathbf{x} = \begin{bmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{v}^T & v \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

con $\mathbf{v}^T = [v_1, v_2]$ y v un escalar.

- H_P tiene 8 DOF (los 9 elementos menos la escala) y puede computarse con 4 puntos correspondientes (3 deben ser no colineales).
- Mapea puntos ideales en puntos finitos

$$\begin{bmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{v}^T & v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \mathbf{t} \\ v_1 x_1 + v_2 x_2 \end{bmatrix}$$

Jerarquía de transformaciones

Transformación proyectiva

Descomposición

Cualquier H puede obtenerse componiendo las transformaciones anteriores

$$H = H_P H_A H_S$$

donde H_S tiene 4 DOF, H_A tiene 2 DOF mas y H_P 2 DOF mas, para hacer un total de 8 DOF.


Conociendo donde fue mapeado algún invariante de un espacio, pueden recuperarse las propiedades correspondientes.

Estimación de H

Rectificación Afín

Ejemplo: conociendo donde fue mapeada l_∞ (dos DOF) luego de una transformación proyectiva, se pueden recuperar las propiedades afín.

Sea $l'_\infty = [l_1, l_2, l_3]^T$ la imagen de $l_\infty = [0, 0, 1]^T$.



Luego si $l_3 \neq 0$ se puede elegir H_{PA} tal que $H_{PA}^{-T} l'_\infty = l_\infty$

$$H_{PA}^{-T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{l_1}{l_3} \\ 0 & 1 & -\frac{l_2}{l_3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{l_3} \end{bmatrix} \Rightarrow H_{PA} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{bmatrix}$$

Aplicando H_{PA} a todos los puntos se realiza una “rectificación afín”

Estimación de H

Rectificación Completa

Ejemplo: si se conocen 4 pares de puntos correspondientes, la rectificación puede ser completa (8 DOF).

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} y'_1 &= \frac{y_1}{y_3} = \frac{h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3}{h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3} \\ y'_2 &= \frac{y_2}{y_3} = \frac{h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3}{h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3} \end{aligned}$$

y cada punto genera dos ecuaciones

$$y'_1(h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3) = h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3$$


$$y'_2(h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3) = h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3$$

Usando notación matricial

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & 0 & 0 & 0 & -x_1y'_1 & -x_2y'_1 & -x_3y'_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & x_2 & x_3 & -x_1y'_2 & -x_2y'_2 & -x_3y'_2 \end{bmatrix} [\mathbf{h}] = 0$$

Estimación de H

Rectificación Completa



$$\begin{array}{lll} H \text{ mapea} & \begin{array}{l} \mathbf{x}_1 = [35, 80, 1]^T \\ \mathbf{x}_2 = [35, 16, 1]^T \\ \mathbf{x}_3 = [131, 65, 1]^T \\ \mathbf{x}_4 = [131, 30, 1]^T \end{array} & \text{en} \quad \begin{array}{l} \mathbf{y}_1 = [35, 80, 1]^T \\ \mathbf{y}_2 = [35, 16, 1]^T \\ \mathbf{y}_3 = [153, 80, 1]^T \\ \mathbf{y}_4 = [153, 16, 1]^T \end{array} \quad \text{es decir } \mathbf{y}_i = H\mathbf{x}_i \end{array}$$

Aplicando H a todos los puntos se realiza una “rectificación completa”