

线性代数 A 试题 B 卷

一、(10分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AXA^{-1} = 2XA^{-1} + BA^*$,

求 X 。

解：由 $AXA^{-1} = 2XA^{-1} + BA^*$ 知

$$AX = 2X + |A|B,$$

而 $|A| = 4$ 所以

$$X = 4(A - 2I)^{-1}B \dots \dots \dots 5$$

$$\because A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \therefore (A - 2I)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

所以

$$X = 4 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 10$$

二、(10分) 已知

$$\alpha_1 = (2, 1, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 1), \alpha_3 = (0, 1, 2), \alpha_4 = (0, 1, 2)$$

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和一个极大无关组;

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

解:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & -1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 5$$

所以求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为极大无关组... .. 8

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \dots \dots \dots 10$$

三、(10分) 在 $F[x]_4$ 中, 求自然基 $1, x, x^2, x^3$ 到基 $1, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 的过渡矩阵, 以及 $h(x) = 1 - x + x^2 - x^3$ 在后一个基下的坐标。

解: 过渡矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 5$

$h(x) = -1 + 3x + 2x^3$ 在后一个基下的坐标

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \dots \dots \dots 10$$

四、(10分) 设 V 是由实数域上的全体 2 阶矩阵构成的线性空间, 在 V 上定义映射 σ :

$\sigma(X) = AX - XA$, 其中 X 为任意矩阵, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 为 V 中某一取定矩阵。

- (1) 证明: σ 为 V 上的一个线性变换;
- (2) 证明: 对任意的 $X, Y \in V$ 都有 $\sigma(XY) = \sigma(X)Y + X\sigma(Y)$;
- (3) 求 σ 在基 $E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵。

解: (1) 对任意的 $X, Y \in V, k, l \in R$ 都有

$$\begin{aligned} \sigma(kX + lY) &= A(kX + lY) - (kX + lY)A \\ &= kAX + lAY - kXA - lYA \\ &= k(AX - XA) + l(AY - YA) \\ &= k\sigma(X) + l\sigma(Y) \end{aligned}$$

所以 σ 为 V 上的一个线性变换。... .. 3

(2) 对任意的 $X, Y \in V$ 有

$$\begin{aligned} \sigma(XY) &= AXY - XYA \\ &= AXY - XAY + XAY - XYA \\ &= (AX - XA)Y + X(AY - YA) \\ &= \sigma(X)Y + X\sigma(Y) \end{aligned}$$

... .. 6

(3) 根据 σ 的定义, 有

$$\begin{aligned}\sigma(I_{11}) &= A I_{11} - I_{11} A = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{bmatrix}, \\ \sigma(I_{12}) &= A I_{12} - I_{12} A = \begin{bmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{bmatrix}, \\ \sigma(I_{21}) &= A I_{21} - I_{21} A = \begin{bmatrix} b & 0 \\ b-a & -b \end{bmatrix}, \\ \sigma(I_{22}) &= A I_{22} - I_{22} A = \begin{bmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

σ 在基 $I_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, I_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, I_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, I_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix} \dots \dots \dots .10$$

五、(10分) 设矩阵 A 和 B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

(1) 求 x 和 y 的值; (2) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ 。

解: (1) 由特征值的性质

$$x=2+y, \quad -x=y$$

解之得 $x=1, y=-1$ 5

(2) A 的特征值为 $-1, 1, 1$,

对应的特征向量分别是 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1)^T,$

取 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 或者 $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$

则 $P^{-1}AP = B$ 。10

六、(10分) 设 A 是 6 阶方阵, 且已知存在 6 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -a & 1 & & & & \\ & -a & & & & \\ & & b & & & \\ & & & c & 1 & \\ & & & & c & \\ & & & & & d \end{bmatrix}$$

- (1) 试写出 A 的初等因子；
 (2) 判断 P 的哪几列是 A 的特征向量。

解 (1) A 的初等因子为 $(\lambda+a)^2, (\lambda-b), (\lambda-c)^2, (\lambda-d) \dots \dots \dots 5$

(2) 由 $AP=PJ$ 得 P 的第一列, 第三列, 第四列, 第六列是分别对应于 $-a, b, c, d$ 的特征向量 $\dots \dots \dots 10$

七、(10分) 证明：若 n 阶方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量，则 A 一定可以对角化。

证明 设 A 的 n 个线性无关的特征向量为 x_1, x_2, \dots, x_n , 对应的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2, \dots, Ax_n = \lambda_n x_n \dots \dots \dots 4$$

也即

$$A[x_1, x_2, \dots, x_n] = [x_1, x_2, \dots, x_n] \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

令 $P = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, 则上式化为

$$AP = P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \dots \dots \dots 8$$

由于 x_1, x_2, \dots, x_n 线性无关，所以

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

所以 A 可以相似对角化。 $\dots \dots \dots 10$

八、(10分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

- (1) 判断该二次型的定性；(2) 用正交变换将其化为标准形并给出所用的正交变换。

$$\text{解：(1) 由 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 2 & -4 \\ 2 & \lambda-1 & 2 \\ -4 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-9),$$

得 A 的特征值为 $\lambda=0$ (二重), $\lambda=9$, 所以二次型半正定。 $\dots \dots \dots 5$

(2) 由 (1) A 的特征值为 $\lambda=0$ (二重), $\lambda=9$.

$\lambda=0$ 的特征向量为 $x_1 = (1 \ 2 \ 0)^T$, $x_2 = (0 \ 2 \ 1)^T$,

将其正交化有 $\xi_1 = (1, 2, 0)^T$, $\xi_2 = (-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, 1)^T$,

单位化 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0)^T$, $\xi_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(-4, 2, 5)^T$, 7

$\lambda = 9$ 的特征向量为 $x_3 = (2, 1, 2)^T$,

单位化 $\xi_3 = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^T$, 8

取 $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 作正交变换 $X = QY$, 二次型化为 $f = 9y_3^2$ 10

九、(10分) 设方程组
$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

(1) 证明：若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等，则此方程组无解；

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k (k \neq 0)$ ，且已知 β_1, β_2 是方程组的两个解，其中

$\beta_1 = [-1, 1, 1]^T, \beta_2 = [1, 1, -1]^T$ ，写出此方程组的通解。

(1) 证明：方程组增广矩阵行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{vmatrix}$ 为范德蒙行列式，

当 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等时， $D \neq 0$ ，所以方程组增广矩阵的秩 $r(\bar{A}) = 4$ ，而系数矩阵的秩 $r(A) \leq \min(3, 4) < 4$ ，故方程组无解。... .. 5

(2) 当 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k (k \neq 0)$ ，原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2 x_3 = k^3 \\ x_1 - kx_2 + k^2 x_3 = -k^3 \end{cases}$$

此时方程组系数矩阵的秩为 2，所以基础解系中只有一个解向量，令

$$x_0 = \beta_1 - \beta_2 = (-2, 0, 2)^T, x^* = \beta_1,$$

则方程组的通解为

$$X^* + kX_0, k \in R \dots \dots \dots 10$$

十 (10分) 已知四阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2015 & 1 & 0 \\ 2015 & 0 & 2015 & 0 \\ 1 & 2015 & 0 & 2015 \\ 0 & 0 & 2015 & 0 \end{pmatrix}$

(1) 求 $|A|$

(2) 有两个正特征值和两个负特征值。

解：(1) $|A| = 2015^4 \dots \dots \dots 3$

(2) A 为四阶实对称矩阵，因此其特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 为实数。

由 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$ 得 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 = 2015^4$, (1) $\dots \dots \dots 6$

这说明 A 的特征值或全为正，或全为负，或两正两负。

由 $tr A = 0$ 得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$, (2) $\dots \dots \dots 8$

由 (1) (2) 可知矩阵 A 的特征值必有 2 个为正数，2 个为负数。证毕。 $\dots \dots \dots 10$