


1.a. El gráfico de la red adopta la forma:



1.b. Note que nuestro nodo inicial es **2**. Así,

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>2</b>	$[0, -]$	<b>permanente</b>
3	$[0 + 4, 2]$	temporal
4	$[0 + 50, 2]$	temporal

La ruta más corta es hacia el nodo **3**. Luego su etiqueta adopta el estado permanente. Es decir,

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>2</b>	$[0, -]$	<b>permanente</b>
3	$[4, 2]$	<b>permanente</b>
4	$[50, 2]$	temporal

Desde el nodo **3** tenemos:

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>3</b>	$[4, 2]$	<b>permanente</b>
4	$[4 + 10, 3]$	temporal
5	$[4 + 20, 3]$	temporal

Note que también tenemos la siguiente etiqueta para el nodo 4,  $[50, 2]$ . Es decir, podemos llegar al nodo 4 desde el nodo 2 con un costo de 50 unidades, o pasando por el nodo 3 con un costo de 14 unidades. Esto lleva a:

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>2</b>	$[0, -]$	<b>permanente</b>
<b>3</b>	$[4, 2]$	<b>permanente</b>
4	$[50, 2]$	temporal
<b>4</b>	$[14, 3]$	<b>permanente</b>
5	$[24, 3]$	temporal

Ahora, desde el nodo 4 tenemos

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>4</b>	[14, 3]	<b>permanente</b>
6	[14 + 2, 4]	temporal

Otras rutas para llegar al nodo 6 desde el nodo 2, son las siguientes:

$$R_1 = \{2, 4, 6\}, \quad \phi(R_1) = 50 + 2 = 52,$$

$$R_2 = \{2, 3, 5, 6\}, \quad \phi(R_2) = 4 + 20 + 30 = 54,$$

es decir, podemos rotular el nodo **6** como permanente. Obteniendo,

Nodo	Etiqueta	Estado
<b>2</b>	[0, -]	<b>permanente</b>
<b>3</b>	[4, 2]	<b>permanente</b>
4	[50, 2]	temporal
<b>4</b>	[14, 3]	<b>permanente</b>
5	[24, 3]	temporal
<b>6</b>	[16, 4]	<b>permanente</b>

lo que lleva a la ruta óptima  $P_* = \{2, 3, 4, 6\}$  con  $\phi(P_*) = 4 + 10 + 2 = 16$ .

**2. Iteración 0:** Tenemos  $n = 4$ , con

$$C_0 = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 10 & 16 \\ \infty & 0 & 8 & 14 \\ 25 & \infty & 0 & 30 \\ \infty & 12 & 15 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_0 = \begin{pmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{pmatrix}.$$

**Iteración 1:** Sea  $k = 1$ . De este modo,

$$c_{23} = \min(c_{23}, c_{21} + c_{13}) = \min(8, \infty + 10) = 8,$$

$$c_{24} = \min(c_{24}, c_{21} + c_{14}) = \min(14, \infty + 16) = 14,$$

$$c_{32} = \min(c_{32}, c_{31} + c_{12}) = \min(\infty, 25 + 20) = 45,$$

$$c_{34} = \min(c_{34}, c_{31} + c_{14}) = \min(30, 25 + 16) = 30,$$

$$c_{42} = \min(c_{42}, c_{41} + c_{12}) = \min(12, \infty + 20) = 12,$$

$$c_{43} = \min(c_{43}, c_{41} + c_{13}) = \min(15, \infty + 10) = 15.$$

Es decir,

$$C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 10 & 16 \\ \infty & 0 & 8 & 14 \\ 25 & 45 & 0 & 30 \\ \infty & 12 & 15 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_1 = \begin{pmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 1 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{pmatrix}.$$

**Iteración 2:** Tenemos que  $k = 1$ , así

$$\begin{aligned} c_{13} &= \min(c_{13}, c_{12} + c_{23}) = \min(10, 20 + 8) = 10, \\ c_{14} &= \min(c_{14}, c_{12} + c_{24}) = \min(16, 20 + 14) = 16, \\ c_{31} &= \min(c_{31}, c_{32} + c_{21}) = \min(25, 45 + \infty) = 25, \\ c_{34} &= \min(c_{34}, c_{32} + c_{24}) = \min(30, 45 + 14) = 30, \\ c_{41} &= \min(c_{41}, c_{42} + c_{21}) = \min(\infty, 12 + \infty) = \infty, \\ c_{43} &= \min(c_{43}, c_{42} + c_{23}) = \min(15, 12 + 8) = 15. \end{aligned}$$

Luego,

$$C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 10 & 16 \\ \infty & 0 & 8 & 14 \\ 25 & 45 & 0 & 30 \\ \infty & 12 & 15 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 1 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{pmatrix}.$$

**Observación:**<sup>1</sup> Es posible verificar que:

$$C_4 = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 10 & 16 \\ 33 & 0 & 8 & 14 \\ 25 & 42 & 0 & 30 \\ 40 & 12 & 15 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_4 = \begin{pmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 3 & - & 2 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 \\ 3 & 4 & 4 & - \end{pmatrix}.$$

**3.** En este caso tenemos una red  $G = (N, A)$  con  $N = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ .

**Iteración 0:** Inicialmente, tenemos:

$$C_- = \emptyset, \quad \overline{C}_- = \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

**Iteración 1:** Comenzaremos por el nodo 0. Luego,

$$C_0 = \{0\}, \quad \overline{C}_0 = N - \{0\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

**Iteración 2:** Desde el nodo 0, el arco más corto es  $(0, 2)$  con longitud 13. Esto lleva a  $j^* = 2$ , así:

$$C_1 = C_0 \cup \{2\} = \{0, 2\}, \quad \overline{C}_1 = \overline{C}_0 - \{2\} = \{1, 3, 4\}.$$

**Iteración 3:** Desde el nodo 2 tenemos los siguientes arcos

$$(2, 1), \quad (2, 3), \quad (2, 4),$$

con longitudes 7, 43 y 57, respectivamente. Por tanto, escogemos el nodo 1, y  $j^* = 1$ . Luego,

$$C_2 = C_1 \cup \{1\} = \{0, 1, 2\}, \quad \overline{C}_2 = \overline{C}_1 - \{1\} = \{3, 4\}.$$

**Iteración 4:** Desde el nodo 1 podemos visitar los nodos  $(1, 3)$  y  $(1, 4)$  con longitudes 53 y 69, respectivamente. Sin embargo, deseamos conectar los nodos de manera de cubrir toda la

---

<sup>1</sup>No es requerido iterar 4 veces este procedimiento.

red. Por tanto, también podemos conectar el nodo 2 con el nodo 3 con una longitud de 43. De este modo  $j^* = 3$ , obteniendo:

$$C_3 = C_2 \cup \{3\} = \{0, 1, 2, 3\}, \quad \overline{C}_3 = \overline{C}_2 - \{3\} = \{4\}.$$

**Iteración 5:** Finalmente desde el nodo 3 conectamos el nodo 4 con longitud de arco 9. Es decir,  $j^* = 4$ , desde donde sigue que:

$$C_4 = C_3 \cup \{4\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad \overline{C}_4 = \overline{C}_3 - \{4\} = \emptyset,$$

y como  $\overline{C}_4 = \emptyset$  el algoritmo se detiene.

El árbol de expansión mínimo une los arcos:

$$(0, 2) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 4),$$

y tiene longitud total  $13 + 7 + 43 + 9 = 72$  unidades.