Bag Valve Mask (BVM)









мішок Амбу - Дві особи



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

Сядьте над головою пораненого, а ваш партнер - збоку від голови.



BCTABTE назофарингеальний дихальний шлях.



З'єднайте частини мішок Амбу. Підключіть маску до мішок Амбу.




Надіньте маску на рот і ніс 04 пораненого.



Розмістіть мізинець, безіменний, середній пальці уздовж нижньої щелепи потерпілого.



Покладіть великий палець на маску у верхній частині клапана.



Покладіть вказівний палець 07



Другою рукою повторіть попередні кроки з іншого боку маски.



Тримайте маску обома руками, щоб забезпечити щільне ущільнення та відсутність витоку повітря.



Другий рятувальник повільно стискає мішок обома руками протягом 1-2 секунд, поки грудна клітка не підніметься.

Спостерігайте за підйомом і опусканням грудей пораненого.

(1) Якщо грудна клітка не піднімається, переконайтеся, що маска не протікає, а голова нахилена, щоб дихальні шляхи були вільними.

(2) Якщо підйом і спад, КРОК 12.



ПРОДОВЖУЙТЕ СТИСНУТИ мішок кожні 5-6 секунд, частота 10-12 вдихів на хвилину.



ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, стежте за спонтанним диханням, періодично перевіряйте пульс.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.