

Контроль кровотечі з пахвової артерії




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі.
Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



01 ПІДНІМІТЬ кінцівку, щоб виявити та дослідити джерело кровотечі.

НАЙКРАЩЕ ПОЛОЖЕННЯ для пораненого сидючи. Якщо це неможливо, слід підняти пораненого для накладання еластичного бинта після зупинки кровотечі.



02 ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі.


03 ЗНЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.

ВАЖЛИВО - Якщо є кровоспинний засіб, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО.

Якщо нічого іншого немає, використовуйте чисту та суху тканину.



04 ВИСЯГНІТЬ руку пораненого, поклавши її собі на плече. Утримуйте цю позицію на кроках 5-13.



05 ЩІЛЬНО ПРИТИСНІТЬ марлю або кровоспинний засіб всередині рани. Заповніть порожнину протягом 90 секунд.

ПРИМІТКА. Використовуйте стільки марлі або кровоспинного засобу, скільки потрібно.

ВАЖЛИВО - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.



06 ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, щоб бинт або марля з гемостатичним засобом простягалися на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА. ДОДАЙТЕ більше марлі, якщо марля не виступає принаймні на 2-3 см над шкірою. Необхідний для тиску.



07 Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.

08 Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

ВАЖЛИВО – ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОБ КРОВ НЕ ПРОСОКІЛА крізь пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште пов'язку на місці. Тримайте тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

09a

Якщо використовується спеціальна пов'язка (гемостатична), зніміть стару і накладіть нову пов'язку всередину рани. Поверніться до кроку 3.

OR

09b

Якщо упакований з марлею, додайте ще марлі, утримуйте тиск 3 хвилини довше, доки кровотеча не зупиниться.

продовження на наступній сторінці...