

Знеболювальні препарати (довідка)

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

ПАРАЦЕТАМОЛ (ацетамінофен)

Ненаркотичний анальгетик та жарознижувальний засіб

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боєздатністю

дозування:

500 мг, 2 таблетки кожні 8 год

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до парацетамолу, вживання алкогольних напоїв, вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази



МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІЇ:

Висип, нудота, блювання, запаморочення, млявість, надмірне потовиділення, озноб або біль у животі при гострому отруєнні, підвищення печінкових проб, гіпоглікемія та гепаторенальна недостатність з токсичним ураженням печінки

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Холестирамін може зменшити всмоктування в кишківнику; барбітурати, карбамазепін, фенітоїн, рифампін і надмірне вживання алкоголю можуть збільшити ризик потенційної гепатотоксичності



ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 20-45 хв/1-2 год/3-4 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ :

Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання; НЕ давайте пораненим службовим собакам

Продовження на наступній сторінці...