



КРІКОТИРЕОТОМІЯ (За допомогою бужа)




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту
ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



ОЦІНІТЬ дихальні шляхи постраждалого (дивіться картки Розгинання голови/виведення підборіддя та Виведення нижньої щелепи)




35EPITЬ, підготуйте та перевірте все необхідне обладнання.




ПОКЛАДІТЬ постраждалого на спину, шия - у "нейтральній" позиції.

ПРИМІТКА: Якщо ви правша, розмістіться з правого боку від пораненого, якщо лівша - з лівого боку від пораненого.




ВИЗНАЧТЕ розташування перснещитоподібної (крікотиреоїдної) мембрани між щитоподібним та перснеподібним хрящем.


ПРИМІТКА: Крікотиреоїдна мембрана - це проміжок (провал) між двома хрящами.




ОЧИСТІТЬ місце доступу етиловим спиртом або йод-повідоном (якщо дозволяє час).




СТАБІЛІЗУЙТЕ гортань постраждалого недомінантною рукою.



ПДТВЕРДІТЬ правильність визначення місця доступу за допомогою вказівного пальця домінантної руки.



Зробіть вертикальний розріз довжиною 2,5-3 см через шкіру до крікотиреоїдної мембрани.



Ще раз ПІДТВЕРДІТЬ розташування крікотиреоїдної мембрани за допомогою вказівного пальця.

Продовження на наступній сторінці...