

знеоолювальні препарати (довідка)

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

MEJOKCIKAN

Нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), інгібітор ЦОГ-2, який використовується для знеболення та зниження температури

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боездатністю.

ДОЗУВАННЯ:

15 мг 1 раз на добу

(N)XRULL ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до НПЗП чи саліцилатів, астма, важке захворювання нирок або печінки; при призначенні вагітним слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками, якщо альтернативний варіант є ГІРШИМ



Набряк, грипоподібний синдром, біль у животі, діарея, диспепсія, нудота, виразка, шлунково-кишкова кровотеча, анемія, головний біль або безсоння

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Зниження ефекту інгібіторів АПФ та діуретиків, підвищення рівня літію та його токсичності, підвищення ризику шлунково-кишкової кровотечі при застосуванні разом з аспірином та варфарином

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30-60 хв/5-6 год/20-24 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ :

Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання; НЕ давайте пораненим службовим собакам





Продовження на наступній сторінці...