

Введення антибіотиків

ВАЖЛИВО -

У цій фармакологічній довідці TCCC подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов TCCC. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

МОКСИФЛОКСАЦИН

Антибіотик з групи фторхінолонів

Використовується всіма
військовослужбовцями (ASM),
бійцями-рятувальниками (CLS)
та бойовими медиками (СМС).

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти ліки перорально.

ДОЗУВАННЯ:	400 мг на день
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	перорально
ПРОТИПОКАЗИ:	Гіперчутливість до хінолонів, печінкова недостатність, сифіліс, аритмії, ішемія або інфаркт міокарда, подовження інтервалу QT, гіпокаліємія, прийом антритмічних препаратів класу IA або класу CI; при необхідності призначення препарату вагітним, за відсутності альтернативного лікарського засобу, слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками.
ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Запаморочення, головний біль, периферична нейпропатія, нудота, діарея, біль у животі, блювота, спотворення смаку, порушення функцій печінки, диспепсія та розрив сухожиль.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:	Залізо, цинк, антациди, алюміній, магній, кальцій і сульфат знижують всмоктування; атенолол, цизаприд, еритроміцин, антипсихотики, трициклічні антидепресанти, хінідин, прокаїнамід, аміодарон, соталол можуть подовжувати інтервал QT та призвести до хибнопозитивних результатів скринінгових тестів на опіати.



ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1 год/ 2 год/ 20-24 год.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Використайте моксифлоксацин з особистого набору CWMP пораненого бійця. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.

Продовження на наступній сторінці...