





Посібник з оцінки тактичної травми СТОРІНКА 6 з 7 - (6/7)

ДІЇ ТАКТИЧНО-ПОЛЬОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ



ВИДАТИ АНТИБІОТИКИ

- ПЕРЕВІРТЕСЬ на наявність алергії на ліки ПЕРЕД введенням будь-якого препарату.
- Призначте антибіотик з Військового набору таблеток для лікування ран (моксифлоксацин) притомним пораненим, які в змозі ковтати, у разі відкритих поранень. КАРТКА 42. Pt1
- Якщо поранений не в змозі приймати медикаменти перорально (знаходиться в стані шоку або непритомний) введіть йому ертапенем ВВ або ВМ. КАРТКА 42. Pt2



УПРАВЛІТЬСЯ РАНАМИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ

- Оцініть будь-які попередні медичні втручання, щоб переконатися, що вони правильні та залишаються ефективними.
- Огляньте та оцініть будь-які опіки. На опіки накласти суху стерильну пов'язку. Уникати переохолодження. КАРТКУ 46. Лікування опіків
- Оцініть наявність інших ран. При необхідності накласти пов'язки на відкриті рани живота, ампутовані кукси, пов'язки для закладених предметів.
 КАРТКА 43. Відкрита рана живота. 44. Об'єкт в тілі. 45. Перев'язка ампутацій.



БИНТАЖ БУДЬ-ЯКИХ ПЕРЕЛОМІВ. Будьте обережні, щоб не порушити будь-які пронизані предмети.

ДИВ. КАРТКУ 47. і 48. для шинування кінцівок (ковкий SAM і жорсткий)

ПРИМІТКА - Шина SAM є радіопрозорою, що означає, що вона не заважає рентгенівським променям.



РЕАНІМАЦІЯ ПОРАЖДЕННОГО НА ПОЛІ БОЮ ВІД ВИБУХУ АБО ПРОНИКАЛЬНОГО ПОРАНЕННЯ, БЕЗ ПУЛЬСУ, ДИХАННЯ, ОЗНАК ЖИТТЯ НЕ БУДЕ УСПІШНОЮ.

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ МЕДИЧНИХ ДИРЕКТОРІВ ЩОДО ЦЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Перед припиненням надання допомоги у разі травми грудної клітки пораненому без пульсу чи дихання слід виконати двосторонню голкову декомпресію, щоб переконатися, що причиною не є напружений пневмоторакс.

ДИВІТЬСЯ КАРТКУ 29. (Pt1 + Pt2) - Зверніться до медичного керівництва щодо цієї процедури.



СПІЛКУЙТЕСЯ

- Спілкуйтеся з пораненим, якщо це можливо.
- Повідомити тактичних керівників має включати, як мінімум, кількість поранених у порядку черговості, будь-яке необхідне спеціальне обладнання, кількість поранених, які йдуть або лежать на ношах.
- Спілкуйтеся з персоналом медичної евакуації. Організувати тактичну медичну евакуацію та допомогу.
- Спілкуйтеся з іншим медичним персоналом механізм травми та час її виникнення, тип травми, симптоми та життєві ознаки, проведене лікування.