

# Контроль кровотечі з пахвової артерії




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



**01** ПІДНІМІТЬ кінцівку, щоб виявити та дослідити джерело кровотечі.

**НАЙКРАЩЕ ПОЛОЖЕННЯ** для пораненого сидючи. Якщо це неможливо, слід підняти пораненого для накладання еластичного бинта після зупинки кровотечі.



**02** ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі.


**03** ЗНЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.

**ВАЖЛИВО** - Якщо є кровоспинний засіб, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО.

Якщо нічого іншого немає, використовуйте чисту та суху тканину.



**04** ВИСЯГНІТЬ руку пораненого, поклавши її собі на плече. Утримуйте цю позицію на кроках 5-13.



**05** ЩІЛЬНО ПРИТИСНІТЬ марлю або кровоспинний засіб всередині рани. Заповніть порожнину протягом 90 секунд.

**ПРИМІТКА.** Використовуйте стільки марлі або кровоспинного засобу, скільки потрібно.

**ВАЖЛИВО** - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.



**06** ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, щоб бинт або марля з гемостатичним засобом простягалися на 3-5 см над шкірою.

**ПРИМІТКА.** ДОДАЙТЕ більше марлі, якщо марля не виступає принаймні на 2-3 см над шкірою. Необхідний для тиску.



**07** Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.

**08** Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

**ВАЖЛИВО** – ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОБ КРОВ НЕ ПРОСОКІЛА крізь пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште пов'язку на місці. Тримайте тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

**09a**

Якщо використовується спеціальна пов'язка (гемостатична), зніміть стару і накладіть нову пов'язку всередину рани. Поверніться до кроку 3.

OR

**09b**


Якщо упакований з марлею, додайте ще марлі, утримуйте тиск 3 хвилини довше, доки кровотеча не зупиниться.

продовження на наступній сторінці...




# Контроль кровотока з пахвової артерії


## Продовження зі сторінки 1



- 10** ПІДТРИМУЙТЕ ТИСК на упакований перев'язувальний матеріал. Еластичним або давлячим бинтом обернути плече, повністю накрити пов'язкою.




- 11** Оберніть бинт на плечі пораненого, у формі 8, під протилежним неушкодженим плечем і на грудях/спині.




- 12** Щоб закріпити кінець бинта, зав'яжіть його або використовуйте затиск. Закріпіть його, щоб він не ковзав.


**ПРИМІТКА.** Якщо використовується еластичний бинт без застібки, залиште хвіст на спині пораненого.




- 13** БЕЗПЕЧНИЙ вузол 5 см стрічкою.



- 14** Прибинтувати травмоване плече до грудей.



- 15** ПРОДОВЖУЙТЕ шукати ознаки подальшої кровотечі.



- 16** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.