

Контроль кровотечі з шиї



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

01

ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



02 ПРЯМИЙ ТИСК на джерело кровотечі.

03 ЗНЯТИ марлеву пов'язку зі стерильного пакета.

ВАЖЛИВО - Якщо є кровоспинний засіб, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО.



04 ЩІЛЬНО ПРИТИСНІТЬ марлю або кровоспинний засіб всередині рани. Заповніть порожнину протягом 90 секунд.

ПРИМІТКА. Використовуйте стільки марлі або кровоспинного засобу, скільки потрібно.



05 ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, щоб бинт або марля з гемостатичним засобом простягалися на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА. ДОДАЙТЕ більше марлі, якщо марля не виступає принаймні на 2-3 см над шкірою. Необхідний для тиску.

ВАЖЛИВО - якщо проникаючий предмет застряг у тілі пораненого, НЕ ВИНЯТИ, забинтуйте.



06 Після заповнення марлею тримайте тиск до зупинки кровотечі - МІНІМУМ 3 хвилини.



07 Подивіться, чи зупинилася кровотеча, тримайте тиск, не відкривайте рану.

ВАЖЛИВО – ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОБ КРОВ НЕ ПРОСОКІЛА крізь пов'язку або навколо неї. Якщо кровотеча зупинилася, залиште пов'язку на місці. Тримайте тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

08a Якщо використовується спеціальна пов'язка (кровоспинна), накласти нову пов'язку всередину рани. Поверніться до 3.

OR

08b Якщо упакований з марлею, додайте більше марлі, тримайте тиск 3 хвилини довше.



09 НАКЛАДІТЬ широкий еластичний бинт (15 см) поверх пов'язки, залиште достатньо, щоб зав'язати вузол.



10 Підтримуйте ТИСК, намотуючи бинт поверх марлі, він повинен покривати весь пакувальний матеріал.



Обертальна пов'язка по діагоналі через грудну клітку та під протилежну кінцівку, назад через місце рани.

продовження на наступній сторінці...