


# Відкрита рана живота

**ВАЖЛИВО.** Розмір рани НЕ дає належної оцінки тяжкості.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.




**01** РОЗМІЩІТЬ пораненого в положення лежачи із зігнутими колінами.




**02** ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.


**ПЕРЕВІРТЕ** на наявність деформації, синців, садна, проколотого предмета, опіків, рваних ран. **ВАЖЛИВО**, перевірте жорсткість, розтягнення або пульсуючу масу.



**03a** ПРОМИЙТЕ місце рани чистою (якщо можливо **ТЕПЛОЮ**) водою, щоб зменшити забруднення.




**03b** **ЗАСТОСУЙТЕ** чисту марлю, гемостатичну пов'язку та кровоспинний засіб до будь-якої неконтрольованої кровотечі.



**04** Якщо НЕМАЄ доказів витоку кишечника та кровотечі, можна зробити швидку (до 60 секунд) спробу зменшити кількість кишечника за межами тіла.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ЗАМІНЮЙТЕ**, якщо є будь-які ознаки витоку кишечника або активної кровотечі.

**УВАГА. НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ СИЛУ**, щоб замінити вміст черевної порожнини. Не використовуйте силу для видалення сторонніх предметів.



**05** Якщо заміна кишечника пройшла успішно, закрийте шкіру в місці розриву. Зробіть це за допомогою клейкої пов'язки. Може включати стрічку, клейку грудну клітку, затискачі для закриття рани.

**06** СТАБІЛІЗУЙТЕ будь-які виступаючі предмети **ДИВИТИСЯ КАРТКУ 44 - Об'єкт Пірсинг тіла**

продовження на наступній сторінці...