

Лікування шоку/Рідинна ресусцитація

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН

Кортикостероїд (протизапальний препарат)

Використовується бойовими медиками

Використання у випадку виникнення анафілактичної реакції на переливання препаратів крові.

ДОЗУВАННЯ:

10-40 мг.


ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: ВВ або ВК.

ПРОТИПОКАЗИ:

Системні грибкові інфекції та відома гіперчутливість (попередня алергічна реакція); під час вагітності — застосування лише у випадках, коли потенційна користь від препарату переважає над потенційним ризиком, якщо альтернатива є гіршою.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЛІЇ:

Затримка натрію та рідини в організмі, виснаження запасів калію, гіперглікемія, підвищення показників функцій печінки, м'язова слабкість, порушення потовиділення, панкреатит, езофагіт, кропив'янка або інші алергічні реакції



ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Можливе виникнення судом при одночасному застосуванні із циклоспорином; знижена ефективність із одночасним застосуванням фенітоїну чи рифампіцину; по-різному впливає на дію антикоагулянтів.

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:Негайно/ 1-2 хв/ 1 год.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Введіть ВВ або ВК 10-40 мг метилпреднізолону після першого введення адреналіну та димедролу при лікуванні анафілактичної реакції внаслідок переливання препаратів крові.