











ПЕРЕМІЩЕННЯ ТУРНІКЕТА



Подбайте про заходи індивідуального захисту.


ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.



Перевірте раніше накладений(і) турнікет(и) на предмет ефективності зупинки кровотечі та близькості розташування до її джерела.




Перевірте наявність дистального пульсу.


ПРИМІТКА: Якщо є дистальний пульс, спробуйте затягнути турнікет сильніше. Якщо пульс все ще присутній, негайно перейдіть до 4 кроку.




Накладіть рекомендований Комітетом з ТССС турнікет безпосередньо на шкіру на 5-8 см вище місця кровотечі, якщо це можливо (див. Інструкція з накладання турнікету).




Повільно послаблюйте початковий турнікет упродовж однієї хвилини.



Слідкуйте за місцем, де виникла кровотеча, та переконайтеся, що вона не відновилася.



Переконайтеся, що дистальний пульс відсутній, а кровотеча не відновилася.



Посуньте початково накладений турнікет вниз, проте залиште його, не знімаючи, ближе (проксимальніше) біля прицільного.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 6: За відновлення кровотечі негайно повторно затягніть накладений початково турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинилась, а також сильніше затягніть прицільно накладений турнікет. Повторюйте 5 і 6 кроки, поки кровотеча не буде зупинена прицільним турнікетом.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 8:

Переміщені (початкові) турнікети не слід затягувати повністю, але слід усунути всі провисання.



На новому турнікеті зазначте час його накладання.



Задокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.