



Оклюзійна пов'язка на грудну клітку

Продовження зі сторінки 1




- 10** ПЕРЕВІРТЕ та ПОМАЦАЙТЕ, чи немає додаткових ран. Якщо ран більше, також обробіть вентильованою пов'язкою.



- 11** РОЗМІСТІТЕ пораненого в сидяче або лежаче положення на боці для відновлення. Поранена сторона повинна бути внизу в положенні для відновлення.



- 12** МОНИТОРУЙТЕ постраждалого на наявність ознак напруженого пневмотораксу. **Слідкуйте за посиленням респіраторного дистресу та насичення киснем нижче 90%.**




- 13** Якщо з'являються ознаки напруженого пневмотораксу, підніміть край перев'язувальної подушечки, щоб видалити повітря, що затрималося.

АЛЬТЕРНАТИВА - Зніміть пов'язку на кілька секунд, щоб забезпечити декомпресію, і накладіть нову вентильовану пов'язку.



- 14** Якщо симптоми напруженого пневмотораксу зберігаються після попередніх втручань, необхідна голкова декомпресія грудної клітки. **ДИВ. КАРТКУ 29., P11 + P12**



- 15** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.