

## Застосування антибіотиків (довідка)

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).


## 

Використовується бойовими медиками

## Бета-лактамний антибіотик з групи карбапенемів

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти

ліки перорально.	
дозування:	1 Γ
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	BB, BK, BM
ПРОТИПОКАЗИ:	Гіперчутливість до карбапенемів, бета-лактамних антибіотиків або місцевих анестетиків амідного типу (напр., лідокаїн); вважається відносно безпечним у вагітних за наявності клінічних показів
МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Флебіт або тромбоз у місці ін'єкції, астенія, втома, смерть, гарячка, біль у ногах, занепокоєння, зміна психічного стану, запаморочення, головний біль, безсоння, біль у грудях, гіпоабо гіпертензія, тахікардія, набряк, біль у животі, діарея, кислотний рефлюкс, закреп, диспепсія, нудота, блювання, підвищення показників печінкових проб, кашель, задишка, фарингіт, хрипи, порушення дихання, еритема, свербіння і висип
ВЗАЄМОДІЯ З	Пробенецид зменшує ниркову екскрецію ертапенему



ІНШИМИ ЛІКАМИ:

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 с-5 хв/30 хв-2 год/24 год

## ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Для ВВ введення - розведіть в 10 мл 0,9% NaCl; для ВМ введення - розведіть в 3,2 мл 1% лідокаїну (без адреналіну). Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.