

знеболювальні препарати

ВАЖЛИВО -

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).

ПАРАЦЕТАМОЛ (ацетамінофен)

Використовується всіма
військовослужбовцями (ASM),
бійцями-рятувальниками (CLS)
та бойовими медиками (СМС).

Ненаркотичний анальгетик та жарознижувальний засіб

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боєздатністю

ДОЗУВАННЯ:	500 мг, 2 таблетки кожні 8 год
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	перорально
ПРОТИПОКАЗИ:	Гіперчутливість до парацетамолу, вживання алкогольних напоїв, вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази.
ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Висипання, нудота, блювання, запаморочення, млявість, надмірне потовиділення, озноб або біль у животі при гострому отруєнні, підвищення печінкових проб, гіпоглікемія та гепаторенальна недостатність з токсичним ураженням печінки.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:	Холестирамін може зменшити всмоктування парацетамолу Барбітурати, карбамазепін, фенітоїн, рифампін і надмірне вживання алкоголю можуть збільшити потенційну гепатотоксичність парацетамолу.



ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 20-45 хв/1-2 год/3-4 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Вплив на виконання бойового завдання мінімальний або відсутній; НЕ ДАВАТИ пораненим службовим собакам



Продовження на наступній сторінці...