









Швидкий польовий тест гостроти зору при травмі ока



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

Попросіть пораненого прикрити неушкоджене око.

На відстані витягнутої руки – оцініть здатність пораненого виконувати такі кроки:




Прочитайте щось із текстом, що ви тримаєте.

ПРИМІТКА. Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.




Порахувати пальці. 02b

ПРИМІТКА. Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.



Визначити рух руки. 02c

ПРИМІТКА. Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.



Визначте світле чи темне, накривши, а потім оголивши око.



Повторіть процедуру для 03 іншого ока.

ВАЖЛИВО. НЕ відкривайте з силою будь-яке опухле око, щоб виконати швидкий тест на гостроту зору в полі зору при травмі ока.



Базуйте результати тесту на гостроту зору на тому, що може бачити поранений. Наприклад, читайте текст або рахуйте пальці на відстані 1 метра.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

ПРИМІТКА. Включіть результати перевірки гостроти зору для ОБОХ очей.