

## Знеболювальні препарати (довідка)

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).


## ОНДАНСЕТРОН

Протиблювотний препарат (антагоніст 5-НТЗ рецепторів)

Використовується бойовими медиками

Профілактика та лікування нудоти та блювання, пов'язаних із введенням знеболювальних препаратів

дозування:	4 мг кожні 8 год, повторіть введення через 15 хв, якщо симптоми зберігаються, але не вводьте більш, ніж 8 мг у 8-годинний проміжок часу
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	ВВ, ВК, транслінгвально, ВМ
ПРОТИПОКАЗИ:	Підвищена чутливість до ондансетрону, застосовувати з обережністю у пацієнтів з печінковою недостатністю; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази
МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Запаморочення, головний біль, седація, діарея, закреп, сухість у роті
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:	Рифампін може знизити рівень ондансетрону



ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 20 с-4 хв (ВВ<ВК<транслінгвально<ВМ)/10-40 хв/4 год

## ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Не призначайте пероральні форми — використовуйте транслінгвально таблетку, що розчиняється в ротовій порожнині (OPT) (ондансетрон для перорального застосування НЕ є прийнятною альтернативою формі OPT); не можна брати OPT мокрими руками; якщо вводите препарат ВВ чи ВК, слід робити це повільно струминно.