

Застосування антибіотиків (довідка)

У цій фармакологічній довідці ТССС подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов ТССС. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).


МОКСИФЛОКСАЦИН

Антибіотик з групи фторхінолонів

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти ліки перорально.

дозування:	400 мг на день
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	перорально
ПРОТИПОКАЗИ:	Гіперчутливість до хінолонів, печінкова недостатність, сифіліс, аритмії, ішемія або інфаркт міокарда, подовження інтервалу QT, гіпокаліємія, прийом антиаритмічних препаратів класу IA або класу III; при необхідності призначення препарату вагітним, за відсутності



можливі побічні

Запаморочення, головний біль, периферична нейропатія, нудота, діарея, біль у животі, блювота, спотворення смаку, порушення функцій печінки, диспепсія та розрив сухожиль.

альтернативного лікарського засобу, слід враховувати

можливі переваги прийому препарату над потенційними

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Залізо, цинк, антациди, алюміній, магній, кальцій і сукральфат знижують всмоктування; атенолол, цизаприд, еритроміцин, антипсихотики, трициклічні антидепресанти, хінідин, прокаїнамід, аміодарон, соталол можуть подовжувати інтервал QT та призвести до хибнопозитивних результатів скринінгових тестів на опіати.

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1 год/2 год/20-24 год ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

ризиками

Використайте моксифлоксацин з особистого набору CWMP пораненого бійця. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.

Продовження на наступній сторінці...