















Дворучне використання джгута брашпиля (Windlass)

Фаза тактичної польової медицини




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

ПРИМІТКА ВАЖЛИВО. Переоцініть будь-який джгут, накладений під час догляду під вогнем. Затягніть, якщо потрібно і можливо, або нанесіть другий поруч і вище.


ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск, щоб зупинити кровотечу.




ЗНЯТИ джгут із набору або сумки для транспортування.




ВСТАВТЕ травмовану Проведіть джгут навколо кінцівку через петлю на липучці.

пошкодженої кінцівки, пропустивши його назад через пряжку.




ПОЛОЖЕННЯ 5-8 см над місцем рани, безпосередньо на шкірі.




НАТЯГНІТЬ, зніміть слабину стрічки на липучці.



Поверніть липучку назад на себе навколо кінцівки, але НЕ на затискачах стрижня брашпиля.



КРУТИТЬ стрижень, поки кровотеча не зупиниться. ВИКОНАЙТЕ кроки 1-8 менш ніж за 1 хвилину.




ЗАфіксуйте стрижень брашпиля за допомогою затискача брашпиля.



Проведіть липучку навколо стрижня та між затискачами.


КРОК 9. Продовжуйте затягувати, якщо кровотеча не зупинилася, або накладіть другий джгут поруч і вище першого.



ЗАКРІПНІТЬ запобіжний ремінь брашпиля.



12 ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ час накладання джгута на обличчя потерпілого. ВИКОНАЙТЕ всі кроки протягом 3 хвилин.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.