


Відкрита рана живота

ВАЖЛИВО. Розмір рани НЕ дає належної оцінки тяжкості.



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.




01 РОЗМІСТІТЬ пораненого в положення лежачи із зігнутими колінами.




02 ВИКРИТИ травму та знайти джерело кровотечі.


ПЕРЕВІРТЕ на наявність деформації, синців, садна, проколотого предмета, опіків, рваних ран. **ВАЖЛИВО**, перевірте жорсткість, розтягнення або пульсуючу масу.



03a ПРОМИЙТЕ місце рани чистою (якщо можливо ТЕПЛОЮ) водою, щоб зменшити забруднення.




03b **ЗАСТОСУЙТЕ** чисту марлю, гемостатичну пов'язку та кровоспинний засіб до будь-якої неконтрольованої кровотечі.



04 Якщо НЕМАЄ доказів витоку кишечника та кровотечі, можна зробити швидку (до 60 секунд) спробу зменшити кількість кишечника за межами тіла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ЗАМІНЮЙТЕ, якщо є будь-які ознаки витоку кишечника або активної кровотечі.

УВАГА. НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ СИЛУ, щоб замінити вміст черевної порожнини. Не використовуйте силу для видалення сторонніх предметів.



05 Якщо заміна кишечника пройшла успішно, закрийте шкіру в місці розриву. Зробіть це за допомогою клейкої пов'язки. Може включати стрічку, клейку грудну клітку, затискачі для закриття рани.

06 СТАБІЛІЗУЙТЕ будь-які виступаючі предмети **ДИВИТИСЯ КАРТКУ 44 - Об'єкт Пірсинг тіла**

продовження на наступній сторінці...