

Введення антибіотиків

ВАЖЛИВО - У цьому посібнику з фармакології TCCC надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій TCCC.

ЕРТАПЕНЕМ

Бета-лактамний антибіотик з групи карбапенемів

Використовується бойовими медиками (СМС)

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо борець може прийняти ліки перорально.

ДОЗУВАННЯ:	1 г
ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:	ВВ, ВК, ВМ
ПРОТИПОКАЗИ:	Гіперчутливість до карбапенемів, бета-лактамних антибіотиків або місцевих анестетиків амідного типу (напр., лідокаїн); вважається відносно безпечним у вагітних за наявності клінічних показів.
ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:	Флебіт або тромбоз у місці ін'єкції, астения, втома, смерть, гарячка, біль у ногах, занепокоєння, зміна психічного стану, запаморочення, головний біль, безсоння, біль у грудях, гіпо- або гіпертензія, тахікардія, набряк, біль у животі, діарея, кислотний рефлюкс, закреп, диспепсія, нудота, блювання, підвищення показників печінкових проб, кашель, задишка, фарингіт, хрипи, порушення дихання, еритема, свербіння і висип.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:	Пробенецид зменшує ниркову екскрецію ертапенему.



ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30 с – 5 хв / 30 хв - 2 год / 24 год.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Для внутрішньовенного введення - розведіть в 10 мл 0,9% NaCl (не змішуйте з декстрозою та не вводьте одночасно з іншими ліками) Для внутрішньом'язового введення - розведіть в 3,2 мл 1% лідокаїну (без адреналіну).

Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).