




Голкова декомпресія грудної клітки

Needle Decompression of Chest (NDC)

Продовження зі сторінки 1




07b Видаліть голку, залишивши катетер на місці.




08 ОЦІНЮЙТЕ для успішної декомпресії голкою.

1. Респіраторний дистрес покращується.
2. Виразний шиплячий звук під час декомпресії голкою. Складно в умовах високого шуму.
3. Рівень насичення киснем підвищується до понад 90%.



09 Якщо перша декомпресія не покращила потерпілого, проведіть другу в раніше невибраній зоні, 1 - 2.

ПРИМІТКА. Для другої процедури використовуйте нову голку/катетер.



10 РОЗМІСТІТЕ пораненого в сидяче або лежаче положення на боці для відновлення. Поранена сторона повинна бути внизу в положенні для відновлення.

11 Продовжуйте спостерігати за пораненим на наявність нових ознак респіраторного дистресу.

12 Якщо початкова декомпресія була успішною, але симптоми повертаються, виконайте ще одну декомпресію на тому ж місці, що й раніше. Завжди використовуйте нову голку/катетер.

13 Якщо друга декомпресія НЕ є успішною, продовжуйте послідовність протоколів лікування. Масивна кровотеча, дихальні шляхи, дихання, кровообіг, гіпотермія / травма голови.



14 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.