

знеболювальні препарати

ВАЖЛИВО - У цьому посібнику з фармакології TCCC надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій TCCC.

МЕЛОКСИКАМ

Нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), інгібітор ЦОГ-2, який використовується для знеболення та зниження температури

Використовується всіма військовослужбовцями (ASM), бійцями-рятувальниками (CLS) та бойовими медиками (СМС).

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боєздатністю.

ДОЗУВАННЯ: 15 мг 1 раз на добу

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: перорально

ПРОТИПОКАЗИ: Гіперчутливість до НПЗП чи саліцилатів, астма, важке захворювання нирок або печінки; при призначенні вагітним слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками, якщо альтернативний варіант є гіршим.

ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ: набряк, грипоподібний синдром, біль в животі, діарея, диспепсія, нудота, виразки та кровотеча ШКТ, анемія, головний біль або безсоння.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ: Зниження ефекту інгібіторів АПФ та діуретиків, підвищення концентрації літію та його токсичності; при одночасному прийомі з варфарином або аспірином - збільшення ризику кровотечі ШКТ

ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30-60 хв/5-6 год/20-24 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Вплив на виконання місії мінімальний або відсутній; НЕ ДАВАТИ пораненим службовим собакам



Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).

Продовження на наступній сторінці...